

Tercia

Decandra *Guia folus pennatis subquadriplici foliolis oblongis acuminatis
glabris, racemis decompositis floribus decandris*

Guia decandra

Membrum Sauvage von Rohr no 227. Ex India occidentali.
Rami verticillati inferne glabri, superne oculoornato tomentosissimi.
Folia petiolata alterna fere pedalis pennata cum impari
3 vel 4 juxta interdum bipartita absque impari. foliola petiolata
opposita oblonga, acuminata obtusa utroque glabra, inter
gemmas supra arenis subtus pallidiora nigrescentia: tri-
vel quadri-pollicaria interiora minor. Racemi axilla-
res decompositi longitudinem foliorum. Rami alterni
remoti flores parvi

Schedula
descriptionem fructus in ~~hujus~~ Rohri

Droica
enneaphylla Arica? foliis pennatisquadrijugis, floribus decandris droicis.

Habitat Capeno de von Bato Montebia Sauvage An. v. Rohr 5

Rami glabri, superne angulati

Folia petiolata, alterna, pedalia, patentissima, pennata dum
impari, quadrijuga. Foliola petiolata, opposita, bi- & tripollia
vix, interiora minor, oblonga, integerrima, acuminata, acū
minime obtuso, basi acuta, utrinque glabra, supra a venis, obscura
nervosa, laevia; subtus pallidiora, venosa

Petioles

Pedunculati Racemi axillares, compositi, longitudine foliorum. Pe
dunculus glaber, striatus, angulatus, glaber: partiales spar
si, saepe remoti, sursum versus semper breviores. Pedicelli
breves, subtriflori. Flores brevissime pedicellati, parvi.

Calyx minutus, quinquepartitus.

Corolla pentapetala: petalis oblongis, calyce longioribus

Stamina filamenta 10, corolla longiora

Pistillum nullum

an Arica, an Spondias?

Brianza Hittella

80 203.

villosa Acia? foliis pennatis: folioli subtus villosi.

Habitat in India occidentali. A. v. Robt.

Rami teretes, inferne glabri, cortice punctato, superne villosi.
Folia petiolata, alterna, pennata cum impari, trijuga. Foliola petiolata,
opposita; intima pollicaria, ovata, intermedia oblonga, sessum longiora
terminalia alleptricum, tripollicare basi attenuatum; omnia inter
gemina, acuminata, vixuatim nervosa, subtilis fine venosa, subtus
villosa.

Petioles villosi, canescentes.

Pedunculi infrafoliacei, breves, ramosi. Pedunculi partiales sub axillari
basi

Calyx par fenus, minimus, quadrifidus, villosus: laciniis ovatis, acutis

Corolla tetrapetala: petala linear-oblonga, calyce triplo longiora.

Stamina filamenta 8. inter eorum 9. petalis breviora hispita, hispiti coheren-
tia. anthera globosa.

germen minimum. Stylus unicus filamentis brevior. Stigma simplicia
acutum.

(An Acia. Stylus diffusus et Stigmata diffusa videtur. Fructus non vidi
ideoque genere dubito

heptaphylla

Halimolobos in Guiana herb. La Martini
Rami teretes, apice leviter tomentosi. ^{semipinnis} Soliola petiolata, saepe 9, sub opposita
bipollicaria, oblonga, acuminata, glabra, supra nitida, subtus discolora. Pani-
cula axillares et terminales. Peduncululi leviter tomentosi. Pedicelli ultimi
midrensi pini, 1-3 flori. Flores minuti. Calyces glabriusculi.

nitida L'Her

Habitat in Capena Herb. La Martini

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, pennata cum impari, 7-9 pinnis. Soliola
petiolata, caetera opposita superiora alterna, 3-4 pollicaria, interiora minoribus
Cane colorato-elliptica, acuminata, integerrima, ^{lub} loricata, nitida, subtus venis
sine venosa, rufescentia. Panícula terminalis ramosissima, patentis pinnis
ferreusis tomentosis. Flores sessiles, minuti, conferti.

trifolia *Guia*

Guia enneandra Aubl.

Habitat Cayenne herb. la Martini

Rami teretes, glabri, apice compressi. Folia petiolata, ternata. Foliola 3-4, vel
5, ovata, oblongo-ovata, acuminata, obtusa, nitida, pallide viridia, subtus obsolete
venosa, lateralibus parum minoribus. Pedunculi axillares, plures, petiolo brevioribus.
Pedicelli inaequali. Flores glabri.

trifolia Geica

Habitat herb. Ausf.

Rami crassitie pennis asserino, teretes, glabri. Folia petiolata, alterna, remota. Soliola 6 pollicaria, ternata, ovata, oblonga, attenuata, acuta, integerrima, impunctata, nitida, pallide viridia, supra obscura venosa. Petioli fenestrati. Racemi pauci supra axillares, subcompositi, brevissimi. Flores breves.

enneasandra Ficoides

Habitat in Guiana herb. Desfont.
Rami teretes, glabri, superne panem angulati. Folia petiolata, simplicia, geminifera, serrata. Foliola petiolata, bipollicana vel panem ultra, lanceolata-oblonga, attenuata, obtusiuscula, suba sena, subnitida. Racemi axillares, plures, femi pollares, qua nota videtur differre ab *Ficoides enneasandra* Aubl. Corol-
lo margine incano.

Quercus

Habitat in Cayenna herb. Fusf.

Folia pedalis, trijuga: foliola petiolata, alterna, ^{remota} spithameo, interiora minora, elliptica, utrinque acuta, glaberrima, subtus nitidiuscula, utrinque ~~acuta~~
Petiolus superior angulato-compressus. Racemi compositi spithamei, flores glomerati, canescentes.

heptaphylla Jacq.

Habitat in Guiana Herb. Desfont.

Rami teretes, apice subangulati, glabri. Folia sesquipedalia, pennata cum
impari, 4 puga: foliola petiolata, opposita, 4-5 pollicaria, subovato-oblan-
ge^{ia}, acumine semipollicari producta, venosa, vix nitida, altero latere
bas eos obliqua. Racemi axillares pollicares.

altissima Guiana

Habitat in Guiana Herb. Desfont. 5

Racemi angulati, crassitie perno cygneae, grisei. Folia quadrijugis, foliola opposita, petiolata, 4-5 pollicaria, elliptico-lanceolata, in acuminem fere pollicari producta, obtusiuscula, nitida, obsolete venosa, basi aequalia. Racemi axillares. Fructus et reliqua similia Aubl. fig. mox quod solum terminale desideratur.

Petiole basi supra plani, margine utroque erecto canaliulati, prope foliola coarctati

28
nisa tinea foliolis lucidis laevibus oblongo-ovatis panicula nisa Yemen
Hort. bot. Paris. t. 1. pag. 109
Habitat in America merid.

non vidi

Guonensis *Q. foliis pinnatis, ~~pinnis~~ floribus pedunculatis axillaribus.*
congestis Aubl. fl. Gu. pag. 340. tab. 131
Habitat in Guonensis.

non vid.

7. Brondnei ~~Barbyli~~ Gusf. gen. pag 430

michi ~~cyroto~~ ca. Tschilow

bobonica ~~Gambuana~~ Guss. gen. p. 152
Habitat in ~~Insula~~ Francia

~~Gambuana~~ semine unico Guss. ad Memusops etuli reliquis specie
non vidi

Sciandra f. foliis omnibus pinnato-quinatis floribus deciduo nō arbor.
fl. Gu. pag. 346 tab. 135
Habitat in Guiana

non vidi

Willdenowii *Hortensia* Willdenow: Cothen: *W. s. l. math. plant*

michi cynot

Enneades 9. foliis ternatis floribus ensiformi Aubl. fl. gu. 1. pag 343

Tab. 174

Habitat in Guiana

non vidi

(trifoliata) Hypelate Schw. ~~prodr.~~ p. 61. Biorw. Jan. 207. 1.
Cytisus arboreus, foliis trifidis glabris, foliorum Sloan. h. 2. 33.
Habitat in Jamaica

Hypote

1. *Trigloea* 4