

Flet

amencano spec: on net Denis Richard

Canadensis bacca obtusa Tetragonis

canadensis Glen.

Herb. Arch.

habeo

myrtifolia Gle

Habitat in am. boreali herb. Anth.

habes .

Duobon Flex

Habitat in Carolina herb. Desfont

Simili Pono glabr. Rami teretes, glabri, uti tota planta. Folia petiolata, alternata, pollicaria, lanceolata, acuta, supra glabra nitida, ex utroque serratura una alterave, basi sensim attenuata, recita. Pedunculi axillares; longitudo una petiolorum, unguiculares. Flores subum bellati.

Balkanica Herb

Habitat in insulis balticis herb. Desfont. et hort. Parif.

Rami angulati. Folia ovato-oblonga, basi integerrima, venosa, supra nitida, sparse serrata, dentibus paucioribus vel pluribus; interdum paucioribus in altero margine quam in altero, interdum integerrima. Ab *A. aquifolius* differt dentibus minoribus folis non serrato-dentatis

myrtifolia Gleh

Habitat in America boreali. Herb. Desf.

Rami alterni. Folia alterna, integerrima, vel ex trofum denticulo uno alterove
pinnuloso. Bacca ut magnitudine Piperis nigr.

Madagascariensis Gleason

4 lect. Madagascarensis la Martini

Habitat in Madagascar Desfont. herb. 3

Folia lanceolata, remote dentato-spinosa, utraque nitida. Fructus oblongus, magnitudine fere Coryli. Saccus 7. aquifolius et folia angustiora

cuneifolia Gleh foliis rhombicis angulis acutis pinnatis

Habitat in Bonana herb. Desfont.

Rami teretes. Folia pollicaria, nitida, subvenosa.

optimalis Glex

Glex optimalis La Mark.

Habitat herb. Deffont.

maximam similitudinem habet cum G. myrti folio et videtur esse

Caciflora & *Caciflora* foliis oblongis remote obtuse serratis, cymis dichotomis

& *Caciflora* La Martii

Habitat herb. Desfont.

Rami teretes, uti reliquis partes glabri. Folia petiolata, bipollicaria, opposita,
obtusa, glaucoviridia, venosa, rigidiuscula. Cymae axillares, semipollicares,
& trifidae.

Decidua Flex. foliis lanceolato-oblongis, pedunculis terminalibus ramulorum
uniflori

Habitat in America boreali herb. Desfont.

Rami cortice cinereo-glauco: ramuli dentati, unguiculares; ^{adate} maluitate longiores;
folia in apice ramulorum lateralium aggregata, petiolata 1-2 pollicaria,
utrinque glabra, venosa, adultera supra nitida, utrinque acuta. Pedunculi
7-8 ex apice ramulorum, unguiculares. Ballo m ag nit Dna Pipeni nigri

canadensis Flew folus oblongis subintegerrimis

Habitat quebec prope fream Atudsoni Michaux herb. Fus

Rami purpurascens; glabri. ^{petiolata} folia plura una cum pedunculis ex eadem
gemma, ^{superiora semipollicaria} ad altera sesqui pollicaria, utraque glabra, parum acuminata
integerrima vel extrorsum serratura una alterave, ~~obsoleta~~, remota, mi-
norata. Pedunculi 2-3 ^{perillares}, semipollicares, fructiferi longiores.
Dioica Cal. 4partita vel 4phyllis deciduis. Petala 4. Mas stamina 4, rudic-
mentum germinis. ~~Stamina~~ stylus nullus. Ovaria Stam. 4. Perilia
germen 4 young. Styl. nullus. Stigma 4fidum. Bacca 4pyrena. Semina
4. aspa. Michaux

madagascariensis flex foliis oblongis aculeato-spinosis, pedunculis aggregatis uni
floris

Habitat in Madagascaria Com. merid. herb. 4 usq.

Habitus illicis aquifolii. Ramis teretes, cortice griseo, glabris, ubi reliqua partes
apice compressi. Folia petiolata, alterna bi- / tri-pollitana, remote den-
tato-spinosa, venosa, supra nitida, utraque fere concolora. Pedunculi 3
4. prope supra cicatriculas, semiunguiculares. Baccæ magnitudine Confi,
biloculares.

nutans - Potamogeton

Habitat in lacubus Inf. Bourbonne Comnes. herb. Fusf.

Datiss Potamog.

Caules filiformes, repentes, dichotomi.

Solia capillacea, alternas longa. Spica pedunculata, interrupta,
nutantes

vomitona Her. foliis alternis diffusis oblongis obtusifidis crenato serratis
seriatim muticis H. Her. 1. p. 170

Casine vera floridana abusiula baccifera, alaterni forme facie
foliis alternis serratis, Vetroque Plukh. mant. 40. t. 4. 326. fig.
2. Cat. bot. Carol. 2. p. 57. t. 57.

Casine Peragua foliis lanceolatis alternis semper virentibus, floribus
axillaribus Mill. Dict. 2. t. 1. p. 3. fig. 2.

Flex floridana Ga. Mart. J. t. p. 357?

Habitat in Carolina, Florida 5 herb. Mus.

Cortex cinereus glaber. Rami teretes. Folio petiolatis, pollucina supra
nuda, utroque glabra subionacea, subvenosa obtusa, obtuseque serratis

officinalis G. foliis ovato ellipticis planis superne venatis: crenis mucronatis,
pedunculis simplicibus ha. Mart. T. Enc. pag. 356.
an Pinar lucidus Hort. Kew?
Habitat in Madaga?

nunc ignota

myrt. folia G. folio ovato utraque acuti integerrimis, floribus divinis
sagittulatis lateralibus La Mart. T. E. pag 356.

Habitat in Cambis & Tibetis

Arbor medicinis foliis et inflorescentia sicut styli

Folia angustissima, semipollicana, integerrima, interdum dentata
uno alterove. Pediculi axillares uniflori

mehe cypria

crocea Flex foliis oblongis serratis serraturis: ciliatis spinosis Thunb. prodr. pag
32.
Habitat in Cap. b. p. ei

madagascariensis flex foliis ovatis acutis dentato-paniculatis pedunculatis
unifloris, bacis ovatis dispersis la mark
Habitat in Madagascaria Comnesp 5
an genus proprium

non est

Salix folia & *Salix lanceolata* utraque attenuatis dentatis, pe-
dunculis petiolo Congombis axillaribus cymosis Willd. Sp.
pl. pag. 710.

Salix folia Gay. Coll. 4. p. 36. Tab. 2. fig. 2.

Habitat in Anpala Mauritii 5

non vidi

obcordata G. l. foliis obcordatis concavis, caule fruticoso Sw. fl. Ind

occid. 1. p. 330a

Habitat in hujus montium Gomariis 5

in hujus generis

non vidi

Vigilata Potkos

Ordo 4. *Solit ovatis cum acamine inermibus subintegris* Hort. Kew. 1

p. 67.

Habitat in med. era 5

Florida 4/18

an *Glycyrrhiza* root-view

asiatica 4. folus lato lanceolatis obtusis integerrimis la Mark L. Ca. pag
356

non vidi

japonica 4 foliis oppositis sessilibus, floribus racemosis terminalibus Thunb.

fl. Jap. p. 794 f. v. p. 160

Habitat in Japonia

Emetex humilis, glaber. Folia ovata, acuminata, dentato-spinosa, sesqui-pollis
cana. Racemus bracteatus digitalis. Bractea opposita terio vel qua
terio ovata, acuta glabra, patentes, semi-inter-venulares. Pedunculi axi-
lis bractearum solitarii uniflori, capillares, bracteis paulo longiores.
Corolla subrotunda, Petala obovata, alba. Germen oblongum trigynum
quatuor sepalis Thunb. l. t.

latifolia? foliis ovatis serratis, floribus ^{super} axillaribus aggregatis Thunb. fl. Jap.

p. 79 + f. v. p. 180

Habitat in japonia?

arborescens; rami rigidi angulati fusci. folia alterna petiolata, ovata, obtusiuscula, serrata margine reflexo, supra nitida, subtus pallida patentia tri-nerviaria, nervi duo laterales. Petioli breviter canaliculati, fusci unguiculares. Flores supra axillares, e gemmis plurimis aggregati, pedunculati. Pedunculi unguiculares Thunb.

non vid.

emarginata G. foliis obovatis emarginatis, floribus axillaribus binis Thunb fl.

Gap. p. 40 * S. V. p. 160

Habitat in Japonia G. herb. Boyen

Frutex. Rami teretes, flexuosi, cinerei, glabri, ramulosi. Ramuli alterni, substernati, patuli. Folia alterna, brevissime petiolata, obtusa, crenata margine revoluta, supra viridia, sulco longitudinali, subtus pallida carina media elevata sempervirentia. Flores rarisime solitarii Thunb.

Rami scabri et uiculis foliorum. Folia sparsa sempollivaria obovata ext. vespum serrata, subtus arena

crenata f. foliis ovatis crenatis, pedunculis ramis sparsi subtifloris Thunb. fl. Top.

pag 70 + S. V. p. 160

Habitat in Taponia t.

caulis erectus. Rami puberuli, nodulosi, patuli. Folia sparsa petiolata, obtusa,
margini reflexo, supra viridia, subtus pallida, unguiculata. Petioli
brevissimi. Flores pedunculi simplices bifidi. Infructi, cernui vix ungui-
culares pedicellis brevissimis Thunb. l. c.

Linnata 4. foliis ovatis acutis ciliatis serratis, floribus axillaribus solitariis
Thunb. fl. jap. pag. 708. V. p. 160

Habitat in Japonia

Frutex erectus, ramosis junis. Rami teretes glabri, laev. Ramuli filiformes. Folia
alterna, petiolata, acuminata, subtus pallida, venis, patentia, semipetoli
cana. Petioli vix lineam longi. Peduncululi filiformes cernuium flori. Perian
thum quadridentatum Thunb. l. c.

non vid.

rotunda 7 foliis rotundatis acutis integris, pedunculis umbelliferis Thunb. fl. Cap. pag.

1778. v. p. 160

Habitat in Caponiis

Trux ramis subumbellatis, nodulosis. Folia versus apices ramulorum sparsa
frequentia petiolata, rotunda glabra, subtus pallida sequipollitana
Petioli folio dimidio breviores. Pedunculi axillares Thunb. l. c.

integra 4 foliis oblongis obtusis ^{emmis} integris, pedunculis unifloris Thunb fl-jap. p.
77 + R.V. p. 180

Habitat in Japonia herb. Roxen

Stem erectus ramis alternis angulatis ^{scissis} patentibus. Folia alterna petiolo
ta ovata, obtusa, margine parum ^{reflexo}, subtus pallida, pollicaria
petioli ^{pedunculis} inqueti vix unguiculares. Racis axillares umbellati subquater
ni, erecti, unguiculares Thunb. l. c.

Folia petiolata, alterna, bipollicaria oblonga, obtusa, subovata
avenia.

Leguminosa 4 foliis lanceolatis, ex trochum obsolete serratis, pedunculis axilla-
ribus aggregatis sub trifloris

Flex leguminosa Gaëqu. coll. 4. may 1891.

Habitat in Candina 7

ramosa sempervirens, tota glabra ramis teretibus nigro purpurascens
folia lanceolata basi nigriangustata acuta, oblongula supra
lucida subtus nitida pallidiora supra medium obsolete serrata oppo-
sita et alterna bipollucaria breviter petiolata. Pedunculi axilla-
res aggregati longitudine petiolorum uniflori vel biflori bracteola
una vel altera minuta. Gaëqu.

an varietas caspodiensis

caspie 7. foliis ~~ovato-lanceolatis serratis~~ ^{semper vix nitidis} alternis distantibus lanceolatis
serratis: serraturis acuminatis Hort. kew. t. p. 170.
Aquitolium carolinense, foliis dentatis basi nitidis Cat. herb. carol. 1. p.
31. tab. 31.

Alex caspie foliis ovato-lanceolatis serratis Lin. N. p. 160.

angustifolia 7. foliis lanceolatis subintegerrimis
Habitat in Carolina et Florida herb. Desfont.
Rami teretes at superne pubescentes. Folia parva petiole tri-
pollicaria venosa supra nitida in extusum serrata: intus
integerrima saepe tota integerrima acuta. Peduncululi cetera folia
parva. Racemi plures umbellati.

Folia oblonga avernae utrinque obtusa, supra nitida, serratura mutua
semipollicaria, coriacea herb. Desfont. an spec. Diversa?
aliud specimen in herb. Guss.

Folia oblonga, integerrima vel extusum remote serrato-dentata
varietas 7. oleifolia: folia lanceolata, integerrima subtus pallidiora utrin-
que glaberrima; sesqui-pollicaria

V. myrtifolia (que distincta species videtur)

opaca 4 foliis oblongis acutis spinosis planis, pedunculi infra foliis sparsis
axillaribusque subtrifloris.

Flex opaca foliis ovatis acutis spinosis glabris, floribus ad basin
ramulorum annothorum sparsis Hort. kew. 1. p. 169.

Habitat in Carolina. 4 Folia minime nitida Pentibus utraque 3-5
rami cortice cinereo ~~spinosis~~ acutis omnino ascendenti. Stipula gemina axillaris spinosa.
Pedunculi plures ^{anulati} vel solitarii ^{anulati} interfolia, triflori

Folia interdum oblonga, in pollicaria, integerrima, bipina acuminata, inter-
dum angustiora margine dentato-spinosa, breviora, supra nitida subtus
pallidiora arena. Pedunculi axillares petiolo parum longiores, pedicelli
tres: laterales biflori floribus pedicellatis, intermedii uniflori herb
fus.

AR

aphaca flex foliis lato-lanceolatis obtusis integerrimis Lin. S. V. pag. 160

Habitat in India Afra

bipolluciana utraque acuta

~~Solui~~ coracca supra nitida, alterna. Rami angulati purpureo
scenti

prinosides α . foliis ellipticis lanceolatis acutis deciduis serratis; serraturis
mutuis Hort. Kew. 1. p. 169

Habitat in Carolina Virginia

Racemiflori ^{ramiflori} ^{alterni} ^{petiolata alterna}
Racemiflori ^{senofo} ^{rostrata} ^{terminati} ^{ve ultra}
Racemiflori ^{senofo} ^{rostrata} ^{terminati} ^{ve ultra} glabra exceptis junioribus sub
tuis in costa. Pedunculi axillares 2-3. uniflori longitudine petioli
folia plura ex eadem gemma cum floribus oblonga, crenato serrata
subtus parum pallidiora. Pedunculi filiformes, unguiculares 6-7.
aggregati, uniflori teneri.

β . fructu um Michaux a Carolina foliis dimidio majoribus serratis
acutioribus; costa subtus villosa-racem

angustifolia 4. foliis ^{alternis sub} oppositis, linearibus lanceolatis subdentatis integerrimis
que
Habitat On Zier 5
ramulorum folia angusta pollicaria, glabra dente uno alterove minuto setaceo
terni glabri utrinque opaca

cuneifolia 4 foliis cuneiformibus tridentatis Lx. Spec. pl. pag. 101.

4 lxx aculeata, folio triuspedi Plum. 4. 110. fig. 2.

Habitat in America meridionali

Tota glabra. Rami teretes folia alterna simplicia supra nitida rigid.
quadrangulata angulis in spinam exterrante venosa.

— ~~sem~~ rhombicis