

Impatiens

boisifera Impatiens foliis lanceolatis serratis alternis, pedunculis axillaribus  
subtrifloris  
Habitat in India Orientali.

Caulis herbae cetero, erectus, glaber. Folia subsessilia, 3-4 pollicina, etiam  
que attenuata, basin versus integerrima, venata serrata, glabra.  
Pedunculi brevissimi, plerumque triflori. & corae parvi. Fructus  
globosus.

herb. 4. quomodo Nestorum

parviflora Impatiens

Habitat in Sibiria aerb. & manthei

Caulis semipedatis, glaber, striatus. Folia petiolata, alternata, bipinnatifida, oblonga, acuminata, confertim obtuse serrata: serraturis mucronatis, venosa, glabra. Pedunculi axillares 1-3 flori, parvi. Capsulae unguiculares. A. radii turgen confert serraturis remotis, flombus majoribus.



*Impatiens*

Habitat in Gava Commes. herb. mus.

Caulis Verdes, striati, glabri. Folia petiolata, ternata, 1-2 pollicaria, oblonga, alternata, setacea serrulata, nervosa, arenia. Stipula setacea. Pedunculi foliis longiores, solitarii, uniflori. Calicis filiforme, foliis longior

fasciculata Impatiens pedunculis axillaribus unifloris aggregatis foliis opposi-  
tis lanceolatis La marck Enc. 1. p. 359.

Onopu Rheed. Mal. 9. p. 89. t. 47.

β Tjena - onopu Rheed. Mal. 9. tab 49. 50. 51.

Habitat in India orientali

michi ignota

notari Ampelium pedunculis trifloris solitariis, foliis lanceolatis, nectans bre-  
visima Willden-spec. pl. 1175  
Hab. Nat. in India orientali

michi ignota



Chinensis 7 pedunculis unifloris solitariis, foliis oppositis ovatis: nectariis arcuatis

Herb. Sin. Spec. pl. p. 132 D\*

Habitat in China 0

Caulis alternatim ramosus ruber. Folia opposita ovata subserrata  
Pedunculi foliis longiores. Nectarium valde arcuatum crassum

non vid.

latifolia *I.* pedunculis unifloris solitariis, foliis <sup>ellipticis</sup> ovatis alternis crenatis,  
nectariis flore longioribus

Valli orapu Rheed. Mal. 9. p. 91. t. 40

Habitat in valloso Ceylone

*Impatiens latifolia* pedunculis unifloris solitariis, foliis ovatis  
seriatim canaliculatis, nectariis flore longioribus in Spei:  
pl. pag. 13204

Habitat in valloso Ceylone

caulis sulcatus angulosus tota planta glabra. folia petiolata  
remota <sup>intus glabra</sup> canaliculata ovata & singula crenata seta promi-  
nente. Petiolus <sup>acutus</sup> versus folium & utrinque glandulosus. Peduncu-  
li filiformes longitudine fere foliorum. Calcar subulatum longi-  
tudine foliorum. pedunculi acutiusculi. flor. magnitudine  
*Imp. balsamifera*

caulis extrospua  
caulis entioresi



trifoliata 9. foliis oppositis ternisque <sup>lanceolato</sup> ovatis, pedunculis solitariis unifloris  
nectario longitudine pedunculi ~~recto~~  
Habitat in Tava.

Tota glabra, folia petiolata, superiora Terna, in ramulis opposita  
folia lanceolato elliptica serrata serraturis inferioris seta  
Cis bi s. tri pollicari subtus pallidiora. Pedunculi longitudine  
foliorum filiformes. Cornu nectarii setae ~~asite recto~~ <sup>utrinque geminae</sup> in  
non dum aperti floribus ante reflexo. Sepala ~~setae~~ inter folia  
ultima

affinis maximo 9. impat. latifolia

rosmarinifolia G. foliis oppositis lineatis; pedunculis solitariis unifloris

Retz. obs. Bot. Jap. 5<sup>to</sup> pag. 294

Habitat in Zeylona

Caulis ramif. de basi pedalis erectus. folia sessilia internodiis longiora  
integerrima saepe <sup>et angustis alterni.</sup> extrosum respiciente uno vel altero remoto

Pedunculi filiformes flores parvi



oppositifolia. Pedunculis unifloris aggregatis, foliis oppositis linearibus

Lin. fl. reyl. 314\*

Frondam-pallu Rheed. mal. g. p. 57. t. 31?

Habita in reylona arenosis

Herba erecta glabra. Caulis <sup>vamosa</sup> siculenti, articulatus. Folia subsessile internodiis  
breviora, denticulato-ferata. Pedunculi filiformes nudi uniflori  
plenumque tres et singula ala, caulium articulis longiores peracta  
florescentia dependentia flori parvi necdario flore longe breviora ha

lanicolatus

Rheed-syn. Dubium

cornuta 4. pedunculata uniflora aggregata, foliis lanceolatis, nectariis flore longioribus  
Lin. Fl. zeylanica 316x

Balsamina latifolia, floris calicem longissimis Burm. zeyl. 41. t. 16. fig. 1  
Habitat in zeylona 0

Colica luteo lanceolata in petiolo deflexa, serrata serraturis inflexis  
Pedunculi vespis insertione glandulosa utriusque. Pedunculi plures  
inaequales. Labium corollae magnum reliqua petala vix conspicua  
nectarium angustissimum seto facie flore duplo vel triplo longiore  
Lin

calycis villosi.



Balsamina 4. pedunculis unifloris aggregatis, foliis lanceolatis superioribus alternis,  
nectariis flore brevioribus Lin. 1.

Balsamina God. pempt. 671.

Balsamina femina Bauh. pin. 306.

Telo-onapu f. nolengia Rheed. Mal. y. p. 101. t. 52.

Kacca herba Rumph. amb. 5. p. 274. t. 90.

Habitat in C. b. p. India C

Caulis erectus ramifera succulentus pubescens, folia petiolata, alterna  
lanceolata, petiolo serrata, glabra Petioli utraque attenuata  
petioli glandulosi. Pedunculi axillares 2 vel 3. uniflori  
pubescentes folio breviores. Nectarium arcuatum. Fructus oblongus  
herpeticus

figura Rheed. habet folia opposita

Walter A. Edwards, publisher, 1115 North 1st Street  
No. 219.  
Harrisburg, Pa.

und



Triflora 4. pedunculis trifloris solitariis, foliis angusto lanceolatis Lin. Fl. Zeyl 315 x  
Balsamina erecta s. femina, persico angusto folio, zeylanica Herm. parad  
105. t. 105

Balsamina angustifolia, floribus ternis communi pedunculo orthi Burm  
Zeyl. 21. t. 16 p. 2.

Habitat in Zeylona paludosis

Caulis erectus fructus simplicissimus purpureo fere, angulatus flexuosus  
glaber, uti folia tota planta. Folia dependente pithamae utraque  
attenuata alterna remota serrata venosa ferme. pedunculi at illam  
solitarii deflexi triflori Pedicelli umbellati, incurvi apice inaequali  
ad ultiores ciliati. involucri <sup>tri</sup> diphyllum lanceolatum carinatum  
nectarii cornu obtuso incurvo crasso vix floris longitudine

noli tangere *G.* pedunculis multifloris solitariis, foliis ovatis geniculis caulinis tumesti-  
bus. Ed. Dan. 1500

noli me tangere Colum. Epithr. 1. p. 149. 150

Balsamina Euxea f. noli me tangere Bauh. pin. 306.

Habitat in Europa, Canada nemoribus, inque C. b. p. 17

Lapensis  $\beta$ . pedunculis subtrifloris solitariis, corolla tubo conico ventricoso corolla  
calicem ante reflexo foliis ovatis pinnatis cordatis

canadensis  $\gamma$  <sup>maxburg, abbeiding. 7 ab. 15</sup> pedunculis multifloris, solitariis, corolla tubo ovato, calicem ante  
reflexo foliis ovatis basi attenuatis

Habitat in Europa  $\beta$  in Cap. b. p. 17  $\gamma$  in Canada nemoribus

Caulis erectus succulentus glaber. Folia alterna petiolata lanceo-  
lato elliptica glabra tenera venis serrata serraturis inferius <sup>minus</sup>  
setosis. Pedunculi filiformes

lanceo ovato elliptico



capensis G. pedunculata uniflora foliis ovatis, densis pilis  
Thunb. pand. pag. 44  
Habitat in Cap. b. spec.

bifida  $\sigma$  pedunculis unifloris solitariis, foliis oblongis serratis, nectario  
longo pino bifido Thunb. Prodr. pag. 46.  
Habitat in Cap. b. p. m.

non vidi