

Indigofera

xx foliis simplicibus

1. sericea 4. foliis lanceolatis sericis, spicis sessilibus, ^{terminalibus} caule fruticoso
2. oblongifolia 4. foliis oblongis sericis, racemis axillaribus pedunculatis, caule fruticoso
3. ovata 4. foliis ovatis, caule herbaceo
4. lenifolia 4. foliis linearibus canis, leguminibus globosis

xx foliis ternatis

5. trifoliolata 4. foliolis obovatis, racemis brevissimis, leguminibus reflexis rectis
6. spinosa 4. foliolis ^{caule herbaceo} obovatis, pedunculo spinoso, caule fruticoso
7. marginata 4. foliolis cuneiformibus, racemis axillaribus brevissimis, caulibus herbaceis prostratis, leguminibus Vetryonis marginatis
8. virgata 4. foliolis obovatis pilosis, racemis elongatis, leguminibus pendulis tomentosis, caule decumbente virgato stipulis semiobovatis
9. procumbens 4. foliolis ^{oleis} obovatis, racemis elongatis, caulibus herbaceis prostratis, stipulis subulatis
10. denudata 4. foliolis cuneiformibus emarginatis glabris, racemis elongatis, caule fruticoso erecto

11. *farmentosa* 4. ^{foliis ~~sub~~ peltatis} foliolis ovatis subsplatis, pedunculis axillaribus subbifloris, caule prostrato filiformi

12. *metriana* 4. foliolis ovatis subsplatis, panicula ramosa in fructu, caule fruticoso

13. *nitida* 7. foliolis ovatis acutis, racemis brevibus, caule erecto

14. *pauciflora* 7. foliis subsplatis foliolis ovatis, racemis elongatis paucifloris, ramis pedunculisque filiformibus glabris.

15. *pingens* 7. foliolis oblongis, fructibus axillaribus, pedunculis fructiferis pinnatis, caule fruticoso

16. *amara* 7. foliolis ovalibus pilosis, ramis tenacibus, fructibus pedunculatis, stipulis peltatis, calycibus laxis, caule frutescente

17. *antidotalis* 7. foliolis ovalibus subretusis, racemis axillaribus brevibus, leguminibus dectatis recurvis

18. *candicans* 7. foliolis lanceolatis linearibus subtus serratis, fructibus pedunculatis paucifloris, leguminibus cylindricis

19. *psoraloides* 7. foliolis lanceolatis, racemis longissimis, leguminibus tenuibus

20. *digitata* 4. foliis digitatis

20. *digitata* 4. racemis pedunculatis, caule fruticoso

21. *filiformis* 7. foliis quinatis linearibus cuneatis villosis, fructibus pedunculatis, caule fruticoso erecto

22. *conacea* 7. foliis quinatis obovatis mucronatis, pilosis, stipulis subulatis, leguminibus rectis glabris

**** foliis pennatis

23. argentea *F.* foliis simplicibus ternatis pennatisque pinnatis, leguminibus torulosis
pendulis
24. cyrtipoides *F.* foliis ternatis pennatisque, racemis axillaribus foliis longioribus, caule
fruticoso
25. stricta *F.* foliolis oblongis glabris, racemis axillaribus vix pedunculatis, caule fruti-
coso erecto.
26. frutescens *F.* foliolis ovatis glabris, racemis axillaribus pedunculatis glabris, caule
fruticoso erecto
27. canaphylla *F.* foliolis cuneiformibus septenis, pinnis laterales, caule depresso.
28. semi trijuga *F.* foliolis obovatis quinis, leguminibus subspicatis pendulis torulosis,
caule fruticoso prostrato
29. pentaphylla *F.* foliolis ovalibus quinis, caulebus prostratis herbaceis, pedunculibus
floris
- 24 30. glabra *F.* foliis ternatis pennatisque obovatis, racemis brevibus semi leguminibus
versibus, caule herbaceo.
31. hespita *F.* hespita, caule erecto, legu floribus spicatis, leguminibus pendulis hespitis
fimis rectis
32. angustifolia *F.* foliolis lineanibus, racemis elongatis, caule fruticoso
33. exstipulata *F.* foliolis lineanibus revolutis subtus incanis, caule fruticoso erecto

34. spicata f. folioli obovatis, floribus spicati Leguminibus Varticibus Torulosis pendulis, cau-
le decumbente.

35. onoidis f. folioli quinque obovatis subtus incanis, spicis axillaribus ovatis, caule
fruticoso.

(4-25) 36. gratissima f. folioli obovatis quinque ternisque, pedunculis subtis floris, Leguminibus
Tetragonis

37. fragrans f. folioli obovatis quinque pilosi, Leguminibus tetragonis

38. hincini f. pilosi glanduloso, floribus racemosis caule erecto

39. anil f. ^{folioli oblongis} racemis axillaribus Leguminibus distinctis recurvis, caule suffruticoso

40. unctoria f. folioli obovatis, racemis brevibus, Leguminibus rectis, caule fruticoso

41. dispersa f. folioli ovalibus, racemis elongatis, Leguminibus dispersis

Indigofera dedit Bruemanno caule prostrato, ramoso & effuso
inferne venis, pedalis, laxius

Sylvestris Andropogon foliis pennatis: foliis ovatis petiolis vellosis, racemis axillari-
bus foliis longioribus.

Habitat ad St. Martham In v. Rohr

Racemus herbaceus, angulatus, oculo armato adpressus pilis adpressis

Folia petiolata, alterna, remota, pennata cum impari bif. trijuga:

Foliola petiolata, opposita, petiolata, semipolliciana, extorserunt parum
minora, utraque vellosa, subtus pallidiora

Stipula setacea.

Racemi pedunculati, axillares, solitarii, foliis longiores. Flores parvi,
approximati. Bractea subulata, longitudine calycis.

Calyx uti bractea pilosuscula

an Ind. Piperoma Linn.? legumina non vidi

viscosa Caspia hirsuta, viscosa, foliis bijugis ovatis, glandula subulata inter infimam
racemi axillaribus terminalibusque.

Habitat in Guinea Thonning

pedalis,

Radix simplex. Caulis herbaceus, erectus; trasi lynosus; versis, striatus,

ubi totam planta hirsuta viscosa, folia petiolata, semipollicaria,

stipula subulata, patente.
stipula minor, ovata subrotunda, parum acuminata.

Racemi longitudine foliorum. Flores nutantes. Calycis incani.

Petala obovata. Stamina quinque - legumina linearia, compressa,
membranata.

Varia coloris sanguineis et flavis.

Lyb. ...

Senegalensis
~~*micronata*~~ Indigofera foliis ternatis septenato pinnatis: pinnis linearibus villosis, racemus
axillaribus foliis longioribus

Habitat in Senegal herb. La Martini

Caulis herbaceus, erectus, pedalis, ramosis, ope lentis villis adpressis. Folia petiolata, ternata, sinato vel 7nato pinnata: foliola semipolliciana et ultra, opposita, petiolata, linearia, acuta. Stipula fetida. Racemi pollicares. Flores reflexi. Calycis cinerei. Legumina pendente, lineari-falcata, compressa, angusta, cinerea fentia, micronata, submentosa, polliciana.

subulata Andropogonifera folioli oblongi, racemi elongati, leguminibus reflectis
paucifloris, caule prostrata, ramis angulatis

Habitata Guinea Thauring

Caules suffruticosi, debiles, ~~prostrata~~ angulati, ^{adpressis} que lentis villis adspersi.
Folia petiolata, ternata; foliola petiolata, vix semipollicaria
obtusissima, mucronata, arena, supra glabra fere glabra, subtus
e villis adpresso canescentia. Stipulae setaceae. Racemi axillares,
foliis longiores; fructiferi fere quinque pollicari; flores
fere inde a basi usque apicem, distantes, ^{minuti} purpurei. Legumina
~~obovata~~ ^{sub} trigona, linearia, apice subulata, vix canescentia polli-
cari.

Andropogonifera

subulata In trifolera folioli oblongi subtus. can subanacanthu; ~~tracemi~~
elongatis leguminibus pendulis reflexis pungentibus caule procumben
te

~~tracemi~~

Senegalensis Indigofera foliis simplicibus ternatis pennatisque linear lanceolatis,
leguminibus compressis pendulis subfalcati

Indigofera senegalensis herbacea, foliis pennatis ternatisque linearibus
lanceolatis, leguminibus compressis pendulis subfalcati
mis La Mart. Dict. bot. 3. pag. 240.

Habitat in Senegal herb. Fustiae et la Martini, in Guinea Thonning

cauli herbacei, basi lignosi, pedales, ramosi, laxes, erecti, ^{ut rami} ~~erecti~~
adpressi nullis adpressis. Rami elongati, teretes, superne angulati.
juniores filiformes, pilis raris adpressis acutis. folia petio
lata, simplicia, ternata, quinata vel ornata pennata: foliola
petiolata, opposita, pollicaria, lateralia parum minor, acuta,
utroque adpressa pilis albidis adpressis canescentia. Stipulae seta
ceae. Racemi multiflori, fructiferi elongati. Flores distantes, minuti,
erecti, extus pubescentes cinerei, intus dilatae corollae. Legumina
pollicaria interdum minorum vel parum majorum, linearia, canescentia,
trilobata, mucronata. Semina duo ad duodecim, tetragona, ferruginea
nitida.

tuberculatus C. foliis digitatis subpedatis septem partitis lobis petioli tuber-
culato asperis. Encycl.

Habitat in monte video 4

Caulis volubilis, teres 2-3 pedalis. Folia nuda foliola ovata
integerrima laterolata obtusata, mucronata. Petioli bipolli-
cari subtus tuberculati. Pedunculi axillares supra basin
articulati punctis geminis glandulosis foliola calycis ovata
obtusata margine parum sinuata. Corolla magno purpureo sub
cam parulata. Stigma bilobum

1 floru

non vidi

Siopana Indigofera ^{canescens} foliis lineariibus, floribus axillaribus aggregatis, ramis rostratis
angulatis ^{Leguminibus ^{torstiusculis} ~~Cylen...~~}

Habitat in Guinea West ~~Th...~~ Th...

Emiculus ^{pedalis} ramosissimus, erectus: rami tenues, tetragoni, viridi canescentes.
Folia remota, simplicia, subsessilia, semipollicaria, angustobovata, mucronata, viridi canescentia. Stipulae minuta. Pedunculi brevissimi, ut per
se nulli; pedicelli 3-4 brevissimi. Flores minuti. Legumina linearia, unguiculata, viridi canescentia, mucronata.

Mulchra

Indigofera ^{ramulorum paucifloris} ramicis axillaribus terminalibusque foliis, foliis ^{simpliciter} pennatis
ternatis pennatisque linearibusque, leguminibus villosis dispersis.

villosior

foliis simpliciter ramosior, magis villosa, foliis parum latioribus
ramicis foliis parum longioribus

Habitata Guinea tert & Thurung Ramis angulatis, ramuli

+ frequentior apice
floriferi

Stipulus erectus, teres, ramosus, virgatus, pedalis. Folia petiolata: caulina
pennata cum impari, 5que pila, ramorum superiorum ternata ^{ramulorum} vel 4

+ floriferorum

simplicia; floralia simplicia oblonga, minora: foliola linearia, ^{inquinantia} basin versus
sensum parum angustiora, acuta, ^{apice} obtusa cum mucrone, supra glabra,
tubus villis adpressis. Flores parvi, primum conferti, dein remoti. Calyx
ciliis setaceis, hispida. Legumen parvum, villis densis fusis

+ 3-4 in apice
ramulorum,

tormentum hirsutum

+ stipulos setaceo.

Laxa Frangofem folioli oblongis, rucami fructiferi elongatis latius leguminibus
verditibus, caule fruticoso virgato
Habitat in cultis Guinea Thonning 5
Emitit 1-2 pedalis ramosus: rami virgati, filiformes; cinereo purpureascentes,
& parvi. Folia ^{bracteata} petiolata, pinnato cum impari, 5-10 jugis polliciana vel
parum ultra: folioli petiolata, opposita, thymi & myrti parum majora,
avenia, oculo armato nullis raris adspersa, subtus canescentia. Petoli
capillares. Stipula setacea. Stamina minuta. Nacemi axillares 3-9 flori:
flor. ditander, parvi. Pedunculi flori ferri capillares: folio triplo lon
giores, capillares, fructiferi filiformes, siue pollicares[#]. Legumina brevia
capilla
Corolla purpurea pedicellata, polliciana, steriliuscula, fusca mucronata. Fusca, ope lenti
vili raris brevissimis adspersa. Semina oblonga, tetragona.

undulatus - Comae. foliis ovato-oblongis sessilibus, floribus axillaribus
foliis sessilibus, caule tereti prostrato Cavan.
9. vol. 3. pag. 39. tab. 277. fig. 1.
Habitat O.

Lespedeza

hendecaphylla Indigofera

Indigofera hendecaphylla Jacq. coll. 2. p. 358

Habitat in Guinea ☉

Caules plures prostrati, bipedales, ^{foliatis} teretes, glabri, inferne ramosi. Folia bipar-
na petentis pinnae pinnata & pinnulae ^{foliatis} obovatae, obtusa integerrima reticulata
aeterna fittus pallidiora ope lentis pte albidis & circumscissis. Spicae
axillares, pollicares, solitaneae, pedunculatae erectae, compactae oblongae
calyx villosus: corolla saturata rubra. Legumina rectiuscula crassiuscula
tetragona villosula, pollicaria pendula. Semina reniformia ci-
nera. Jacq.

non vid.

Dendroides Andropogon

Andropogon dendroides Gaeyh. coll. 2. pag. 357.

Habitat in Guinea

Habitat arborea composita. Caulis pedalis rectus, gracilis superne ramosus.
Folia pennata 5-12 pinnis, bipollicaria: foliola opposita oblonga acutiuscula
indurata supra, que latiuscula decumbentibus adpresso. Racemi axillares
multi. flori. bracteae minutae, calyx villosus. Corolla tubulosa. Vexillum subtruncatum
ad marginem villosum. Legumen nitidum pollicare, teres, rectum uniloculare
seminibus teretibus utriusque truncata Gaeyh

non vidi

nam in *Andropogon* Desimpit. Celeb. Auctori unde Charit. et Gaeyh. Desimpit.
1810 & cit.

anceps Indigofera foliolis obovatis, spicis fructiferis elongatis, leguminibus re-
flexis aequalibus, caule ^{9^{to}} spinuloso compresso decumbente

Habitat in Guinea Thonn. 5

Caulis pedalis, ramosus, glaber, ^{interdum subrellous} uti rami compressi, Rami ^{ancepsiter} simpliciter
alterni. Solia petiolata, pinnata cum impari; supra glabra folio-

la alterna, 6-10. unicum terminale, petiolata, vix unguiculata, sub
emarginata cum mucrone, supra glabriuscula, subtus pubescentia

stipula subulata, breves, adpressa. Racemi spicis axillares, pedunculata
to, florifero folio six longior. Flores numerosi, nunc umbriati, min

4, purpurei. Legumina recta, compresso, subtrigona. Semina obsoleta
cubica, 6. 8.

affinis spicata, ^{quam maxime} differre videtur caule compresso rigido, foliis mi-
noribus, leguminibus non torulosis. Fructu rami compressi.

Habitat in Guinea Thonn.

~~Indigofera foliolis obovatis, spicis fructiferis elongatis, leguminibus re-~~
~~flexis aequalibus, caule spinuloso compresso decumbente~~
~~Habitat in Guinea Thonn. 5~~
~~Caulis pedalis, ramosus, glaber, uti rami compressi, Rami simpliciter~~
~~alterni. Solia petiolata, pinnata cum impari; supra glabra folio-~~
~~la alterna, 6-10. unicum terminale, petiolata, vix unguiculata, sub~~
~~emarginata cum mucrone, supra glabriuscula, subtus pubescentia~~
~~stipula subulata, breves, adpressa. Racemi spicis axillares, pedunculata~~
~~to, florifero folio six longior. Flores numerosi, nunc umbriati, min~~
~~4, purpurei. Legumina recta, compresso, subtrigona. Semina obsoleta~~
~~cubica, 6. 8.~~
~~affinis spicata, differre videtur caule compresso rigido, foliis mi-~~
~~noribus, leguminibus non torulosis. Fructu rami compressi.~~

Adansonii C foliis hastatis linearibus, sepulis geminis ^{sub} filiformibus,
calyce mucronato Enéyl.

Habitat in Senegal

~~Caulis herbaeus debilis pum. villoso, procerens. Folio ^{semper} bipinnate
pinnis 3-4 pollicibus. Sepulis ^{lineari} duo angustis pinnis 2 ⁱⁿ basi ^{pedicellorum}~~

~~Pedunculis - longitudine petiolorum glabri vespis ⁱⁿ medio ^{lobis}~~
Corolla bipollicaris - pedunculis flori vix biflori

7
non vidi

caulis procerens

arenaria Indigofera peduncul⁵is axillaribus ⁷bifloris, foliis ²ternatis ³pinnatisque ⁴linearibus; leguminibus subulatis glabris
Habitat in Guinea Geit 5

Stipulus ramosissimus, rami patentissimi, obscure tetragoni, glabriusculi. Superne canescentes, rigidiusculi. Folia ternata vel quaternata pinnata cum impari: foliola semiunguiculata, linearibus sublineata, mucronata, conduplicata, parum recurvata, subtus canescentia. Pedunculi axillares, capillares, folio parum longiores, infra apices ramosum, posticum florum persistentes, unguiculares, rigidiusculi, patentissimi. Stipulae petalaeae. Legumina semipollucaria, teretia, acuta

retusa G. foliis ovatis pubescentibus subtus villosis, petalis racemis axilla-
ribus bispinis caule herbaceo.

Habitat in Guinea v. Robt.

Caulis herbaceus et maxima similitudo indiget ad totale, nec certus
seus sum num specie differat cum Luzurnia mihi non nota
differre videtur patna foliis supra glabra et non nisi acrio
amato pilis paucis brevibus conspicuis, retusa vel emarginata

[Indigofera]

21-22 fulvescens Andigofera racemi foliis pinnatis oblongis, racemi elongati Legumini-
bus polyppermis

Habita prope Gaiam in Vicinia S. Martha de v. Rohr ex herbano
Dr. Lund.

Caulis herbarius ramosis, angulatis, pilis ad centem ^{adpressis adpressis} pilis ^{anis, ad}

^{pressis} ^{remota} folia pennata, ^{vel 7na} pinnis impari, quinque. foliola breviter petiolata,
opposita, unguiculata vel parum longiora subaequalia, oblonga, mucosa
nervi obtusa, mucrone brevi terminata, utroque oculo armato
pilis adpressis rarioribus, subtus pallidiora.

Stipula setacea, brevis.

Racemi axillares, solitarii, foliis ^{triplo} duplo vel triplo longio-
res, multiflori. Core sparsi. Bractea setacea ad basin sin-
guli pedicelli.

Legumina subulata, recta, reflexa, canescente, unguiculata.

colorata ^{Indica} *F. incana*, folioli lanceolato oblongis, racemi axillaribus
foliis longioribus leguminibus teretibus nodosis incurvis

Habitat in India orientali Rottler no 102

Caulis fruticosus erectus uti tota planta a tomento tenuissimo
in axis folia petiolata alterna emota, 2 paja. foliola
petiolata opposita vel alterna lanceolato oblonga integron
minora minima terminale pollicae avenia utrinque
acuta. stipula filata pubulata. Racemi axillares solita
rii foliis duplo longiore multiflori. Floi pauci legumini
teretia subpendentia.

Indigofera menicata folioli 3-10 oblongi alternis, racemis simplicibus longe
pedunculatis, caulis prostratis - Ort. Dec: pag 98.

Habitat in insula Cuba 4

Cuneifolia Indigofera foliis cuneiformibus subtus canescentibus, spicis cylindricis, caula fructuosa.

Habitat in Cap. b. spec. Sonnerat herb. Mus.

Frutex rigidus. Rami striati, angulati, sparsi canescentes. Folia triplicia breviter petiolata, pollicaria vel parum ultra, supra glabra, avenia, mucronata breviter terminata. Stipula minuta, setacea. Spicis terminalibus subsessilibus, multifloris, bipollicares et parum ultra. Bracteae subulatae, persistentes, patulae, Calycis imbricati.

Indigofera

Colutea maderaspatensis filigerosa flore nudo specato Hort. sic: Petri Ray vol.
3. append.

Habitat in India orientali ex herb. Musci

Caulis superne angulatus. Folia bipinnata, opposita: foliola petiolata oblonga, mucronata, opposita, obtusa, semi-pollicaria, vixidia, oculo armato villis mucronibus adpressis. Stipulae caducae, setaceae. Racemi foliis dimidiis breviores. Flores plerumque distantes, parvi. Calyces senarii. Bractea subulata, longitudine calycis.

Indigofera

Habitat Commesf. herb. mus:

Legumini decrant describenda ex praeterea

flexuosa Indigofera

Habitat Composita herb. mus.

Caulis pedalis. Legumina tonlofa, panem in curva

reliqua prore ex specimenis communicato

Indigofera

Habitat in Insula Francia herb. mus.

Caules filiformes, inferne ramosi, simplicis. Diffusi. foliis la 2-3 paja

reliqua petenda est specimen

Indigofera Coles Vernatis quinatoque pennatis lanceolatis, racemi axillari
bus foliis congestis.
Perezal Herb. Desfont.

Caulis filiformis, procumbens, glabris. Foliola foliorum Vernatorum oblon-
ga, pennatorum lanceolata, ^{subtus glabrescentia} utriusque pilis adpressis vixi canescentia.
Stipula setacea. Legumina pendula, compressa, unguiculata, linearia
incurvata, villosa, tetrasperma. Semina quadrilatera compressa.

flexuosa Andropogon

Habitat in Angula ~~Francis~~ Commes. herb. Desfont.

Frutic. Caulis glaber. Folia bipolliciana, tri-quadrijuga: foliola petiolata, unguiculata, interiora minorum, opposita, oblonga, basi acuta, supra glabra, subtus ovato armata siliis aliquot adpressis. Stipula subulata, parva, evanescentes. Racemi axillares, sessiles, foliis breviores, semipollicares. Peduncululi ^{vel} capillares recti. Legumina declinata, indurva, compressa, glabrescens, semipolliciana vel parum ultra.
an varietas tinctoria?

Indigofera

Habitat. Herb. Desfont.

Rami teretes vixes, retrosum villosi. Folia petiolata, ternata: foliola ob-
ovata, sessilia, unguiculata, mucronata, villosa, subtus canescentia. Stipula
la pubulata, petiolo parum brevioris. Racemi axillares, foliis multoties
longioris. Flores solitarii vel geminati, inferne remoti. Germena hirsuta
albida.

Indigofera

Hort. Paris. herb. Desfont.

Caulis lignosus, ramosus, erectus, villosus. Folia sesquialtera, remota: foliola oblonga, unguiculata, canescentia. Stipulae betaeae. Racemi axillares, foliosiferae aequantibus. Flores remoti. Legumen lineare, incurvatum, teres, rectum,

Semipollicare
herbino proximo

tinctoria Indigofera foliis pinnatis obovatis, stipulis ~~setosis~~ racemis brevibus, leguminibus
rectis, caule fruticoso.

Indigofera Koer. foliis semisessugis cuneatis, racemis foliis brevioribus, legu-
minibus rectis, teretibus villosis Torrill. desf. pag. 137.

Indigofera tinctoria foliis pinnatis obovatis, racemis brevibus caule fruticoso. Lin
S.V. pag. 670.

Indica, foliis rosmanii, glabris affinis Bauh. Pin. 113.

Anil s: indorum Nil indorum color Bauh. hist. 2. p. 945.

Indicum Rumph. Amb. 5. p. 220. t. 80

Ameri Khaed. Mal. 1. p. 101. t. 54.

Habitat in India &

Caulis erectus teres simplicissimus, lavis, aenrospens. Folia bipollicaria
5 ^{foliola} sessugis, cuneata, pubescentia, submarginata, mucronata. Racemi
axillares subsessiles pollicares. Legumina pendula subtrecis pedunculata
Co universalis duplo longiora raris pilosa mucronata.

Engelb. Madagascar

anil Indigofera foliis pennatis, racemis axillaribus Leguminibus ^{pedunculatis recurvis} foliatis, caule
suffruticoso

Indigofera Anil, foliis pennatis: ^{canaliculatis racemis brevibus caule suffruticoso} foliolis ellipticis acutiusculis, Leguminibus
An. Mant. 272. * S.V. p. 678.

Habitat in Andra p.

Racis ⁵⁻⁶ traxione. Caulis caeteris angulatus, cinerascens. Folia palmata. Foliole
oblongo, unguiculari, basi acuta, apice mucronata intimo mucrona

Hypulo ^{supra glabra subtus incana} supra glabra subtus incana. Racemi axillares solitarii, foliis brevioribus.
Pedunculi a caelo florum denticulati a basi ad apicem usque fliferi.
Legumina teretia fucula unguicularia, mucronata, sutura utraque gibbosa
Emenis siliqua incurva est quo ponitur Andro Plum. herb

4us

hirsuta Indigofera hirsuta foliis pennatis, caule erecto, floribus spicatis, Leguminibus
pendulis hirsutis semine rectis. Lin. cl. reyl. 272 + L.N. p. 578.

Kattu Tagera Rheed. Malab. g. p. 55. v. 30.

Astragalus spicatus, foliis pendulis hirsutis, foliis pinnatis Burm. reyl. 37. t. 14.

Habitat in India

Caulis teres, hirsutus prostratus superne uti folia. ^{palmaria et ultra} Polia qua drucega: foliola
unquiculana elliptica basi pedicelata basi acutiuscula apice obtusissima cum mucrona
Stipula petiolaria ^{in eodem numero} spicae floris foliis breviores glandiferi longiores fere spithamei longa
pollicares ^{germina} albida hirsutissima. Legumina tetragona unquiculana

in Indigoferis foliis pennatis frequens est quod par utimum foliorum minor
23 quam hanc uter impar major reliquis

endempta Indigofera

Habitat in Cap b-pri herb Royeni

Caulis plures, suffruticosi, diffusi, ramosi, teretes, ope lentis pilis albis retrospi adpressi.
Volvula petiolata, ternata: foliola sessilia, unguiculata, obovata, villosa, subtus incana,
mucronata. Stipula lanceolata, conjuncta petioli. Racemi axillares, elongati. Flores
solitarii & approximati, subpedunculati, remotissimi. Calycis laciniis setacea.
Legumina pendula, semi pollicaria, incana, acuminata. Bractes decidua.

glauca Indigofera

Habitat in Cap. b. spec. 4

Caules herbacei, diffusi, subramosi, spithamei,culo armato pilis raris edpressis.
Folia petiolata, distantia. Foliola fissilia, vix anguiculana, obovata, mucronata, supra
nudiuscula, subtus cuncta serena e villis distantibus, adpressis, culo armato videndi.
Stipulae subulatae, petiolo breviores. Racemi axillares, pedunculati, folios tripla
longiores, cuncta serena. Bractea subulata, longitudine calycis. Calyx cuncta
serena, dentibus subulatis. Flores parvi

Sophoroides Indigofera

Habitat in Cap. b. spec. herb. Royen.

Rami teretes glabri: Ramuli subcompressi. Folia sparsa, pennata, 4-5-juga: foliola
crassa, rigida, obovata, et tenuiora majora, emarginata cum mucrone, glabra. Stipula
minuta, subulata, caduca. Racemi fructi, folio longiores

phylloides Indigofera

Habitat in Cap. b. p. c. Aeth. Naya. 3

Terdet ramis tuberculatis, glabris, ramulis superne approximatis, incanis. Folia
frequenter, patentissima, lineari lanceolata, acuta, unguiculata, supra glabra,
nitida, revoluta, subtus villosa, caerulea. Flores in capitulis oblongo, Ind. p. n. c.
Calyx sericeus.

umbellata Indigofera

Habitat in Cap. b. spai heb. Rozeni

Caulis herbaceus, procumbens, oculo armato subullosus. Folia petiolata, ternata: foliola obovata, unguiculata, acumina brevi terminata, vel obsoleta emarginata, sessile, glabra, crassa, arenia. Stipula parva, lanceolata, acuta. Pedunculus terminalis, elongatus. Flores terminalis, subumbellati, magnitudine loti cornicis. Bractea ad basin pedicellorum, et duo minuto in oppos. pedicello. Calycis laciniis ovata, glabra.

Citrea Indigofera foliis obovatis subtus senescentibus, racemis axillaribus foliis suboppositis,
caule fruticoso

Totifolium spicatum lacteum, venis subtundis foliis apicibus sinuatis serratis
conuagine & utris subsenescens argenteis an *Citro* affinis *Lagopodium* des. Plukenet
alm. 84

Habitat in Cap. b. p. i. Herb. Tus.

Rami canescentes, teretes, superne compressi. Folia ternata, petiolata,
Foliola obovata, terminata & emipolliares. Catenulae parum minorum, pubescenter
genuata, supra glabra, subtus villosa subsericea. Petioli inani. Stipula lanceo-
lata, attenuata, striata, semipinnata, margine villosa. Racemi axillares.
Bractea ovata, striata, semipinnata, decidua. Legumina juniora, pubescentia.

*Strobilacea Indigofera foliis Vernatis quinatoque pinnatis, foliolis cuneatis, spicis axilla-
ribus bracteis imbricatis*

Glycyrrhiza americana herb. Vaillantii

Habitat in America herb. mus.

Caulis fruticosus, erectus, ramosus, in proce tenax, glaber, superne angulatus sic albidus culis
uti folia utrinque, canescens. Folia petiolata: foliola breviter petiolata, oblonga
basin versus angustata acuta, apice obtusa cum mucrona, polliciana, in Venoni
municra, utrinque oculo serrato julis adpressa adpressis sic albidis stipula
setacea; seta parva ad basin singuli pediculi partiali. Pedunculi axillares, foliola
obovatis, antatis cinerascens huius imbricatis tacti. Flores solitarii sessilibus subspi-
culo squama. Calycis laciniis vicariis, parvis: laciniis setaceis.

scabra Indigofera folio quinato pennatis cuneatis scabris mucronatis, racemis
multifloris

Habitat herb Vaillont

Rami superne Inguetii, incani. Soliola polliciana, oculo armato ad prespe
pilosu. Racemi tripollicares. Peduncululi mucronati post capum florum. Brac
tea scaberrima, incana. Flores glabri
forte ab Indigofera Cytifada non diversa

mullenoides Indigofera, foliis lanceolatis glaucis, racemis axillaribus foliis brevioribus

Leguminibus moniliformibus

Habitat in Insula Francis Commes: in colis bois de sable dicta Herb. Mus. 3

Rami inferne teretes, supierentes, superne compressi cinerofientes a villis villo
lo armato videnti, e caespit foliorum cicatricato, tuberculati. Folia subtriji
lia, bipollicaria, utrinque acuta. Stipulae utrinque minor. Racemi paten
tissimi, multiflori, foliis breviores. Pedunculus angulatus, post caespem foliorum
cicatricatus. Bractea minuta, rigida. Calyx cinereus, subbilabatus, quinque
dentatus. Vexillum subrotundum, apice fornicatum; alae vexillo breviores, ob
longae, unguiculatae: unguis latiusculus: Carina unguiculata, longitudine
alae. Legumina circurva, subtripollicaria, torulosa, margine utrinque cincta
articuli oblongi. Semina videnti esse reniformia.

babuta Indigofera

Indigofera babuta Lamour.

Habitat in cap. b. p. p.

Rami verticillato-aggregati, adscendentes, uti margines foliorum hirsuti, rufi, foliis tecti. Folia conduplicata, pollicaria, pungentia. Calycis in apice ramorum, plures, purpureo hirsuti, quinque fidi: lacini in pinnulam flexilem deponentes. Stylus calyce longior.

Socii Bourbonia trinervis

^{nicotiana,}
Andryopora foliis ternatis oblongis, racemis axillaribus folio longioribus;
ramis compressis

Habitat in Cap. b. p. her. h. Mark t.

Tota nicotiana. Caulis ramifera: ramis e linea utraque decurrente anagyris.
Folia petiolata: foliola sessilia, unguiculata, acuta. Stipula minuta
subulata. Racemus bipollucaris, ^{vel. pedunculatus} multiflorus. Corolla glabra; vexillum
extus oculo armato villosum. Calycis lacini subulata.

anagyris h. Mark herb

Simpliifolia Indigofera

Habitat in India reb. La Mart.

Caulis heres, glaber. Folia simplicia, pollicaria, sesipia, linearia, y labra, subtus
oculo armato villosa. Legumina heres, axillaria, solitaria, longitudine
folii, mucronata.

tenuifolia Andryofera foliis pinnatis: folioli lineariibus, racemis elongatis

Habitat ad La Mark.

Caules tenues decumbentes, purpurascens, glabriusculi, ramosi. Foliole
petiolata, saepe pinnatis: foliola opposita, sessilia. Stipulae setosae.

Peduncululi saepe pollicares. Flores parvi. Calycis imbricati.

Compositae Indigofera

Habitat herb. La Mark.

Caulis dichotome ramosus: rami ad dichotomias dilatati, striati. Folia qui
nata per nata: foliola minuta linear-oblonga, acuta, ciliolata. Hy-
la setacea. Racemi axillares semipollicares.

Les filifolia Infructu foliolis quatuor lobis cuneiformibus incanis, racemi
axillari folio longioribus
Habitat. Pedra la mar.

Tanella Andropogon racemis axillaribus paucifloris, foliis linearibus oblongis alternis, levi
membra tritricostis viti

Habitat in insula Bourbonis Commerson ex herb. Turcici

Tritricostis humilis, palmaris vel parum ultra, ramosus, tenuis, pilosiusculus.

Solia vernata sp. ad pres. #. Foliola petiolata, intermedium unguiculare, lateralia triplo
minora, omnia petiolata obtusa, ad ungue oculo armato adpressa pilis albi
dis decumbentibus. Stipula parva linearis. Pedunculi axillares semipol
licares. Flores 4-5. Calyces villosi, cinerei. Legumina nutantia, semipolli
caria, interdum subtrilocata, glabriuscula.

Specimen aliud ab observari caule pedali, determinate ramoso, ramis
simplicibus.

sennofolia Indigofera foliolis oblongis mucronatis: supra glabris, racemi foliis
brevioribus

Habitat in Insula Francia Commis. ex herb. Turici:

Caulis fruticosus, super teres, superne canescens. Folia pennata, 4-
vel 6-paga: foliola pollicaria vel parum ultra, breviter petiolata, sub
tus villis raris decumbentibus oculo armato videntis. Stipula setacea.
Petiolum supra canaliculatus. Radici breves semipollicares. Flores
parvi aureo-villosi. Bractea setacea.

virginiana Indigofera

Habitat in America boreali herb. Ruth.

Caulis herbaceus, erectus, glaber. Folia pennata, 5 que paja; foliola cuneata, unguicu-
lata, ore ceteris villis brevibus raris, mucronata. Stipulae petiolo. Racemi foliis
longiores. Legumina glabris oblonga, utraque alata, monosperma.

Diphylla Indigofera: foliolis geminis

Habitat ^{ex Ind.} *Indica*

Caules herbacei, ramosi. Rami decumbentes, simplices, inani. Folia petiolata, gemina, unicum terminale, majus, saepe semipollicare, oblongum, alterum versus basin petioli, parum minus, ad rotundiora: omnia petiolata, obtusissima, viridi canescentia. Stipulae subulatae ferrugineae. Racemi axillares, unguiculares, foliobreviores, multiflori. Flores conferti. Bractea sativa. Calycis cinerei. Corolla glabra. Legumina non idi:

aniceps Andigofem cal foliolis linearibus oblongis, acuminis foliis longioribus, caule
ramisque anticipitibus compressis

Habitat in Madagascar Commerc. ex herb. Furdici &

Truncus habitu genuta tridentata. Caulis alter natim ramosus, uti rami com-
pressus, aniceps, glaber, fuscatus, margine remote dentatus: dentibus folii-
floriferisque. Folia ternata; foliola minuta, ope lenti villosula, acuta.
Stipula minuta, subulata. Pedunculi capillares, quinqueflori: Flores
parvi, calycis uti sextellum exher cinereum. Legumen teres, rectum, semipelli-
cure, glabrum, lase, mucronatum.

biflora 9.

Pluken. tab. 166. fig. 1

Hort. malab. 9. tab. 36

Habitat in India orient. Dedit Burzom

Myrica foliis lanceolatis serratis utraque acutis glabris

Seneca Indigofera foliis simplicibus lanceolatis sericeis, spicis sessilibus, caule fruticoso.
Len. Mart. 2714 h. v. p. 677.

Habitat in Cap. b. sp. in Campis arenosis, montosis humilibus &

Caules proleseri, rami filiformes, a cicutis nulis scabri, ramuli foliosi.

Folia conferta, elliptico-lanceolata, brevia, acuta, pubescentia. variant
margine nudo colorato. Spica terminalis sessilis crata, villosa, interfructa
bracteis longitudine calycis. Corolla petalis reliquis brevior, lingua unguicu-
lata. Simellima Hispania Seneca

an specimen herbarii nostri. Diversa. Ramis simplicibus foliis margine involuti (salem
foliis rariis latioribus planis) supra glabris, subtus villosis, semiunguiculari-
bus. Flores in apice ramulorum axillari calycibus corollis que extus
sericeis unguiculis petalorum sericeis longitudine lamina.

Genista tinctoria copensis purpurea foliis sericeis. Pater Garzoph
V. pag. 11. herb. Royeni

42

Glycyrrhiza plicata Americana Plum.

Habitat in Amer. herb. Mus.

Folia quinato-pinnata: foliola oblonga pubescentia. Stipulae
setosae. Flores non admodum.

Ornithoglossum

Mullenöder 4

Habitat in Insula. prunice. Comme son micole bois de sable

~~Composita~~ Indigofera

Indigofera quinquefolia retusa DC. end.

1-2 Linifolia Indigofera foliis simplicibus linearibus canis, leguminibus globosis
Hedyfarum Linifolium foliis simplicibus linearibus canis, caule prostra
to, leguminibus globosis L. Suppl. pag. 331. * V. pag. 672.

* Sub nomine Indigofera Linifolia nuda fuit una cum semineibus a Ronigerio
et resere Indigofera est, ~~ca~~ Carina enim utrinque calcitrata est ut
in omni Indigofera, ~~nam in hoto habui~~, ~~fuit~~ ~~nam~~ ~~alena~~ ~~at~~
Hedyfarum: ~~nam~~ ~~in~~ ~~hoto~~ ~~habui~~

Caules prostrati: ~~gigiformes~~, ~~ergati~~. Rami ^{iniani} ~~filiformes~~ ~~filiformes~~
arapetes. Folia remota ~~in~~ ~~unquicula~~ ~~na~~, ~~me~~ ~~donata~~ ~~acuta~~
~~Racem~~ ~~an~~ ~~ella~~ ~~Stipulo~~ ~~Deciduo~~ ~~acuta~~ ~~stipulo~~ ~~Racemi~~
~~axillares~~ ~~foliis~~ ~~brevior~~. Legumine magnitudine ~~in~~ ~~repi~~ ~~negri~~
~~iniana~~

+ Habitu in India orientali

revoluta An. foliis lanceolatis ^{marginibus} revolutis subtus villosis specieis terminalibus
Habitat in Cap. b. p. 5

Teretis humilis rami aggregati a caepe foliorum teretium
folia frequentia sessilia basi subovata, supra glabra, acuta
semiunguiculata flores in summis axillis sessiles conferti

Calyx ~~5~~ penticus

similis And. pricea differt vero notis in differentia habitus

12. oblongifolia ^{Andigofera} ~~Andigofera~~ foliis simplicibus oblongis ~~sericeis~~ ^{sericeis}, racemis axillari-
lambis, caule ~~erectis~~ ^{erectis}

Andigofera oblongifolia; foliis simplicibus, oblongis petiolatis,
ovali oblongis; caule ~~erectis~~ ^{erectis}, inermi, diffuso; florum
racemis axillaribus. Vestib. de fr. pag. 137. no 26.

Trites ramis ^{to} ~~sericeis~~ ^{sericeis} ~~sericeis~~ ^{sericeis}
folia simplicia, ^{subsessilibus} ~~oblonga~~ ^{oblonga}, ~~base in petiolum definita~~, ~~sericea~~, ~~remota~~, ~~bilinearia~~. rudimenta ramulorum in axillis
tripulo minuto, setacea.

Racemi axillares, folio 3 plo longioris. Flores numerosi

Calyx sericeo-tomentosus.

Vexillum cinereum tenuispine vellosum.

Habitat in arabia

compressa f. foliis subternis formibus villosis, racemis axillaribus calycibus
unicanis, leguminibus vexillis subulatis, caule fruticoso
Habitat in St. Martha 5

Descript. quor. inter americana

~~Cinerea G. Leguminibus fructis patentibus pedunculatis, racemis oppositi foliis,
foliis mucronatis subtus villosis Am. acud. sp. 403, t. æqu. Coll. 2. p. 333.~~

R. V.

~~Galega herbaica subcinerea villosa, foliis oblongis pennatis, fructis latiori
bus de alar Brown. Jam. 284.~~

~~Habitat in Jamaica~~

ovata Indigofera foliis simplicibus ovatis, caule herbaceo Lin. Suppl. p. 335. L. V. pag. 677
Habitat in Cap. bono spei

non vidi.

indica A. foliis quinatis sessilibus; pedunculis unifloris Lin S. V

Manellia Theod. Mal. g. p. 69. t. 37.

Lotus Vernifolius maderaspatanus; siliqua trigulari glabra Plukn. alm.
225. t. 201. fig. 2.

Genista foliis quinatis sessilibus; pedunculis axillaribus capillaribus
unifloris, floribus minimis Lin fl. Seyl. 2717

Habitat in India orientali &

Caulis erectus ramosus. Ramificati. Folia lanceiformia ore latis-
simo consimili adpressi adpressi minutis pedunculis axillari-
solitariis unifloris. Legumina unguiculata Vernifolia
Anil maderaspat. foliis minimis confectis Petrus herb. Mus

applanthodes 7. foliis ternis quinatisque sessilibus

And yofes species

trijolata Indigofera foliis ternatis ovatis racemis brevissimis, leguminibus reflexis
rectis.

Indigofera trijolata, floribus sessilibus foliis ternatis floribus sessilibus
lateralibus Ken. Aman. ac. 4. p. 327. & L. V. p. 677.

Habitat in India

Caulis herbaceus parum angulatus raris pilosis. folia ses qui polliciana
foliolo vix unguiculata terminale majus, cavities emarginata
mucronata ut pilosa. Racemi brevissimi ut fere flores fere sessiles appa
rent, minuti. Legumina tetragona mucronata pilosissima latentes
appositi latioribus, polliciana, infra folia, ut normum enim flores
reflexati, folia cadunt infra flores

Stipula setacea
minuta

antidote^{la} Indigofera foliis ternatis ovalibus subterfisi, racemis axillaribus brevibus
leguminibus declivatis recurvis
Nix-pulli Rheed. Mal. g. p. 67. t. 36.

Habitat in India

Caulis erectus obscure angulatus, simplicissimus leviter pilosus. Folio
remota. ^{in pilos} ^{le pilis super} Follicula elliptica basi acuta apice subterfisa, mucronata
supra glabra ^{subterfisa} ^{subterfisa} albida. pollicaria, terminale
reliqua duplo ^{major} ^{subterfisa} latentia brevis petiolata. Stylis 3. ^{subterfisa} ^{subterfisa} mi-
nuta. Racemi pollicares erecti multi flori. Legumina unguiculata
mucronata, inaequalia.

Indigofera

antidotalis Indigofera

2-3 Spinosa Andigofera fruticosa, foliis ternatis obovatis, pedunculis glabris
spinescentibus

Andigofera spinosa, leguminibus binatis, teretibus scabris, caule fruti-
coso diffuso, spinoso versu. Descrip pag. 137. no 27

Frut ex caudice cinereo, ramosis simis. Rami digitales, attenuati,
apice truncati, aphylli; Ramuli foliiferi, pauci in ramis senescenti-
bus, breves spinosis simi, et pedunculis persistentibus spinescentes: Rami
ei foliiferi, pauci in ramis senescentibus; breves. int. minut.

Folia ternata, brevissime petiolata: foliula obovata, sessilia,
canis canis squalia, minuta passim minuta
stipula ad causa, minuta.

Pedunculi spinescentes, unguiculati, ex omnibus sex acellis,
persistentes, biflori vel triflori, folio duplo longiore.

Calyx bilobus, quinq; fidus.

Corolla: sex cellis ex sex cinerascens

Legumina teretia scabra, illoso int. cano pubescentia sub totum

Toribaleus putat hanc Indigoferam eisdem esse generis naturalis
ac Hedysarum alhagi, sed rationem sane non perspicio, sentis enim
specis et Corollis rubris, nullam affinitatem invenio. Tacem vero
Indigofero, quamvis fungosa, et Corniculas ad latera carinis, habet
Indigoferis essentialis habet, in Alhagi vero de sunt. ~~Indigofero~~
~~e similitudine a radice infusa nullam affinitatem~~ ~~Indigofero~~ ~~alhagi~~
~~est quoniam multo alius est~~

Specimina etiam ex Ind. Orient. habui

^{uniceps marginata}
triquetra Indigofera foliis ternatis lanceiformibus, racemis axillaribus brevissimis, caulebus

herbaceis prostratis

Habitat in India &

Caulis brevissimus ad radicem ramulosus. Rami prostrati, palmares filiformes, tri-
lobancipitibus, ^{cinereis} simplicibus. Folia petiolata foliola semiunguicularia pilis
fuscis. Pedunculus ovalis, sif. 6 florus. Legumina subsessile unguicula
nerv. pilosiuscula, tetragona latibus oppositis majoribus marginatis

vergata Indigofera foliis ternatis ^{obovatis} cuneatis pilosis racemis elongatis leguminibus pendulis
tomentosis, caule decumbente vergato

Habitat in Cap. b. hui

Caulis suffruticosus, teres. Rami incani. folia petiolata remotifolia.
Siliola semunquiculana subtus pilifera cinerea mucronata. Stipula
semicordata petiolo brevioribus. Racemi axillares et terminales.
Flores remotiflori. Legumini unguiculana incana vesetia
pedunculo appressa. Pedunculum palmans

procumbens Indigofera foliis ternatis obovatis, caulibus herbaceis prostratis, racemis elongatis Len. Mant. 2717 S.V. p. 677

Habitat in C. bonap. 2

Caulis plures subramosi nudiusculi, angulati semipedales. Folia ^{remota} petiolata
foliola unguicularia, subequalia, mucronata, supra nuda subtus
pilosa incana. Stipula subulata longitudine fere petioli. Pedun-
culi axillares pithamoi glabri versus apicem floriferi. Flores remoti
breve pedunculati. Legumina reflecta

denticata Indigofera foliis cuneiformibus ^{glabris} emarginatis, racemis ^{glabris} elongatis, caule
fruticoso erecto

Indigofera denticata. Foliis ternatis ovatis glabris, racemis pedunculatis
foliis longioribus, caule fruticoso erecto Lin. Suppl. p. 334 L. V. p. 677.

Habitat in Cap. b. peitz

Caulis angulatus ramosus. Rami pubescenti. Folia petiolata. Foliola
semunquiculana fissilia. Racemi laterales erecti, palmari. Caly
ces glabri

Mexicana Indigofera folio ternatis, panicula ramosa in spicas, caule fruticoso
Habitat in Nova granada &

Ramis terebrantei, pubescenti. Folia remota petiolata. Foliola ovata,
nuda, sessilia. Squamula ovata minuto. Panicula terminalis spicis 8.
s: 9. pedunculatis.

-trita Indigofera foliolis ternatis ovatis acutis, racemis brevibus caule erecto Lin. Suppl.
pag. 3354 S.V. p.

Habitat in India

Caulis erectus viridis facie Ind. Anil, inferna ramosus. Folia ternata, petio-
lata, ovata, lanceolata, acuta, viridia. Racemi laterales, foliis breviores,
erecti, rubicundi facie. Anil. Lin.

non vidi

Sarmentosa Indigofera foliis ternatis ovatis subsessilibus, pedunculis axillaribus subbifloris,
caule prostrato filiformi Len. Suppl. pag. 334. S. V. pag. 677.
Habitat in Cap. bono spei

non vid.

racemiflora Andropogona foliis ^{obtusis} ternatis subsessilibus ovatis, ^{multinatis} racemis elongatis paucifloris, caulis
~~racemis~~ pedunculisque filiformibus Leguminibus glabri

Habitat in Cap. b. frei?

Caulis decumbens suffruticosus, ramosissimus vergatus, glaber. Folia remotuscula
Sociola parva subtus cinerea, multinata mucronata reflexa brevis petiolata
Racemi axillares et terminales apice floris 4-5 remotusculi parvi
Legumina unguiculata subteretia, torulosa, acuta
an ononi filiformi hanc

pungens Indigofera foliis ternatis ^{trici} racemis axillaribus pedunculis fructiferis legum
pnefcentibus, caule fruticosa

Habitata India

Rami angulati fructi, cineri. ^{vel obovata} Folia petiolata pollicaria. Foliola oblongo
supra glabrescunt subtus cineripentia, ~~ax~~ unguiculata. Spica
tipulose ^{tipulose} ~~tipulose~~ axillares foliis ^{lespyles} parum longioris, multiflori. Pedunculi floriferi sequi
pollicares rigidi. Legumina reflexa pedunculo longioris, ~~et~~ ^{ut} ~~trigonis~~ ^{pedunculo post caput}
in mucronem pungentem deprentia, cinerea.

lob
mu) Anil maderipatam trifoliatu fleguis carinatis hortic florum.
Anil pormedum trifoliatum glaucum fleguis rigidis de
philos. Angl. no 267. pag 714. pl. P.
foliola obovata

amona 4 foliis ternatis ovalibus pilosiusculis, ramis verticibus; pinnis
pedunculatis; stipulis setosis, calycibus latis, caule frutescente.

Hort. Kew. 3. p. 60.

Habitat ad Cap. b. p. 5

Candicans 4 foliis ternatis lanceolatis linearibus subtus sericeis, spicis
pedunculatis paucifloris, leguminibus cylindricis Hort. Kew. 3.

p. 67.

Habitat ad Cap. b. Spei

non vid.

Psoralea Desf. *Diogosera* foliis ternatis lanceolatis, racemis longissimis, leguminibus ternis
Linn. S. V. p. 677*

Trifolium Ethiopicum ex alio speciatum Plank. Phyt. 320. fig. 3.

Cytisus *Psoralodes* specis pubescentibus, ramis angulatis, foliis lanceolatis,
caule suffruticoso Linn. Am. acad. 6. p. n. 33.*

Habitat in Cap. b. part.

Caulis angulatus a petioli decurrentibus cassis 3. ~~pubescentibus~~ cinerascens.
Folium unguiculatum, mucronata linearia subsessile, petiolo bipollicari
stipula setacea semicirculari. Pedunculi folio triplo longiores apice
floriferi, flores contigui ^{conjugi} nutantem Racemus obovatus. Bracteae setaceae
deciduae. Legumina 3esqui pollicaria, teretia, scaberrima

Digitata Indigofera foliis digitatis, racemis pedunculatis, caule fruticoso Sen. Synopt. p. 335.

L.V. pag. 670

Habitat in Cap. b. p. 1/2

argentea Indigofera foliis simplicibus ternatis pennatisque seneciis, Leguminibus ^{globosis} ~~articulatis~~

~~to pendulis~~

Indigofera articulata Leguminibus pendulis articulatis, foliis simplicibus, ternatis pennatisque incanis Jouan Illustr. pag. 49.

Indigofera argentea foliis pennatis: foliolis obovatis tomentoso seneciis: impari maiore Lin. Mant. pag. 273.

Indigofera tinctoria Boiss. Deser. pag. 138.

(Descriptionem vide in Jouani Illustrationes Bot. loc. citato

Caulis

habitat in Arabia et America

Caulis erectus angulatus tomentoso incanis. Folia petiolata, infima simplicia superiora ternata, suprema quinata pennata opposita foliolo obovato emarginato seneciis nitida unguiculata.

Racemi axillares foliis duplo breviores. Legumina incana

habe
mini:

(Galega aegyptiaca argentea parvis flore phoenicea
Hedysarum argenteum parvis flore phoenicea Leppii
Legumina globosa vel biarticulata, articulis globosis

~~argentea Indigofera Legumin~~

cytisoides Indigofera foliis pennatis ternatisque racemis axillaribus foliis ^{Congonphy} ~~oppositis~~
caule fruticoso

Geneta capensis junosa, legumini folio pentaphyllos, floribus purpuras
nibus Pluk. Voyt. 105. fig. 5.

Lotus africana frutescens, flore speciato rubicundo Com: hort. 2. p. 167. t. 84.

Pforalea cytisoides foliis quinato-pennatis ternatisque, racemis axillaribus
Linn. Spec. pl. pag. 1076*

Habitat in cap. b. Speitz

^{Rami} ~~caulis~~ sulcato-angulatus e castris foliorum tuberculatis. Folia infima
ternata, superiora quinato-pennata foliolo obovata, mucronata
utrinque ciliata pilosa cinerascens & unguicularia. Peduncululi
dentatus. Bracteae ovatae deciduae. Legumen subcylindricum, ^{superne cinerascens} ~~est~~ ^{hinc}
limina destergentibus

mucronata e Manih. secund. spec. herb. hujusmodi differre videtur
folia lanceolata-oblonga, basi angustata, tanquam villosa, sub
laescentia, obtusa mucronata, pollicaria. Stylus subulato. Ra
cemi densi, longitudine foliorum

filiformis Indigofera erecta foliis quinatis linearibus cuneatis, ^{vellosis} pediculis pedunculatis, caule
Indicosis erecto

Indigofera filiformis erecta, foliis quinatis oblongis, floribus pediculis pedun-
culatis, pedunculis ramisque filiformibus Len. Suppl. p. 334. S. V. p. 670

Habitat in C. bono paitz.

Caulis ramisque teres. Rami teretes pilosi. Folia subsessilia. Siliola multilocata

Stipula subulata. Semiinquinularia, juniora margine revoluta, subaequalia. Spica
foliis quadruplo longioribus, filiformes apice floriferi. Flores conferti apud
Cinereis. Corolla extra pilosa

Coriacea 4 folus quatuor obovatis mucronatis pilosis; stipulis subula-
tis leguminibus rectis glabris Hort. Kew. 3. p. 60.

Ononis mauntanica

Lotus fruticosus

Habitat in Cap. b. p. 5

pedunculata

Rami et ramuli villosi incani uti foliola et racemi,
folia brevissime petiolata. foliola ^{femurquiculata} obcordata cum mucrone
stipulis subulata. Pedunculus axillares bipollicem
flores conferti in spica ovata vexillar incanum

Ononis mauntanica Lx. *Lotus fruticosus* Berg

~~mitte ignota~~

Senecio Indigofera foliis pennatis glabris oblongis, racemis axillaribus vix pedunculatis
caule fruticoso erecto. Lin. Suppl. pag 334. S. V. 670.
Habitat in Cap. b. p. et

non vidi

frutescens frondifera foliis pinnatis ovatis glabris, racemis axillaribus pedunculatis
glabris, caule fruticoso erecto Lin. Suppl. 334. L.V. p. 670
Habitat in Cap. b. p. 4

non vidi

pentaphylla Frigidifera foliis pinnatis ovalibus quinis, caulibus prostratis, pedunculis
bis bifloris Len. l. v. pag. 678*

Habitat

Simillima *F. enneaphylla*. Herba depressa divaricata summa. Colicula quina, flo-
res nubi, Petioli biflori. Planta duplo major

non vidi

14-15 femistri-puja Indigofera foliis pinnatis obcordatis quinis, leguminibus subspericatis pendulis tonulo-
sis, caula prostrato suffruticosa.

Indigofera argentea leguminibus subspericis tonulosis, foliis ternis quinisque ~~ob-~~
obcordatis Burman: Pl. Ind. pag. 171. fide herbarii Celeb. Sin

Indigofera femistri-puja; foliis femistri-pugis, obcordatis, subcomplicatis tonu-
losis Forst. descr. pag. 137.

Tota planta incana, ~~suffruticosa~~

Endiculus prostratus ~~rami~~ ramosus. Rami decumbentes, teretes, simplices,
villosi hinc, uti tota planta.

Folia pinnata, bipuga quina. Solida sessile, obcordata, mucronata, in part
reliquis major

Stipula linearis, subulata

Spica axillares, foliis longiores. Floris remotiusculi, plerumque 11-13.

Legumina, oblonga, ^{pendula,} parva, tonulosa, disperma.

Affinis

(similis Indig. enneaphylla et pentaphylla ^{in multis} at diversa ut patet ex data Descrip-
tione.

enneaphylla Indigofera foliis pennatis ^{cuneiformibus} obcordatis septenis, pinnis lateralibus, caule
densis.

Polutea enneaphylla Lotoidea Indiae orientalis, fleguis conglobatis Pluk. Alm.
113. t. 166. fig. 2.

Hedysarum prostratum. foliis pennatis, Leguminibus cylindricis indivisi-
spermeis, capitulis sessilibus lateralibus caulebus prostratis Lin. Mart.
102. * Burm. fl. Ind. t. 45. fig. 1.

Indigofera enneaphylla foliis pennatis cuneatis septenis, caulebus prostra-
tis, pinnis lateralibus Lin. Mart. 272. 571. * L. V. p. 678.

Habitata India orientali

Caules teretes ramosi filiformes, pilis adpressis adsparsi. Soliola ~~rara~~ obovata
vel cuneiformia utrinque pilis adpressis canescentia semunquiculana,
alterna vel subopposita mucronata. Spicae folio vix longiores (in culta
breviores) flores conferti subcapitati. Legumina ut in semitrujuga.

Solias ^{abus} majorum apice rotundatas, pinnis brevioribus floribus confertis, descriptione
minore profertur differat ab *f. enae* semitrujuga an vere diversa.

Astragalus maderaspatanus v. *foliis* floresculi densi filiculosis
Roxb. bot. vol. 3. append. Herb. Mus.

~~Glabra Indigofera foliis pennatis ternatisque, racemis brevissimis, Leguminibus horizon-
talibus teretibus, caule herbaceo
Ninipalli Rhed. Mal. g. p. 67. t. 36.~~

Colutea filiquosa glabra, Ternis quinove foliis, maderas patana, Semini rubel
Lo Pluk. alm. 113. t. 166. fig. 1.

glabra Indigofera glabra: foliis pennatis ternatisque obovatis, racemis brevissimis
leguminibus horizontalibus teretibus. An. l. V. p. 670
Habitat in India

angustifolia Indigofera foliis pennatis lineariibus, racemis elongatis caule fruticoso Linn. Mart. 1722.

S. V. pag. 678

Habitat in Cap. b. Speitz

Semipedalis erectus ramifera, ramis teretibus superne pili minutis adpressis. ^{longiusculis} folia 4-5
puga, foliola linearia acuta apice patula, pinnis revoluta, supra pilosissima subtus
albida. Stipula acerose, minuta. Racemi axillares, laterales foliis triplo vel qua-
druplo longiores. Pedunculis foliiformis superne floribus 1-9 remotis unifloris. Calycis
inani. Corolla extus purpurascenti intus cinerascens. Linn. l. c.

~~capitata~~
~~virgata~~ *Indigofera* foliis pennatis foliolis linearibus revolutis subtus incanis, caule fruticoso erecto

Habitat in Cap. b. p. ei

Ramosus virgatus. Rami teretibus scabulis cineris folia subsessilia unguicularia, folia pinnata 2-3 pinnis foliola angusta semiunguicularia

Apule nulla acuta, apice pedicula crassifurcula supra pallida viridia. Racemi axillares foliis parvis sicut longioribus calycibus incanis corolla brevis campanulata corolla unguicularia petala patentia incana ciliis angustis longis. Dent. vexilli crassius glaber

18-19 Spicata Indigofera foliis pinnatis obovatis, ^{pendulis} spicis elongatis floribus spicatis leguminibus ter-
tibus torulosis, caule decumbente herbaceo.

Indigofera spicata; foliolis alternis quasinerviis, leguminibus rectis pendulis,
subspiciatis Dorsh. Caeser. pag. 130.

Caulis herbaceus decumbens, villosus.

Folia pinnata. Foliola 9. obovata, subpetiolata, ~~et~~ ⁱⁿ maiora, villosa
Stipula lanceolata-subulata, acida.

Spica foliis longiores, fructiferi triplex.

Legumina teretia, pendula, torulosa, villosa.

(Differt ab Indig. hirsuta hirsutis, stipulis caule erecto fructuoso, stipulis
staccis, leguminibus hirsutis fumi tetragonis)

12. oblongi

gracilissima Indigofera foliis ^{quinato-pinnatis obovatis} pinnatis quinatis ternisque obovatis
fragrans trifloris leguminibus tetragonis, caulis erectis, pedunculis sub

Habitat in arenosis Zeylona

Colutea filiquosa glabra ternis quinis ve foliis ^{ma} compressata femina utello Plu N
Phyt. tab. 166. fig. 1.

Indigofera fragrans foliis quinato-pinnatis, foliolis ovatis pelosis extremis majora,
leguminibus tetragonis Retz Jap. off. 4. pag. 29.

Habitat in arenosis Zeylona O

Caulis teres pubescens superius saepe furcatus, ramis ramis patentibus
fimi. Folia pinnata vel ternata, petiolata. foliola utra obovata folio latera

Sipula canisolato
subulata

breve petiolata, utrinque villosa ^{legumina} lateralibus oblonga & impar obovatum reliquis
major. Pedunculi axillares filiformis solitariis foliis longioribus trifloris (3 florus
videndum Retz) calycibus albo-pulvis, flores purpurascens legumina linearia
tetragona pedunculo longiora

Indigofera ^{petiolo glandulosa floribus racemosis}
habens Indigofera foliis pennatis ~~caulis teretibus~~ caule erecto

Habitat in India, vitium botanum

Caulis herba tenuis ^{imp} totus uti petioli; margo foliorum, peduncululi legu-
minaque obitus pilis apparetibus apice glandulosis. Folia pennata
cum impari 6 puga, bipollicaria. Foliola opposita breviter petiolata
basi acutiuscula apice mucronata, per semper unguis ulani pilis ad-
pressis adpressa. Racemi floriferi folio breviori fructiferi longiori
Stipulae etiam ^{unguiculari} floribus remotiusculis. Legumina verticillata horizontalia, ungui-
cularia, polysperma.

Coluteo. *pleurota encaphylos* Ind. orientalis, filiquis et foliis aversa
parte pubescentibus Pluk. amarth. t. 166. fig. 3.

pinniculata f. villosa, foliis oblongo lanceolatis ternatis quinatisque
racemis axillaribus elongatis simplicibus compositisque
Habitat in Inf. Neoborac.

Caulis caulis uti tota planta adpressis villis frequentibus
foliis 3natis vel quinatis pinnatis oblongo vel lanceolato
to oblongo. Ripula strica. Racemi axillares
foliis multo longiores. Pedicelli parvi unguiculares
capillares. In frequentissimi erecti. bractea in pediculis
folioli circumscriptis calyce parum longioribus floribus par
vi

Sylvestris
~~Sylvestris~~

Frond. pinnata foliolis oblongis racemis filiformibus elongatis
stipulis subulatis

Habitat in Guiana N. Matham

Descripta in her. Amari

Diosperma Indigofera foliis pennatis ovalibus, racemis elongatis, legumini bus dioper-
mis Lin. S. V. p. 678. Nat. 3. p. 1232. & S. V. pag. 678.

Indigofera siapo inferno, foliorum pennis oblongis pallide virentibus glabris
pedunculis spicis longissimis floribus late dispersis, leguminibus
compressis brevibus subappendicem diopermis New. Act. 24. v. 55.

Habitatio India

Simili *G. tinctoria* sed racemi foliis compressis longiores. Legumina dioper-
ma

4

Habitat ^{videt} Depuis videt in herb. Arab.
Caulis herbaceus, ramosus. Folia terna

Viscaria Cypripedium

Caroliniana 4. Leguminibus gibbis, racemis axillaribus foliis longiori
bus, radice perenni Walt. Cat. p 107.
Habitat in Carolina.

non vid.