

Promoa

despecta *Spongia foliis palmatis, laciniis angustis pinnatifidis dentatis, pedun-*  
*culis sublaefloris* Wild. phyt. pag. 5. Tab. 2. fig. 3  
Habitat in Guinea.

non vid.

filiiformes Sponsea foliis <sup>subcordato-</sup>oblongis, ~~ovatis~~ obtusi mucronatis integerrimis pedunculis  
axillaribus dichotomis.

Sponsea filiiformis foliis cordatis, obtusi cum acumine, integerrimis, pedun-  
culis radicibus filiiformibus. Gay. amer. pag. 27. Feb. 19. lin. S. V.  
pag. 205.

In montserrat legit dr. Ryan.

Rami elongati, simpliciter, teretes, glabri.

Folia petiolata, alterna, remota, pollicaria et ultra, oblonga, basi saepe  
cordata, obtusissima, mucronata, glabra, obscure venosa, integerrima.

Pedunculis axillaribus, solitariis, filiiformes, foliis longioribus, bis bifidi. Flores  
pedicellati; pedicelli dichotomis et alter laterali ebracteati; alter  
bracteis bracteis utraque, oppositis, minutis.

Calyx glaber; lobis ovatis, obtusis.

Corolla pollicaria.

Stamina et Pistillum longitudine corollae. Stigma capitatum.

*Applenium frondibus pinnatis*

*Var. ~~obtusifolia~~ affinis obtusifolia 207*

hippidulus  
12-13

Verticillata <sup>Gromos</sup> ~~Gromos~~ <sup>Gromos</sup> foliis cordatis, pedunculis axillaribus ternis reflexis,  
~~calycibus bipadi~~ calycibus hippidis

Gromos verticillata Forst. descr. pag. 44.

Pauli <sup>decumbens? flexuosus, semipedalis,</sup> ~~volutata, basi rami flexuosus~~ basi ramosus, raris pilosus in fere  
pilis rarioribus adpressis; superne conopseus.

Folia petiolata, pollicaria, inter obtusiuscula, mucrone brevi terminata  
venosa; venis subtus per rare pilosa, adultiora glabriora.

Petoli inferiores foliis duplo longiores; <sup>glabri</sup> superiores pilosi

Pedunculi ex axillis omnibus ad a basi ad apicem, terni, angulati  
unguiculares, sub flore sursum versus incrassati, reflexi, uni flori;  
basi bracteis nonnullis linearibus, brevibus

Calycis lobulo ovata, acuta: juniora pilis longis tecta: adultiora  
glabriora ciliata.

Capsula magnitudine pisii, glabra. Semina tomentoso-subprinea

*parviflora* f. <sup>cordati</sup> foliis quinquefolio palmatis, umbellis axillaribus pedunculatis, calycibus capsulis pilosis  
Convolvulus pentaphylloides minor, flore purpureo Sloan hist. 1.  
pag. 153. tab. 97. fig. 1.

Habitat in Insula St. crucis in West.

Caulis volubilis glaber & lineis decurrentibus triangularibus, loricis.  
Folia petiolata, sesquipolliciana Gabra. Cobi lanceolata  
obtusius mucronati, laterales breviores intermedii duo angustiores  
extimi extropium basi gibbosi subtus pallidiora  
Petioli filiformes folio longiores  
Pedunculi axillares, petiolo triplo crassiores folio longioribus  
triangulatis triangularibus. Pedicelli terni vel pari angulati  
mucronati unguiculares uniflori basi articulati  
Calycis sepala ovata, mucronata pilosa longitudine capsulae  
Flores parvi

*Fraxinea sinuata* foliis palmato-pedatis & lobatis; lobis lanceolatis inaequaliter sinuatis;  
pedunculis unifloris  
Habitus in Cuba 4

*Gnomoa*

Habitat in St. Domingo Less. Desfont. 5

vulgaris. Rami crispè pennis asperis, scabriuscula: ramuli villosi subtomentosi  
sordide cinerei. Folia petiolata, bipollicana, cordata, obtusa, supra nervosa gla  
bra, foveis, subtus villosa-tomentosi, sordide cinerei, integerrima. Petiolus semipolli  
cari. Peduncululi axillares, foliis longiores, 4 flori. Flores umbellati: pedicelli 4. um  
bellati. Bractea duo oblonga, ad basin pedicellorum. pedicelli 2 flori flore  
altero brevius pedicellati. Bractea duo oblonga, et 2 ad basin procul floris  
Calycis villosi: foliola oblonga. Corolla infundibuliformis, sequipolliciana, ap  
ice linea quinque villosa.



9. *Sponsea*

Habitat Cayenna herb. Desfont

glabra. Sola 7 digitata: foliola lanceolata, integerrima, bipollicaria  
petiolata, utrinque acuta, Calycis foliola oblonga, glabra

conf. Aubl.

*maimonea tremosa*

Habitat in Carolina herb. Desfont  
Caulis villosus, canescens, striatus, crassitie pennis aspernis. Solia petiolata, palmata,  
cordata, supra glabra, subtus tomentosa cinerea, nervis venosa. Petiolus foliorum  
num brevior, cinereus, mucosus. Peduncululi axillares solitarii, petiolo brevior  
uni flori. Calycis foliola ovata, incana, semipollicaria. Corolla sesqui pollia  
ria, superne extus villosa.

v  
Gromos?

Habitat Puerto Rico herb. Desfont.

Caulis volubilis, hirsutus, scaber. Folia petiolata, tri-pollicaria, sagittata oblonga, obtusissima, emarginata, venosa, glabra: auricula ovata, acuta, vel obtusa. Petioli folio breviores, glabri, interdum scabri. Pedunculi folio parum breviores, glabri laxis triflori. Flores pedicellati, singuli basi involucri duobus oblongis. Calycis foliola ovata, aristata, glabra. Corolla Conv. purpurei

*Gnomon*

Habitat in Galam herb. Turf.

Caulis solubilis, hirtus et pilis flavescens et punctis elevatis scaber. Folia bipollicaria, ovato oblonga, vix cordata, mucronata, nervoso venosa, supra raris pilis, subtus et pilis longis ad presens argentea, integerrima. Petioli hirti, longitudine fere folii. Pedunculi axillares, foliis breviores, et pilis flavis hirti. Flores in capitulo flavescenti pilis hirti. Involu-  
crum polyphyllum: foliola semipollicaria vel minor, subtus mucronata. Calyx basi in-  
natis: lacinae lineares, obtusiusculo.

an *Convolvulus* a nomine et pilis?

*Senegalensis Ipomoea*

Habitat ad Senegal herb Fus. 7

Caulis volubilis, teres, glaber, cortice cinereo. Folio petiolata, polliciana, quinquepartita lobata, integerrima: lobi oblongi, obtusi, mucronati, glabri, laterales minores. Stipula foliaceo, quinqueloba. Axilla tomentosa. Pedunculis axillares, longitudo in folio, bis vel ter dichotomi, rigidi. Calycis foliola oblonga, obtusa. Corolla vix polliciana. Affinis *Convolvulo cainco*

Subinflora *Gnomia*

*Gnomia subinflora*; foliis cordatis integerrimis palmatisque, pedunculis unifloris, radice tuberosa Fl. Penn. 2. pag. 12.

Habitata Pennsylv. collibus &

Pubescens. Caulis volubiles, filiformes, ramosi. Folia cordata palmatisque acuta. Petioli longitudine fere foliorum. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, pedicello breviores, ultra medium bractea duobus pubulata. Corolla purpurea Fl. P. l. c.

villosa Gronosa

*Gronosa villosa*. foliis cordatis 5-lobis, lobis acuminatis 5-lobis lateralibus est  
8 rorifera excavatis, pedunculis trifloris involucriatis Fl. Per. 2. pag. 12.  
Tab 121. fig. 6.

Habitat in Peruvia nemoribus et ad agrorum margines O.

Hirsuta. Caulis volubilis, filiformis, ramosus. Folia 5-loba: lobo intermedio  
angustiori, productiori, inferne cuneato; laterales ovati extorsum  
excavati. Petioli longi, variet. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori  
triflori. Pedicelli bracteis subulatis involucriatis. Calycis hirsuteres.  
Corolla glabra, conica. Stamina basi villosa. Stigma capitatum-granulatum  
Capsula glabra.

Differt ab *Gp. villosa*: caule tereti, uti tota planta villosa: Corolla infundi-  
buli formis, Stigmata capitata, capsula glabra T. P. l. c.

Lobi laterales extorsum sine excavati. Bractea parva plura ad basin  
nervi cellonum calycis <sup>foliola</sup> lacinae. Lanicolato

*Apronia angulata* foliis cordato-sagittatis, caule pedunculisque angulatis, pedunculis subfloris. *Ord. Decad pag 89.*

~~Habitat in Peruvia collebus & inque prorupti et petronis Lima C.~~

*Apronia angulata* foliis cordato-sagittatis acuminatis acutis, caule angulato, pedunculis subfloris, calycibus unguiculatis &c. *Peruv 2. pag. 11. tab. Ro. fig. 6.*

Habitat in Peruvia collebus, inque prorupti et petronis Lima C.  
glabra. Caulis solubili, inferne ramosis, angulatis, contortis, articulationibus linds. Folia petiolata, cordato-sagittata, integerrima, acuta, acuminataque, nonnulla cordata, a basi ad medium angulata, septem nerva. Pedunculi axillares, solitarii, petiolis longior angulatis, contorti, interdum 1-3-flori. Pedicelli cernui, inaequali, basi bractea ovata, fructiferi unius sibi. Calycis lacini inaequali, apice dorso unguiculatis, nitida aliquando bene unguiculato. Tubus corae nibeatens. Limbus continens, mar gna revoluta. Filamenta basi glandulifer. Capsula magnitudine pisi 3-4 angula, 3-4 loculari, interdum biloculari &c. *Per*



glandulifera Gnomia

Gnomia glandulifera; foliis cordato-subrotundis acuminatis, pedunculis  
subquadrifloris incrassatis, calycibus glanduliferis Fl. P. 2. p. 12. Tab. 21.

Fig. a

Habitat in Linnæa septibus et cultis. 4

Hirsuta, lactescens. Caulis volubilis, ramosus semis, teres. Folia longe petiolata  
4a, cordato-subrotunda, acuminata, integerrima. Pedunculi axillares,  
volitarii, longitudine foliorum, filiformes, erecti, 3-4 flori. Pedicelli suprema  
incrassati. <sup>sub triflori calycis</sup> Bractea subulata. Calyx glandulifer: foliola 3 exte-  
riora duplo latiora. Corolla tubus purpureus: limbus lobes violaceus.  
Stamenta basi villosa. Stigma unguinum. Capsula trilocularis. Semina  
bina, nigra. Fl. P. l. c.

pedicelli umbellati: foliola calycis lanceolata villosa glandulosa

Papiri Gpomea

Gpomea Papiri foliis palmatis cordatis; lobi quinque lanceolatis; pedunculatis  
unifloris, radice tuberosa. Fl. Per. 2. pag. 11. Tab. 120. fig. a

Habitat in Peruvia collibus ?

Praxia <sup>tuberosa</sup>  
tub  
Pubescens. Caules volubiles; plures; feli formis; paucis ramosi. Folia pal-  
mata cordata: lobi 5que lanceolati, integerrimi; in 1/2 et medii dentia-  
to univo ad basin. Petioli longitudine fere foliorum, teretes; supra paucum  
sulcati. Pedunculi axillares breves, globosi, uniflori, ultra medium  
bractea duo subulata, persistentes. Calycis laciniis subordatis. Corolla  
purpurea, calycis quadruplo longior. Fl. Per.

Lobi laterales minores.

angulata - *Spmsa*

cuspidata Gromsea

Gromsea cuspidata foliis cordatis trilobis; lobis cuspidatis, pedunculis unifloris,  
laciniis calycis linearibus basi hirsutis, mi. Fl. Per. 2. pag. 11. Tab. 119 fig. 1.

Habitat in Penna petrosi O

Pilosa. Caulis erectus, filiformis, flexuosus, parum ramosus. Folia longe  
pedicelata, cordata, triloba; lobi cuspidati; laterales breves: inferiora nonnulla  
cordata, integerrima. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, pediculis brevis  
res, heredes. Bractea duo, opposita, subulata, ad apicem <sup>versus</sup> pedunculi. Pa-  
lyx dense villosus, villis aureis: laciniis linearis, longo. Corolla papum  
sicut Fl. P. l. c.

foliis subtriloba lobi acuti.

*acutangula* Gronosa

*Gronosa acutangula*; foliis sagittato-triangularibus; angulis posterioribus dentatis  
caule tereti, pedunculis tri vel quinque flori foliorum longitudine & l. Penn.  
2. pag. 11. Tab. 119. fig. 6

Habitat in Pennis nemoribus: ☉

Caulis volubilis, filiformis, ramosus, teres; folia longa petiolata, sagittato-triangularia, acuta: angulis posterioribus dentatis. Pedunculi solitarii tri vel quinque flori. Pedicelli bracteis duabus subulatis, oppositis. Corolla coriacea & l. Penn.

foliis cordato subsagittato inferne versus remote dentata calycis  
laciniis linearibus lanceatis Corolla hypocrateriformis

frans *Apronia* foliis cordatis ovatis truncatis dentatis, floribus axillaribus  
solitariis, caule suffruticoso ramis erecto. *Caran. fr.* vol. 3. pag. 26

tab. 250.

Habitat.

5

non vid.

*Toricolor* *Ipomoea* foliis cordatis orbiculatis acuminatis, pedunculis multiflo-  
ris. Cavani. 4<sup>to</sup>. vol. 3. pag. 5. tab. 20. p.

Habitat

non vidi

pentaphylla ~~Ipomoea~~ foliis quinatis glabris canaliculato-oblongis pe-  
ctinatis denticulis axillaribus subuni-floris caule fruticoso Cavan

Fig. vol. 3 pag 29. Tab 256.

Habitat 5

non vidi



verrucosa *Spongia* foliis 3 partibus linearibus, pediculis utriusque solitariis  
unifloris, calycis verrucosa *O. Mey. - Desi: pag. 10 +*  
Habitat in Cula + 24  
Ped. + tuberosa

non vid.

*Heterophylla* *Artemisa* foliis palmatis planis: lobulis lateralibus pinnatis  
lobulo erecto inflexo aucti Ortega Dec: pag 4  
Habitat in Cuba et regno Mexicani  
Orlona. Caulis herbaceus, filiformis, volubilis. Folia  
longe petiolata: lobi ovato-pinnatis. Pedunculis 3 flori  
& laxis: bracteis lanceolatis. Calycis lacinae duo  
externae ciliatae una altera dimidiata interna  
duo lanceolato-fimbriata. Corolla ampla. Embus  
nervi. Filamenta basi barbata

non vid.

hederaea 4

*Gnomon hederaea* Jacq. coll. 1. pag. 124

Habitat in Amer. merid. O

Caulis volubilis teres quoad ripedalis pilosulus scaber, ramosus. Folia cordata  
semitriloba, variegatione obtusis <sup>pluribus</sup> 3-loba, nulla integra, utraque pilosa  
longe petiolata; lobo medio ovato acuto: lateralibus obtusis  
cum sinibus obtusis. Pedunculis axillaris, solitarii: uniflori glabri  
sicuti interdum pollicares interdum brevissimi. Bractea infra calycem  
gemina linearis acuta hispida. Calyx inferne pilis nigriculis fuscis  
dense barbatus. foliolo ovata acuminata. Tubus corollae longitudo  
ne calycis pallidus limbus saturate coeruleus. Capsula glabra  
3 loculari loculis 8 spermis Jacq.

non vidi

Senegalensis spec. foliorum digitatis septenis pedunculis umbellatis brevissimis la.  
max. T. E. p. 464  
Habitat ad Senegal

non vid.

Licolor Apon: foliis cordatis integris unlobisque, pedunculo subbifloris, folio brevioribus  
calycibus lanceolatis La Mart. T. E. pag 465

Habitat in Cap. b. p. ei

Calyx longis laciniis calycinis linearis lanceolatis

pubescens *Spongia villosa-pubescenti*, foliis cordatis raro trilobis, mollissimis, pedunculis  
unifloris, foliis calycinis subcordatis La Mart. T. En p 465

Habitat in America aff  
affinis *Con. tomentosus*?

angulata From foliis cordatis angulosis sublobis pedunculis multifloris foliis  
Longibus La Mart. F. En. pag 464  
Habitat in Insula Francia

non vid.

quamoclit. 7. foliis pennatifidis linearibus, floribus subsolitaris Len. 1. V  
mill. Dict. 7. 214

quamoclit sive *Tasmium americanum* Clus. posth. 9.

*Tasmium millefolii* folio Bauh. pin. 398.

*Tasmium* - Crant. Rheed. mal. 11. p. 123. t. 60.

*Flor. cardinalis* Rumph. amb. 5. p. 421. t. 155. fig. 2

Habitat in India annotuit 1500 per Casalpium ☉

Caulis teris glaber folia anguste fimo glabra petiolata junis albis  
nisi pollicibus. Auncula pennata angustior. ad basim petiolorum  
pedunculi 1-2 flori folio longioris glabri. pedicelli sursum sen  
sim in vasculis teris qui pollicari glabri lacrimo calycis oblongo  
obtusis mucronata



umbellata  
~~undulata~~

*Ipomoea foliis digitatis septenis, pedunculis umbellatis brevissimis* L. S. V. 204.  
*Quamoclit heptaphyllus, flore coccineo umbellato* Plum. Spec. 3. T. 92. fig.

<sup>2.</sup>  
Habitat in America

carolinæ 4. foliis digitatis: foliolis petiolatis, pedunculis unifloris L. S. p. p. 204  
Convolvulus minor pentaphyllus, flore purpureo minore Cateff. Carol. 2. p. 9.  
t. 91.  
Habitat in Carolina

non vidi

- tuberosa 7 foliis palmatis lobis septenis lanceolatis acutis integerrimis, pedun-  
culis trifloris Gen. S. V. p. Jacq. off. 39.

Convolvulus americanus, manducis multifido folio, heptaphyllo,  
flore albo, fundo purpureo, radice tuberosa, cortice albo Pleth. alm  
116. t. 276. fig. 6.

Convolvulus major heptaphyllus, flore sulphureo odorata Sloan hist.  
1. p. 152. t. 96. fig. 2.

Habitat in Jamaica

Caulis angulatus glaber <sup>baccinatus palmata remota</sup> Folia petiolata glabra. Cincinni  
caterales breviores <sup>atenuato acuto interdum</sup>  
Elleptico lanceolato <sup>atenuato acuto interdum</sup>  
obtusis nervosa subavenia integerrima. Petiolus longitu-  
dine folii. Pinniculi petiolo breviores 3. 5 flori pedicelli  
breves. Corolla campanulata Cincinni calycis oblongo obtuso  
glabro

*Dyctata* f. foliis palmatis: lobis septenis lanceolatis obtusis, pedunculis trifloris Lin.  
S. V. p. 204

*Quamoclit* foliis *Dyctatis*, flores carneo Plum. spec. 3. 7c. 92. fig. 1.

Habitat in America

non vidi.

mauriana Gronow

Gronow mauriana Jacq. coll. 4. p. 216. v

Habitat in Topula p. Mauriti

Stem glabra Caulis in caldano annui in Ciro natali perenner Terres 12 pedali-  
crasitie digiti minimi, ramosi, teretes. Folia longe petiolata  
subrotunda, septemneria. Septemloba. Lobis ovatis acutis inte-  
gerrimis. Pedunculi axillares solitarii uniflori longitudine foliorum  
ramosi, multiflori. Foliola calycis subrotunda obtusa. Corolla  
rosea, magna. Tubus pallens longitudine calycis. faucibus multo  
amplexiori. Hypo corollatum. affinis Convolvulo camparum  
incurvato. Jacq.

non vid.

hederifolia *F. folio trilobis cordatis, pedunculis multifloris racemosis* Lin. Spec. pl. p. 229 +  
S.V. p. 205

*Quercus hederifolia* Trifido Plum. Spec. 3. T. 93. Fig. 2.

Habitat in America.

Corolla quam in *F. triloba* quoad nupto longior et pedunculi plurimis floribus  
racemosis haec.

non vidi

*Redensolia* 9. *Folia et lobis floribus aggregati*

~~Ipomoea~~

1617 sanguinea Ipomoea foliis cordatis trilobis: lobis lateralibus persticis angulato-sublobatis,  
pedunculis ~~glabris~~, trifloris, calycibus glabris

Habitat in ~~insula~~ insula s. in ins. S. West.  
Tota glabra.

Caulis volubilis, a lineis decumbentibus angulatus.

Folia petiolata; sesquipollicaria et ultra, quinque nervia, triloba: <sup>alternati</sup> lobis obtusis,  
mucronati; intermediis <sup>lobis</sup> lanceolato-oblongis: laterales lanceolati,  
divaricati, eotorsum latior, basi producti in angulo plerumque  
sublobato.

Pedunculi foliolongior: pedicelli laterales bi s. triflori.

Calyx glaber: foliola oblonga, arista longitudine folioli acuminata.

Corolla majoritadine et figura sp. quamalis cocinea



angulata 9. foliis trilobis lobis lateralibus lateralibus dentato angulatis, pedun-  
culis subtrifloris

Habitat in Insula Franca

quae dicitur angulata <sup>longissima</sup> longipolluciana

Caulis volubili foliis <sup>longissimis</sup> petiolatis, lobis lanceolatis acutis intermediis  
lateralibus triplo longior mucronato, acutis lateralibus utri-  
que dentibus 3-4 inaequalibus subtus praecedentibus. Petioli pollicia-  
res filiformes. Pedunculi folio triplo longiores petiolo crassiores  
triflori. Calycis foliola subrotunda acuminate corolla coriacea  
tubulosa sesqui-polluciana gemmae capsulae globosae

hederaea *f.* foliis cordatis longe petiolati utraque petiole semitralobis  
lobo medio ovato acuto, pedunculis axillaribus unifloris solitariis  
*f.* aequi coll. 1. pag. 124

non vidi

Coccinea 9 foliis cordatis acuminatis basi angulatis pedunculis multifloris  
Lin. S. V.

Quamoclit americana, foliis hederis, flore coccineo. Com. var. 21. t. 21.  
Convolvulus coccineus <sup>oleo</sup> flore anguloso Plum. Amer. 89. t. 103.

Habitat in Domingo O

Caulis glaber folia cordata ovata obtusa cum mucrona.  
Pedunculi ~~axi~~ basi dentato-angulata glabra pedunculi  
axillares folio longiore bipartiti pedicello in <sup>oblongo</sup> dichotomia  
reliqui racemosi uniflori. Lacina calycis ovata acumina-  
ta carnata. Capsula glabra.

\_\_\_\_\_ dentato bipartiti  
pedicellis racemosis

bona nota 9. foliis cordatis acutis integerrimis caule aculeato, floribus ternis  
corollis indivisis Lin. Spec. pl. p. 2204

~~Smilax aspera India occidentalis Rheed. Mal. II. p. 103. t. 50. Bauh  
pin. 296.~~

~~Munda valli Rheed. Mal. II. p. 103. t. 50~~

~~Convolvulus americanus, subrotundis foliis, viticulis pinnatis Plukenet  
alm. 115. t. 276. fig. 3.~~

~~Convolvulus maximus, caule pinnatis obtusis obtuso Roem. hist.  
1. p. 151. t. 96. fig. 1.~~

~~Hypoxis sylvestris, foliis & floribus amplesicis, & abis florem sub  
terribus Brown. jam. 155~~

Habitat in America arenosis adhaerens

Caulis angulatus. Eolia glabra integerrima subtus venosa  
pedunculi axillares longitudine foliorum pedicelli  
inversati foliola calycis ovata acuminata

Rheed. Platan. & Brown. Diversa apparent  
a Plukeneti.

grandiflora. 4. foliis cordatis attenuatis integris basi que subangulatis  
caule aculeato, pedunculo trifloro  
in unda valle Ahermal. 11. p. 103. t. 50.

Habitat in India montali

Caulis glaber adpressus aculeis parvis = Colicis petiolatis  
magna 5-6 polliciana in acumine attenuata basi  
versus utraque saepe angulo breviori, integerrima glabra  
Petioli foliis longiores. Pedunculi elongati petio crassiores.  
Pedicelli alterni pollicares sursum crassiores. Goleola 3  
calycis exteriora acuminate acumine reflexo interiora  
ovata mucronata tubus 5 pollicaris limbus ~~foliis~~  
pollicem magnus Dianthus 3-4 pollician

frum Ahermal differt pedunculis axillaribus pluribus unifloris  
ita tamen diversa

caesunosa 4 foliis cordatis acuminatis subsiculis basi angulatis ~~Lin. Spec. p. 2204~~  
~~fig. pag. 204~~ pedunculis subuni floris flore brevioribus ~~Lin. Spec. p. 2204~~ S. V. p. 204.

Convolvulus carolinianus, flore minore sanguinea Raii suppl. pag. ult.

Convolvulus stellatus, periploca rotundioris folio - Willd. Cl. 103. t. 87.

fig. 102.

Habitat in Virginia, Carolina &c.

Simulium 4. coccinea, sed pedunculi uni flori s. bi flori. Flores tubo  
coarctate s. albi, ori purpurascetes, nec coccinei hinc l. c.

*Solanifolia* foliis cordatis acutis integerrimis <sup>floribus soliternis</sup> Lin. S. V.

*Quamoclit solanifolia*, flor. roseo Plum. ii. 94. fig. 1.

Habitat in America

meo cum gaudeat caule angulato foliis peltatis raris adpressis foliis  
floribusque majoribus quam habet figura Plumieri

michi haud satis nota

Violacea 7. foliis cordatis ad geminis, floribus congestis, corollis indivisis Lin. l. V. p. 205.  
Convolutus major, folio subrotundo, floe amplo purpureo Sloan. h. l. p. 155. t. 98.  
fig. 1.

Quamoclit foliis amplissimis cordiformibus Plum. spec. 3. 46. 93. fig. 1.

Habitat in America Meridionali

Caules uti petioli et peduncululi villo tenuissimo pubescenti  
folia petiolata, palmata parum acuminata glabra. Caevis  
peduncululi petiolo breviori 3-4 flori. Calycis foliola duo  
exteriora fere pollicaria oblonga rotundata. Corolla  
fere 4 pollicari tubo diametro pollicari



carnea 4. foliis cordatis glabris, pedunculis multifloris, corollis marginatis Lin spec. pag.  
1668. S. V. p. 205. Jacqu. Amer. 13. t. 18.  
Habitat in America h

repanda

<sup>lindat.</sup>

f. foliis oblongis repandis, pedunculis ramosis, ~~pedunculatis~~ <sup>cymosis</sup>  
cymosis saepe am - 13 t. 20 her. spec. pl. pag. 668

Habitat in America meridionali

Caulis volubilis glaber angulatus ramosus folia  
petiolata glabra bipollicaria et ultra subtus  
venosa. Pedunculi axillares folio multo longio  
ri. ~~Pedunculus~~ ramus subdichotomus glabri foliola caly  
cis ovata flores serquipollicari racine

*filiformis* G. foliis cordatis obtusis cum acamine integerrimis, pedunculis raris  
mossis filiformibus Lin. P. V. pag. 209. Jacq. Am.

Habitat in insulis amenis meridionalis

*filiformis* B. foliis subcordatis obtusis mucronatis, pedunculis ramis  
fere tubulosis Egypt.

Caulis teres glaber ope lentis pilis raris adpressis folia petiolata  
glabra pollicaria vel parum ultra <sup>superiorum</sup> ~~sub~~ emarginata  
simpliciter venosa. Pedunculi foliis longioribus vel 3/4 foli-  
tenuis. lacina calycis ovata ~~lanceolata~~ <sup>lanceolata</sup> acuta flos  
pollicares.

———— oblongis que obtusis mucronatis, pedicellis

Luteola *f. folus cordati acuminatis subdentatis, pedunculis bipartitis pedi-  
cellis racemosis*

*f. praeo* Luteola *laevis coll. r. p. 266.*

Habitat in Guatemala

Caulis volubilis ramifus, 4 ped. alii obsolete mucronatus, glabres subangulatus.  
Folia petiolata cordata, acuminata rasesime denticulata glabra. Pedunculi  
axillares solitarii folio duplo longiores bipartiti cum flore in dichotomia  
dein racemosi subquadriplori. Perianth. spatulatum basi 5 angulans. Laciniae  
cuneolatis linearibus. Corolla longa infundibuliformis aurantia lutea  
Stigma caputatum obsolete bifidum  
An varietas *f. torcinosa*

non vidi

glaucifolia G. foliis sagittatis postice truncatis Lin. S. V. p. 205

Convolvulus stellatus arvensis, foliis glaucis Bell. elth. 103. t. 87. fig. 101.

Convolvulus foliis cordatis lanceolatis Hort. Cliff. 67.

Habitat in Mexico arvis

hastata F. foliis sagittato hastatis, pedunculis bifloris Mant. 204. \* S. V. p. 205. Burm

*Gnomosagittifolia* foliis hastatis, pedunculis bifloris Burm. fl. Ind. p. 50. t. 10. f. 24

Habitat in Java

Folia cordato-hastata, auriculis utrinque geminis. Flores gemini lutei

*hepatifolia* 7 foliis trilobis, floribus aggregatis Linn. S. V.

Burm. ind. 50. t. 20. fig. 2.

*Convolvulus zeylanicus* hesperus, foliis hepaticis Herm. prodr. 327.

Habitat in Zeylona

pedunculis 7 foliis palmatis, floribus aggregatis Lin. S. V

Pulli-schovadi Rheed. Mal. II. p. 121. t. 59

Convolvulus reglanius villosus pentaphyllos et heptaphyllos minor,

Pestiginus Herm. Legib. 104. t. 107. Act. bon. II. p. 2. p. 362. t. 23.

fig. 2.

Volubilis Rey Canica, Pestiginus dicta Pell. Elth. 429. t. 310. fig.

411.

Habitat in India

Caulis hispissimus folia petiolata quinquefida lobis ovatis  
an obtusi mucronatis integerrimis basi cordatis ~~vel~~ <sup>et</sup> lobis pedun-

<sup>culi</sup> folio longioribus uti petioli hirti. Anvolucra lanceolata semi-  
volucra  
flores in involucro dimidio longiora

oleam foliis 5 partibus lacinis lanceolatis attenuatis an  
modo varietati



promorsa 7. foliis cordatis subrotundis extrorsum dentatis, floribus  
aggregatis ~~lanceolatis~~  
Habitat in India orientali  
a Persicis foliis indurpis tantum differt an modo vari-  
tis

tamniifolia G. foliis cordatis acuminatis pilosis, floribus aggregatis Linn. S. V. p. 205  
Solubitis carolinensis; tamniifolia subhirsuta Willd. Bot. 420. t. 310. fig. 414.  
Habitat in Carolina

tamniifolia C. foliis cordatis acuminatis floribus aggregatis subsessilibus calycibusque pilosis Encyclop.

non vidi

Herba. 7. foliis cordatis acutis <sup>integerrimis</sup> indivisis, floribus aggregatis

Habitat in India orientali

Convenit in omnibus cum sp. per Sydenh. excepto foliis  
an modo varietas