Iresine

1 Celosia ♃. foliis ovato-~~cylin~~ lanceolatis, spicis cylindricis
2 angustifolia ♃. foliis lanceolatis, spiculis oblongis

3 Iresine [illegible]

Ireſine

Habitat in Peru Dombey herb. Juſs. 5

Caulis fruticoſus, erectus, ſubtetragonus, glaber, ramoſus: rami oppoſiti. Folia petiolata, oppoſita, ſemipollicaria, ovata, acuta, glabra, avenia, ſubtus nervoſa. Spicae ex apice ramorum, paniculatae, alternae, plerumque geminatae, filiformes, pollicares; imbricatae. Squamae ovatae, flaveſcentes, glabrae, acutae.

1 Celosia Trepone. Lin. f. V. Sw. obs. b. p. 376.

Amaranthus nodosus, pallescentibus foliis bliti parvi, americanus; multiplici speciosa spica laxa candicante. Plukn. alm. 26. Tab. 261. fig. 1.

Amaranthus panicula flavicante gracili holosericea Sloan. hist. 1. p. 142. t. 90.

Habitat in Virginia, Jamaica.

Caulis erectus orgyalis vel pedalis superne diversus subangulatus, striatus glaber ~~interdum~~ superne pubescens ad insertio ~~genua~~ [com mas] ramulorum geniculatus, geniculis tumidis. Folia opposita, petiolata, ovato-lanceolata vel lanceolata acuminata glabra. Panicula terminales ramosa; rami diffusi alterni, in alio individuo opposito (com mas) patentibus. Flores spicati. Spicae breviter pedunculati oppositi alterni vel verticillati unguiculares tenues ~~imbricati~~ [corpuscula ...] squamis minutissimis nitidis lutescentibus. Lana alba inter squamas post efflorescentiam erumpit. hermaphrodi tum observavit Sw. s. 1gyna stylo trifido.

Celosia 4. foliis ovato lanceolatis spiculis teretibus cylindricis

cum Celosia forte conjungenda. conferatur Brow descript

2 angustifolia G. foliis lanceolatis, spiculis oblongis
Habitat in Canbeis
Caulis erectus ramosus glaber superne subangulatus genicu-
lis tumidis superne ramosus rami ~~ax~~ alterni axillares. Folia petio-
lata opposita glabra, integerrima attenuata basi acuta, bipolli-
caris. ~~Flores~~ suprema floralia alterna Racemi ex apice ramorum compositi
~~superiores~~ remi caulis axillares simplices, palmares ~~remi~~
ramis simplicibus, nec tam divisi ut in Celosioide
pedicelli partiales semiunguicularis. Flores minuti confer-
ti; spica dimidio breviores quam in Celosioide triplo
crassiores squamae imbricatae sordide nitentes
folia inferiora ovato-lanceolata. Stamina 1 delpha basi in
urceolum connata, concavum, inter filamenta dentatum Ruh.