

Iris

101. Iris Cor. 6-partita: laciniis alternis reflexis.
Stigmata petaliformia

Carl. L. t. 101

Yns vesiculos

folia plerumq[ue] ensi formis demipollicem lata & prope nervo alba
^{namq[ue] quibusdam}

scapus ^{terci} latis medius ^{medius} folio unio cum pedunculo
pedunculus biflorus. Spatha lanciolato acuto bipollicium
pedicelli subtriquetri corolla 4. lps & lris parva micant

Petala exteriora cuneata lamina purpurea violacea media
^{naque luteo} inferne linea flavo ^{venis} ^{albis} ^{subtus} ^{vires} ^{exterioribus} ^{superiore} ^{albibus}
exteriora interiora angustiora pallida purpurea apicem
versus alba stigma alba bifida lacinae denticulatae. Germ.

obtusae trigonae

^{exteriori} ^{medio} ^{linea} ^{flor}
 Ochroneia fons varietas petalis pallidis interioribus inter se inferne
 margini flava ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo}
 alia petal. omnibus ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo}
 emarginata. omnia petala ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo}
 dilatata ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo}
 Allium angulos petala ovata 3a exteriora breviora ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo}
 uniangulatus stamina cordata breviora in ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo}
 oqualia lanceolata stamina corolla longiora
 fons spuria petala interiora ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo} ^{margini flavo}
 triflorum spadicium caules adscendentes fl capitulum ovatum
 flores primum flavi dein apice fusi

~~Scopoli Fl. Car. 5.
 Tournefort Fl. Fr. p. 598. f. 370
 Ochroneia fons~~

9 officinalis *Gratiola* foliis lanceolatis serratis, floribus pedunculatis L.V. p. 64. 1.

Spec. pl. 24. 1. Fe. 362. Sc. 81. ~~Perz~~ Hall. h. ft. 329 Scop. Fl. C. 27

Gratiola Matthioli p. 697. ~~Sod. purg. 119. Blotawell 446.~~

Gratiola seu *graha* Dei Lob. 4c. p. 435.

Gratiola centauroides Bauh. pin. 279. Bauh. h. 3. p. 435.

Digitalis minima *Gratiola* dicta Monf. 2. p. 479.

Habitat in Lusitania, Gallia et Europa australioris humidis sculis

~~Tota ²⁴ *graha* ^{minor}~~
Caulis simplicis ^{vel ramosi} ~~seu~~ ^{minor} *spithamei* inferne imbricati foliis
^{superioribus} oratis integerrimis ^{remote denticulatis} ~~caulis~~ ^{minoribus} foliis sub
ternis ^{quibus} pollicariis obtusis. flores folio breviores.

^{de} *Centaurium* 3. *Centaurides* Cordi ^{antidot. in Diosc. p. 86} ~~sup. p. 86. 6.~~
Gratiola Matth. 697. Lob. 435

pavonia glabro simpliciter
Fris folio linearis, ~~Stapogon~~ subunifloro villos.

Fris pavonia; corollis imberbibus, folio radicali ensiformi glabro,
caule simpliciter Lin. Syst. veg. Suppl. 60. Jacq. coll. Suppl. 40-8

4 Curt. mag. 168.

5. t. 168. Jacq.

Walt. Schocab. 1. Tab. 10

Fris pavonia; imberbis folio lineariglabbro, stapo subunifloro
Thunb. Diss. n. 35. T. 1.

Habitat ad Cap. b. spei 7

Folium unicum, longitudine stapo, subanaliculatum, striatum.

Stapus pedalis erectus, articulatus. Spatha ^{bipolliaeres} ~~caudata~~ striata, glabra.

Pedunculi subnucupiter, uniflori, glabri. Corolla aurantia, basi
maculis punctisque nigris, supra basin macula cordata cœrulea basi
tomentosa nigra: laciniis exteriores majores, ovatae, obtusae, integrae
tres interiores lanceolatae. Nectaria tria, inter petala ^{ad basin} majora, et
foliolis ovatis obtusis petaliformibus. Thunb. l. c.

Secundum figura Thunb. folia villosa sunt et stapo glabri, secundum
descriptionem en vero vice versa

Versum

tenuifolia + foliis filiformi lineatis, capro bifloro Thunb. Fr. n. 30.

Fr. tenuifolia Pall. 2. 3. p. 714. t. C. fig. 2.

+ Habitat in arenis Caucasii ad Wolgam.

+ *Fr. tenuifolia* corolla embebi, spatula biflora, foliis longissimis filiformi, tubo filiformi elongato Lin. suppl. pag. 97. 7

Scapus simplex foliorum vaginis vestitus. Folia pauca lineari filiformia, vaginis latis detur rentia. Flores terminales gemini pallide coerulei. Capsula filiformis corolla longior. Stymate labium extenuis brevissimum obtusum: interiorius bifidum: lacini oblongo, multo his longioribus Thunb.

non vid.

Sweetia 17. Gris foliis caule trifloro brevioribus, ^{laciniis corollae} ^{majoribus} ~~petalis~~ undulatis & flexis
minoribus ~~submarginatis~~

Gris alba oris caeruleis Sweet. floril. t. ⁴¹ 44. f. 1.

Gris latifolia minor alba, oris caeruleis Tournef. ind. v. h.

Gris latifolia minor alba, oris dilute purpureis Tournef. ind.
v. h.

Gris Sweetii, corollis barbatis, caule trifloro foliis altiore, petalis
undulatis replicatis submarginatis Lamarck. Bot. 3. p.
296. illustr. t. p. 121.

Habitat - - - 2

Radix dora. Caulis sesquipedalis, tres, inferne foliis ~~alga~~ nonnullis resti-
tus. Folia six pollicem lata. Flores superne, tres, breviter
pedunculati. Spatha arida. Petala alba; majora extus dor-
so viridia, margine violaceo punctata, versus medium utrinque
venis nonnullis violaceis picta; minora ^{apice con-niventibus} arida spathulata;
ungue violaceo convexo; lamina oblonga, integerrima, lance

Linea picta linea violacea, inferne integerrima, sursum venas emittens, hinc
marginem parum violacea; supra linea alba violacea ab apice ad medium
ducta. Stigmata alba Barba apice lutea, pili superiores violaceo
viridi. # Stigmata violacea, utrinque versus marginem alba, petalis
interioribus dimidio minus breviora, bifida; laciniis acutis, extorsum
serrata, inferne integerrima. *

Germea oblongum, obscure triquetrum, lase

variegata ¹⁰ # Gris caula multiflora foliis oppositis, laciniis corollae deflexis
emarginatis

Gris latic Gris lutea variegata Loeb. hist. 34 Ehr. pict. t. 100. f. 3.

foliis panno Gris major latifolia Ellen. hist. 15. Clus. hist. 1. p. 221.

nica colore Gris pan nonica variegata Mest. hort. syst. vern. ord. 0. fol. 6.

multiflori Gris lutea foliis lutea, foliis repandi variegatis Bauh. hist. 2. p. 720.

506.

Gris variegata; corollis barbatis, caula subfoliosa longitudine foliorum multiflo-
ro lin. syst. veg. 90. Curt. mag. t. t. 16.

Habitat in Austria 4

remota

caulis sepe bipedalis, foliis parum longior. Folia pollicem lata, creta,
acuta, striata; superiora sensim breviora. Floris superne, ^{circiter quatuor,} #
flori, speciosi, superior primum florent. Spatha uniflorae, ovata,
lanicolata. Corolla laciniis exterioribus deflexis, curviformes, extus viridi-
flavescentes, supra alba, puncta lineis purpureo-violaceis ramosis ver-

germen oblongum, marginem abruptis, integerrimo, emarginata, basi flavescentia:
cum, sexque interioribus oblonga, basi attenuata, flava canaliculata, integerrima,
cutum, angulis flavo, citius angustis purpureo-violaceis. # Stigmata flava, bifida,
obtusis. laciniis acutis, serratis. *

9
japonica¹⁰ Iris foliis plicatis glabris et caule compresso multiflora breviori
bus Thurb. in act. Soc. Lin. 2. p. 327. +

Iris aequalens Thurb. fl. jap.

Saga et Siaga Kompp. Amoen. 5. p. 872

Iris aequalens Thurb. jap. 33.

Habitat in Japonia

Caulis pedalis, erectus, articulatus, striatus, glaber. Folia nervosa.

Spatha sub floribus foliis similis, obversa, sen sem breviores.

Corolla alba Thurb. l. c.

^{glabris}
aphylla & barbata foliis ensiformibus scapo multifloro subnudo aequantibus Thunb.

Fr. n. 7.

♀ n. latifolia caule aphylo Benth. pen. 32.

♀ n. aphylla corollis barbatis, scapo nudo. Longitudine foliorum
multifloro Lin. Spec. pl. pag. 56

Habitat

non vidi

8.

Fns squalens 9 8 *Fns* caule multifloro foliis altiore, corolla laciniis deflexis replicatis, erectis emarginatis.

Fns folio lato rugoso, petalis repandis ex purpureo sordido pallido et luteo variis, erectis vero squalida lutescentibus Boerk. Lugh. 2. p. 125

Fns squalens; corollis barbatis, caule foliis altiore multifloro, petalis deflexis replicatis, erectis emarginatis Lin. Spec. pl. 56.

Habitat in Europa australi. 7

Caulis bipedalis, teres, superna in pedunculis divisis. Sola ac ~~maxima~~ acuta, vix bipollis, ~~aristata~~ marginata.

4 obtuso, ventri costis junifloro caulina in medio ultra pollicem lata. Flores: Spatha lanceolata, margine purpurascens. Flores remoti, superiores brevius pedunculata. Corolla laciniis exterioribus oblongis, integerrimis, ^{max} emarginatis; extus basi viridi-flavescentes, venis obsolete subpurpureis, punctis; super in medio ad apicem intense violaceo super extrorsum gaturate purpureis; supra abare ad medium albo, simpliciter violaceo venoso, margine flavo venis et punctis paucis violaceis ornato; a medio ad apicem intense purpureo-violaceo: interiores barba flava, apice violaceo: interiores & spatulato, sordide flavescentes, cum ^{basi} tinctura violacea, extus basi viridi-flavescentes, supra violacea, margine violaceo venoso. Stigmata sordide flavescentia, carina lutea, bifida; laciniis acutis serrulatis. Germen oblongum, subtriquetrum, sex sulcatum. Stigmata sordide flavescentia, carina lutea.

lamina oblonga, stigmatibus duplo longioribus, super serrata, infera integerrima

laciniis acutis, serrulatis *

flexuosa 12 Fr. ^{fistuloso!} caule subtrifloro, foliis linear ensiformibus altiore fistuloso +

Fr. flexuosa; corollis barbatis, caule crasso, fistuloso, subfistuloso, trifloro,
altiori foliis angustis flexuosis Murr. in Nov. Comm. Tom 7. p. 30.

t. 4.

Fr. conditio floribus angustifolia Loeb. Adv. 2. p. 479.?

Habitat in Germania? &

Paulis teres, crassus. Folia terram pollicis partem lata, caulinea parva.
Spatha ferruginea, bi-vel multivalvi. Corolla alba: limbi laciniis
reflexis denticulatis, ungue venis violaceis lutes pectae; erectae dimi-
dis fere breviores, undulatae. Geromen Virginum. Stigmatalum Caenicae
crenatae Murr. l. c.

Toto habitu simili Fr. sibiricae, at corollae barbatae.

An Loeb. synonymum huius pertinet? varietatem ^{sibirica} ~~venim~~ Fr. ~~germen~~
vidi floribus albis.

Loeb. syn. an huius pertinet?

recurvus gladiolus corolla limbo reflexo, spica secunda, foliis linearibus Thunb. Desf.
pag.

2 gladiolus recurvus foliis ensiformibus, petalis subequalibus lanceolatis recurva-
tis Lin. Mant. pag. 20 * S. V. pag. 86.

x 1 gladiolus foliis linearibus sulcatis, floribus uno versus dispositis, tubo floris
longiore Mill. Ic. 157. t. 235. f. 2.

Habitat ad Q. b. p. 4

bulbus mag. scapus ^{linearia} striatus, foliis fere totis vaginatis, curvatis, palmatis. folia
nitiditate ³⁻⁴ ~~3-4~~ alternantia, amata glabra, sicapo breviora. Flores 3-7 cernui
magiori ^{membranis} ~~membranis~~ ^{erectis} ~~erectis~~ ^{alatis} ~~alatis~~ ^{extus rubri, intus albi, limbo} ~~extus rubri, intus albi, limbo~~ ^{reflexis} ~~reflexis~~. Corolla tubus filiformis,
virescens, spatha brevior. lacinae limbi lanceolatae, concavae. affinis
Ga. falcata Thunb. l. c. brachis flexuosa spatha linearis acuta stro-
to vixidem an vaginantes

13
plicata ~~tr.~~ Qris caule multifloro terati foliis & altera, laciniis corollae erectis plicatis,
erectis lacinibus Lamarck ill. bot. 3. p. 297. illustr. 1. p. 121. +
triplicata, corollis barbatis, caule multifloro

Habitat - - - 4

Caulis tripedalis, teres, folia pedalis, vix glaucescentia. Spatha
membranacea, interdum biflora. Flores fr. germanici duplo minores.
Odore stercorati, albido & dilute coerulesco variegati. Corollae laciniis su-
perne basi intus purpureo-venosa, medio albido & coerulesco: reflexo-
marginibus inflexis; erectis, undulatis. Stigmata pallide violacea; laciniis
vix dentatis. Germen cylindricum, sex sulcatum. Lamarck. l. c.

Pruna 7 foliis linearibus, scapo subtifloro Vereti, germinibus hexagonis Thunb. Fr.

n. 32. Frs ang. major. Cur. nan. 252

Frns angustifolia Clus. hist. 1. p. 220.

Frns prodrapsi angustifolia, foliis foetido Bauh. pin. 32.

Frns pruna corollis umbellatis, germinibus rotundatis
caule erecto, foliis sublinearibus Lea Spec. pl. pag. 50.

Var. qu. fl. aust. Tab. 4. fl. Dan.

Habitat in Germania pratis

Scapus Radix crassitie pollicis squa mihi latis fuso ferrugineis
tecta. Scapus sesquipedalis erectus Vereti, simplex tri vel
quadriflorus vaginis foliorum Vereti. Folia semiunguem
lata, scapo breviora ~~longiora~~, margine parum crispata
brachio lanceolato. flori coerulei.

biflora 14

Fris & capro tarati subtrifloro foliis longiora, laciniis corollae deflexis, erectis an
^{justioribus} ~~Chamaeiris~~ ^{bifloro} latifolia (Bast. herb. exot. var. Ord. 8. fl. 1.)

Chamaeiris major saturate purpurea biflora Bauh. pin. 32

Fris biflora; corollis barbatis, caule foliis brevioribus trifloro Lin. syst. veg. 90

Habitatio Lusitania rupibus. 4

Solia sterilia ^{tres quinque} Spithamea et ultra, inaequalia, pollicem lata, foliatis, ~~stricta~~
~~acuta, stricta~~. Scapi ad latera foliorum sterilia, plerumque duos,
foliis sterilibus parum altioribus, basi foliis duobus vel tribus brevissimis
sterilibus angustioribus vaginati, alter inter duos vaginas spathaeas or-
tus, alter nudus, terebrans, laevis. Florae & supernae, plerumque gemini,
subsessiles. Spatha ovata, oblonga, caesat tubo corollae ampliorae,
carinata, attenuata, viridi-violacea. Corolla intense purpureo-vio-
lacea: laciniis deflexis, oblonge obsolete denticulata, minime emarginata

germen tubo tri-
plo brevior, taratu-
rum, subsexlinea-
rum

tes; tres deflexae, erectis parum angustioribus; tres erectae, ancuatim
superne conniventes, spatulata; lamina oblonga # Stigmata longi-
tudine barba, laciniis corollae concolora, bifida; laciniis ovatis acutis
exteriorum dentata *

Fl. 14

Lambucina 4. foliis ensiformibus glabris erectis brevioribus sicapo multifloro,
petalis deflexis planis Thuab. fr. n. 10.

4nis major latifolia 8. Plin. hist. 1. p. 214.

4nis latifolia

4nis latifolia germanica, sambuci odore Bauh. pin. 32.

belgica odore

4nis sambucina corollis barbatis, caule foliis albis multifloro
petalis deflexis planis: erectis emarginatis Len Spic. pl.

Sambuci Mauk

theatr. 509
pag. 55. 4 Jacq. 4. tab. 2.

4nis major

Habitat in Europa australi 4

latifolia, cui

Scapus superne diviser, multiflorus, foliis longior bipedali. Folia
ensiformia, apice inflexo-falcata, striata superiori sensim breviora

in flore crasso

diffusa germanica petalis majoribus saturatis violaceis submarginatis,
minoribus emarginatis saturatis coeruleis, fymatibus acutis

veno purpureo
Bauh. hist. 2. p. 717

serratis, carina coerulea parte Thuab

4nis germ.
flore alba

~~4nis~~

4nis vulgaris
conditis floribus

4nis flore albo
Bauh. h. 2. - 119

Spathe uniflora bivalvis valvulis ovatis margine
violaceis apice membranae cili. flores pedunculati
petala deflexo emarginata venis saturate violaceis int. effusis
lucidoribus, integerrime fere erecta incurvato anuato
dentibus coeruleis emarginata vix denticulata. basi pubescenti
nascendi carina fymatum coerulea latere albedo coeruleo
tia bifida laciniis acutis serratis

Cristata 15 Tris ^{Compresso} caule puberulo Longitudine foliorum, petalis laciniis corollae non
aequalibus, barba cristata, geminibus Trigonis +

Tris cristata; corollis barbatis: barba cristata, caule puberulo
Longitudine foliorum, geminibus Trigonis, petalis subaequalibus

Hot. New. 1. p. 70. Smith. Specil. bot. 1. p. 12. t. 13. Cud. mag. 12.
t. 412.

Habitat in America boreali &

Tris cristata. Radix repens. Caules plerumque, vix digitales. Folia vix semipedalia,
numila, unice apice subfalcata, margine pallido membranaceo. Flores subsolitari-
biflora: calycis us, foliis parum humilior, erectus, purpureo-cyanus. Corolla lac-
tubo petalaco. nis exteriores dependentes, oblonga, obtusa, coerulea, maculis & stri-
laciniis trifascia undulatis, luteo fulvoque variegatis loco barbae: interiores parum
pubescentiam undulato-cre angustiori, acuta, tota coerulea. Stigmata laciniis corollae dimi-
nata Mich. fl. diobreviora et concolora. Smith Hot. New. et Smith. l. c.
bor-amer. 1. p. 22

pallida ^{Fr. corollis} ~~habitu~~, caule multifloro foliis alternis spatulis albis
^{ca. mar. T. Enc. pag. 21.}
 Habitat in Oriente 4
 Caulis reliquis multis altior tripedali teris. Folia seque
 pollicem lata. flori sesple remoti quinque 2 in pagu
 la spatula. Spatula lanceolata acuta, antequam flores
 emissent. Corolla pallide coerulea. Petala exteriorem
 oborata extus infera ^{inter} canna volderi supra dute coerulea
 vni basi violaceo fufescentibus barba alba apice flava integer
^{marginata.}
 interiora coerulea ^{con} consistens hyeme margini subdentata
 spatulata inferioribus concolora lamina basi integra ungue
 alba canaliculata vni fufescentibus ^{parto}, al Stigmata concolora
 petali margine ^{luteo} bifida lacini acuti ferati

Muh. ~~1792~~

chinesis 16 Anis ^{multifloro} scapo compresso, stigmatibus laciniatis.

Anis chinensis; radice repente, caule paniculato multifloro, floribus cristatis, stigmatibus laciniatis. Cust. mag. II. t. 373.

Anis fimbriata; foliis scapo compresso multifloro vix brevioribus; stigmatibus fimbriatis Vent. bot. Cos. col. g. t. 9.

Habitat in China &

Folia scapo parum breviora, pollicem fere lata, sensim attenuata, scapus superne divisus vix semipedalis, crassitie penno anseris superne in pedunculos divisus, inter flora compressus, inter floras flexus par. Pedunculi bi-triflori. Spatha ^{breviter} oblonga acuta; albida coenulescens. Floras pedunculati, pallide coenulescentes. Corolla laciniis iniquiliter dentata: exteriores subannata, flavo maculata: interiores immaculata. Stigmata bifida.

Affinis praecedenti

officinis unde castata ad de vent.

chinensis

minuta 25 Iris glabra, scapis unifloris, petalis minoribus lanceolatis +
Iris minuta; corollis barbatis, foliis lanceolatis glabris, petalis
alternis trifidis Lin. Suppl. 98

Iris minuta; barbata, foliis ensiformibus glabris, Scapo unifloro,
petalis oblongis acutis Thunb. Diss. n. 2.

Habitat in monte Leuwe Stat ad Cap. v. Spei 7

Caulis Scapus simplex, palmatis, erectus, foliis vaginatis. Folia circa
quatuor, alternatim vaginantis, Scapum squantia, superiora
sensim breviora, subfalcato-reflexa. Corolla lutea Thunb.
L. c.

papilionacea 4. foliis lineariibus reflexis hirtis Thunb. 4o n. 377. tab. 2.

Gris papilionacea hirta, corollis imbedibus, foliis revolutis Lin.
Suppl. pag. 98.

Habitat ad Cap. b. p. p.

Bulbus ovalis magnitudine nucis coruli, truncatus. Scapus erectus
palmans, uti folia pilosa subtansica, densus. Folia alterna
feminaequem lata, longitudine p. p. ex his nervosa convolu-
ta flexuosa recurvata, suprema spatheformia. Spathe bina
vaginantes, folia similes, pilosa pedunculi trigoni, ex eodem
centro bini, tres vel quinque incrassati, glabri inaequali p. p.
florentes. Petala majora lamina ovatis acuti: minorum lami-
nae ovato-oblongo. Signatum labium intenu bifidum
lacinis oblongo. unat quoad colorem corollae.

* Barbato
Folius ensiformibus

ciliata 24 Frns foliis ciliatis, petalis minoribus obovatis +
Frns ciliata; corollis barbatis, foliis lanceolatis undulatis ciliatis
petalis alternis obovatis Lin. suppl. 98.

Frns ciliata; barbata, foliis ensiformibus ciliatis Thunb. ^{4r.} ~~de Fr~~
de n. 1.

Habitat in collibus Cap. b. spei 4

Caulis capi plures, plurimi ⁱⁿ vaginis foliorum recedunt, unicus florens, to-
tus vaginatus, simplex, palmatis, debilis, ~~erectus~~, uniflorus, compressus,
glaber, albus. Folia radicalia circiter 8ena, basi subaequalia, interna
ra pensim breviora, basi convoluta, stapum ad summum vag alterna-
tim vaginantis, erecto-patentia vel recurva, acuminata, nervosa,
glabra. Corolla lutea. Stigmatis labium interius bifidum; lacinia
betacea. Capsula trigona, sulcata. Thunb. l. c.

Ciliata quis foliis

* Barbata
— Folius ensi fornicibus

Compressa 27. Fr. foliis glabris, caule paniculato compresso Thunb. Diss. n. 12 +
Fr. compressa; corollis barbatis, foliis ensiformibus planis, caule ramoso
compresso. Lin. Suppl. 90.

Habitat in Cap. b. 3 p. 4

Caulis frutescens, pedalis, ~~dictator~~ ^{in pedibus} decumbens, apice erectus, dictotome
ramosus, articulatus, bracteatus, striatus, glaber: rami elongati, unijflo-
ri. Folia caule breviora, acuta, nervosa, glabra. Bractea seu spatha
in caule et ramis ^{velut} lanceolata, pollicares, internodiis breviores, apice
membranacea, carina acuta, glabra, fusco-ferruginea striata. Corolla
lobis: limbo obtusa. Stigmata albo coenulescentia: labium exterius
crenulatum: interius bifidum; laciniis lanceolato, erecta. Thunb. l. c.

Compressa fr. compressa

ramosa *f.* foliis exiformibus; caule paniculato multifloro Thunb. Fr. n. 24

Habitat in arenosis ad Cap. b. p. ei γ

Caulis inferne teres, digitum crassus, superne ramosissimus, multiflorus
Rami subtrichotomi, compresso angulati, flectuosi glabri. Folia
radicalia ensiformia, longe vagrantia nervosa, apice attenuata
glabra, longitudine circiter caulis. Caulina sensim breviora
et in spatulas abrupta. Flores lutei. Bractea ad ramificationes
ovata, acuta, membranacea, ramis et pedunculis brevior.
Thunb.

Dichotoma 22 Frax subcaulis, scapo paniculato, ^{tereti} ramis bi-quadrifloris +

Frax dichotoma latifolia, variegata procerior Ann. nith. 103.

Frax dichotoma. Pall. it. 3. app. n. 61. t. A. f. 2.

Frax dichotoma; corolla tenuissime barbata, caule tereti elongate paniculato,
ramis alternis divaricatis ^{bi-quadrifloris} Lin. Suppl. 97.

Habitat in rupibus apricis totius Scandinaviae

Caulis inferne nudus foliis sex-septem, subradicatis; Rami & foliis alterni
erectus, subflexuosus; fol. Rami simplicis, elongati; Suffulta folis brevissi-
mo, terminati Spatha diphylla, bi-tri-quadriflora. Flores omni-
um congenerum minimi, longe pedunculati. Corolla laciniis ex-
teriores parvis majores, villis vix conspicuis barbata, violaceis, albu-
punctata; interiores saturatior, bilobae. Stigmata angusta, acumi-
nata, bifida. Capsula majuscula, obsolete trigona, acuminata. Pall.
et Lin. l. l.

Composita 4. corollis barbatis: barba cristata, caule subuni-floro longitudo-
ne foliorum, gemmibus trigonis petalis subaequalibus. Hort. kew. 1. p. 70

Habitat in America septentrionali.

Radix repens, caulis compressus vix digitalis, inferne vestitus
foliis oppositis. Petala externa oblonga, integra, coerulea
medio lutea, cristis tribus longitudinalibus undulatis loco barbae.
Petala interna parva lingua angustiora tota coerulea
filamenta et antherae pallide flavescentes. Stigmata
obtusae coerulea petalis breviora. Hort. kew.

21. *Fris pumila*; collis barbatis, caule foliis brevioribus unifloro Lin. Lin. Syst. veg. 89. Paugu.
austr. 1. p. 7. 1. Cust. mag. 1. t. 9

Habitat in Gallis, Austria, Pannonia collibus aridis sterilibus &

Stolo e in ster quinque, quadri-quinque polliciana, pollicem interdum lata, striata
capus, six sesqui-pollicaris, simplex, teres, inferne subcompressus, vaginatus.

Spithis vaginatus. Spithis tres, prope germen orto, scapo scapo parum ampliores,
lanceari lanceolato, acum uniangulato, acuminato, pallide virescentes, exte-

rior interioribus longior. Corolla tubo tri-quadrupollicaris, spithis longior: lamina
emarginata; exteriores primum patentes, dein superne reflexae, oblongae, basin versus

versim angustiores, inferne margine reflexae: interiores latiores, longitudine exte-
rior, sursum arcuatum conciscentes; lamina ovato-oblonga. Germen tri-

angonum, tubo corolla parum crassior, obsolete sextriatum. Stigmata corolla
concolora, bifida; laciniis ovatis, attenuatis, serratis *

Varietates plures praeter enumeratas dantur, illa flore flavescente gau-
det laciniis corolla exterioribus a medio ad basin sordide virescentibus

variabilis Frs

Fris bulbosa argus *Diplotria* variegata Bauh. pin. 30.

Fris variabilis Gaertn. coll. 2. p. 321.

Facies omnino similis *F. Hypsis* sed minor foliis angustioribus, petalibus extenuatis vix emarginatis, colore floris quam maxime variabilis Gaertn.

60

variegata ²⁵⁰ or 4. f. 11

Fris bulbosa flore caerulea et purpurea Eyst

ad *Hypnum*

~~*Fris bulbosa* mixta eb 11~~

~~nos *Fris* flore caerulea et purpurea t. t. 6~~

~~frag. fol. 290~~

Hypnum Lea

Bauh. math. 365

a descriptione Gaertnini non possibile est differentiam tradere

- pumila 21 *Frns* *Plantis*, *Clasps* *uniflora* *foliis* *brevibus*, *Corolla* *tubo* *est* *serto* *vagina* *longior*
nibus, *laciniis* *reflexis* *erectis* *angustioribus*, *Corolla* *tubo* *est* *serto* *breviores*.
- Chamomais latifolia minor Clus. hist. 1. p. 225
- Chamomais minor, flore purpureo Bauh. pin. 33.
- B Chamomais latifolia minor
- Chamomais flore purpureo-coeruleo Bauh. pin. 33
- V. Chamomais minor flore rubello Bauh. pin. 33
- d Chamomais latifolia minor pallida et alba Clus. pan. 225. Bauh. pin. 33
- Chamomais latifolia minor 4. Clus. hist. 1. p. 225. Best. exot. cyst.
- varn. ord. p. fol. l.
- E Chamomais latifolia minor varia Clus. pan. 225
- Chamomais latifolia minor 5. Clus. hist.
- Chamomais minor flore variegato Bauh. pin. 34
- } Frns angustifolia maritima minor Bauh. pin. 33.
- 2 Chamomais lutea altera Loeb. ii. 66.
- Chamomais flore luteo et pallide luteo Bauh. pin. 34.
- 2 Perpusilla saxatilis Frns latifolia acaulis forma Loeb. ii. 64.
- Chamomais saxatilis gallica Bauh. pin. 34
- Habitat in Gallia, Austria, Pannonia collibus apricis 74

Iris pumila; corollis barbatis, caule foliis breviora uniflora Lin. Syst. Veg.
Pg. Facq. aust. t. 1.

Habitat in Gallia, Austria, Panonia collibus & venibus ^{ex sequipolligant}

Folia circiter quinque, quadrival quinque pollicaria, striata. Scapus

simplex, ^{tres lobulatis prope germen ostii} spatha ^{basi} ^{officure con presilio} [#] amplicornis vaginata. Corolla laciniis emarginatis

^{foliis elongatis}
^{tri. quadr. peltatis}
^{spathe longior}

interdum exteriores primis patentibus deinde flexis, oblongis, per basin
versus attenuatis, inferne magis revolutis: interiores latiores, longitudini
exteriorum, sursum arcuatim conniscentes; lamina ovato-oblonga. Stigmata
colore corollae, bifida; laciniis ovatis, acuminatis serratis *

[#]
germen vix
trigonum

obsoletae per
Striatum, tub
parum crisp
sior.

Varietates propter ^{paludes} enumeratas ^{atque} dantur, illa floribus flavis, gaudet laciniis
corollae exterioribus supra in medio ad basin ^{ex} ^{sub} ^{inde} virescentibus

20
flavissima 17 Iris ^{caule} scapo bifloro foliis longiora, spathis longitudine tubi

Iris humilis angustifolia lutea, testa seminali rostrata alba. Amm.
meth. p. 101

Iris foliis ensiformibus; caule bifloro Gmel. sib. 1. p. 31. t. 5. f. 2

Iris flavissima. Pall. it. 3. app. n. 67

Iris flavissima barbata, foliis ensiformibus glabris, caule bifloro
Facqu. coll. 4. p. 90. ic. rar. 3. t. 200.

Habitat in regionibus Transbaikalicis Sibiria, locis humidis &

Affinis ~~pumila~~ Iris pumila, differens foliis angustioribus; magis linearibus: scapo proceriore, tenuiore, longius inter duo folia coarctatus, nec un-

dique a spadice vaginato: spatha brevis hinc spatha breviores quam
in reliquis valvulis subequalibus; gluma exili, tenuiore inter flores

Perolla tubus, longitudine spatha: laciniis intense flavo, vni fu-
rescentibus striata; barba flava: interiores angustiores Pall. l. 6

Ochroleuca 7. foliis ensiformibus, scapo subtereti, gemminibus hexagonis Thunb.

Fr. n. 22.

Triochroleuca collis imberbibus, gemminibus sex angularibus, caule subtereti, foliis ensiformibus. *Stratis* hennant. p. 1754

Habitat in oriente 4

Scapus vagans foliorum sectus, multiflorus, sesquipedalis
folia ⁵⁻⁶ squant scapum squantes nervosa pollicem lata
Flores alterni spatha alterna triflora, canaliculata
acuminata apice membranacea. Petala reflecta
basi dilatata venis obscurioribus. Limbo flavo orarymbus
albo. P. erecta longitudine extenditur, unica, basi venis flavis
f. entibus. Germin oblongum, profunde sex sulcatum angula
re, angulis obtusi

lutescens 19. In ^{brevissimo} scapo subunifloro, spatha ^{ante} longitudine tubi

Chamaenis latifolia minor 9. Clus. hist. 222.

Chamaenis minor othroleucos Bauh. theatr. 612.

Chamaenis flore pallide luteo 8. *Chamaenis minor otholeuca*
ca. Bauh. pin. 34.

Inis lutescens; corollo barbato, caule unifloro, foliis longiora,
tubo in spatham incluso Lamarck. dict. bot. 3. p. 297. illustr.

1. p. 122

Habitat in Germania et Gallia locis montosis 4

Similis precedenti, differre videtur: Folii glauci, scapo brevioribus:
scapo uni-bifloro: Corolla albido-flavescente, laciniis exterioribus
basi violaceo-reticulatis undulatis: spathis tubum ante involentibus
Wilden.

nudicaulis ~~tri~~ corollis barbatis, ligandi puberulis nudis submultifloris
vix congestione foliorum, spatii ventricosi vixibus La Mark

T. Enc. pag. 121.

Habitat

arenaria 10 ^{brevisimo} Fr. foliis scapo bifloro longioribus, flore superiore abortiente

Hist. plant. rar. Hungar. p. 57. t. 57 +

Habitat in Hungaria arenosis &
caulis ^{stomus} resque pollicariis, teres, nitidus, erecta . Solia glabra,
subnervosa . 8 loricis brevissimis pedunculatis; alter qui primus

florat abortit; alter inferior, uno alterove die serius evol-
vens, fertilis . Spatha ^{trivalvis,} submembranaea, pallida, nitida:

valvulae duae exteriores, subinflatae, lacinatae acutae vel
acuminatae; interior minor, ^{si flores progrediantur} apice bifida, dorso canaliculata,
si unius apice integra, dorso laevi . Corolla pallide flava:

petala obtusa, superne subcrenata, emarginata, basi rubro-
violaceo-venosis: interiora versus basin subundulata: Barba
crucio-flava. Antherae cinereo-purpureascentes. Germen

obtusum triangulatum, & exsulcatum, nitidum .

Stigmata ^{capitulum} exterius albidum, cum pullo lutescente; interiora
pallide flavum, bifidum; laciniis undulatis, versus apicem
denticulatis

officinis hinc lutescenti differit scapo bifloro, spatia inflatis

sorte
foliis linear-
sacifera

tubus pallide
virens

Affinis Fr. lutescenti Differ. Scapo foliis brevioris, flor. trifloro, flori alterni
abortiente; spathe inflata.

aphylla 17 Iris foliis glabris scapo ^{tereti} multifloro nudo equantibus

~~syn. Iris major latifolia 25. Clus. hist. 1. p. 223.~~

~~Iris latifolia, caule aphyllto Bauh. pin~~

~~Iris flore violaceo, foliis vivente Bauh. hist. 2. p. 723.~~

~~Iris aphylla; corollis barbatis, scapo nudo longitudine foliorum~~

~~Lin. syst. veg. 90.~~

~~Iris nudicaulis; corollis barbatis, scapis subternis nudis sub
multifloris, spathis ventricosis viridibus Lamourh. Dict. 3. p. 296. 44~~

illustr. 1. p

~~Folia radicalia, pedalia, pollicem lata, glabra, nervosa.~~

~~Scapi late ad latera foliorum, frequenter tres, laterales uniflori
intermedii bi-triflori, spatha ventricosa, virides, acuminati.~~

~~Corolla magna, purpureo-violacea: petalo ^{exteriori} majora ovalia, basi
albida, venis picta: interiora magnitudine exteriorum. Stigmata~~

~~pedalis concolora: laciniis serratis. Germina trigona Lamourh~~

~~l. c.~~

~~ad Clus. Syn.~~

~~foliis aphyllis~~

Tuberosa *Fr. imberbis foliis tetragonis* Thunb. *Ar. n. 43.*

Fr. Tuberosa folio anguloso Bauh. *per. 40. Monf. hist. 2. p. 390*

f. 4. v. 5. fig. 1.

Fr. Tuberosa corollis imberbis foliis tetragonis *Lin. Sp. 1.*

Mag. 5. 10

Habitata in Arabia Orientale &

*Scapi pedales erecti, uniflori foliis vaginati. Folia supra
altiora striata. Vagina longa. Spatha biphyllo longa lanis
lata longitudine florum. Flores pedunculati a latere spathe
non subpropendesi. Lamina petalorum rotundata fusca
violacea. Germen oblongum ^{o globosum} utraque acutum.*

puta Insi

Habitat in Cap. b. p. ei 7

Corolla lactea petalorum et stigmatum marginis lacinis, barba apice costae
Dens flava. Stigmata profunde bifida, tubis longitudine germinis obtus
Angoni. Scapus multiflorus. folia ensiformia glabra palmata

descript. imperfecta necis ubi descripte

Pseud- Aconu 27 Frs foliis planis, lacinis corollae interioribus stigmatibus minoribus

Glaucolus Cube d. alt. n. 21.

Aconu officinarum &

Aconu Brunsf. herb. 3. p. 27.

Aconu officinarum Fuchs 13

Aconu adulentinum Bauh hist. theatr. 634.

Frs Pseuda Aconu; corollis imberibus, petalis interioribus
stigmatibus minoribus Lin. spec. pl. 5. 6. 86. Don. t. 494. Pollich.

pat. n. 35

Habitat in Europa ad ripas paludum et desertorum &

Caulis tripedalis, tri-quadri-florus, superne parum flexuosus.

Folia caulem aequantia, pollicem lata, minus rigida quam Fr.
germanica. Spatha lanceolata, tri-pollicares, pollicem lata.

Corolla flava

#

* * Corollis imberibus
- foliis ensiformibus.

ad de Brunsf

Math.
ad de Syn Brunsf Math. et figur. petal.

halophila 4 corollis imbricatis germinibus sex angularibus, caule erecto, foliis
erectis: radicalibus longissimis Hort. Kew. 1. p. 72.

Huius halophila Pall. d. 2. p. 733. vol. 3. p. 713. tab. B. fig. 2.

Habitata in Siberia

Scapi foliosi sesquipedales: foliis longioribus trifloris: spatha
magna inflata. ^{marginibus} folia tripartita. Flores pallidi: angustis

bracteis inflatis stigmatibus non multo ^{marginibus} latioribus: spatha longioribus inflata: ^{marginibus} longis apice emarginatis

Folia pollicem lata: scapi teretes petala pallida flava extantibus

spathulata basi non dilatata dorso carinata vix ^{usque ad apicem} dilatata: ^{marginibus} ciliatis
minime undulatis: intrinsecus periclypeo punctis minutis fuscis: ^{marginibus} ciliatis

Camina oblonga semipollicina vix unguem lata integerrima non
emarginata venis venulis subrotatis densis: ^{marginibus} superius intensius

erecta lanceolata obtusa vix ^{usque ad apicem} dilatata basi versus angustata
superius subflava venis parvis laterationibus inferius minute punctatis

Stigmata latitudine unguis petalorum ex tenore albo flavescentibus
apice parvis bifida: caminis obtusis integerrimis, antheris
reflexis parvis ante basin suspensis stigmatibus porrectis

pedalis spathulatis.

tonu
P. reflexa
est cepto respici
apicem

H. media linea
lata flava parvis
ultra stigmatibus
est ciliatis

foetida ^{2^o} Gris caule uniangulato multifloro foliis longiore

Spathula foetida Aub. det. 2. n. 49. Tuck. 797. Label. ii. Besl. hort.
cyst. verm. ord. p. fol. p.

Xyris et Gris agria Shepherdii Label. ii.

Gladulus foetidus Bauh. theat. 564.

Spathula foetida, Xyris Bauh. hist. 2. p. 731

Gris foetidissima; corollae imbricatis; petalis inferioribus patentibus ^{5, 5i =}
mis; caule uniangulato, foliis ensiformibus. Lin. spec. pl. 57.

Habitatio Gallia, Anglia, Helvetia &

Caulis bipedalis, simplex, semiteres, articulatus, foliis spathaceis sagittatis.

Folia acuta, nervosa, foetida. Corolla coccineis; lobis; unguis petala
laciniis laciniis exterioribus plerumque rugosis; interioribus
laevibus, stigma albis majoribus. *

foetida

in mat. sola

spathulata In imberbis foliis ensiformibus angustis erectis caule subbrevis-
simo, spathe viridibus petalis majoribus spathulatis. La Mark T. Esch.
neg. 122.

Habitat in Gallia australi et Germania 4

versicolor 29 Frs caule tereti flexuoso foliis oquante, gemminibus subtrigonis

Frs americana versicolor, stylo non crenato Dill. Eth. 107. t. 155.

f. 107

Frs americana versicolor, stylo crenato. Dill. Eth. 108. t. 155. f. 108

Frs lat. folia virginiana, florum petalis repandis purpureis Ehrh. pict. t. 6/2.

Frs versicolor; corollis imberbibus, gemminibus subtrigonis, caule tereti flexuoso, foliis ensiformibus Lin. Spec. pl. 57. Curt. mag.

i. t. 21.

Habitat in Virginia, Pennsylvania, Maryland &

Caulis bipedalis, simplex vel superne bifidus, articulatus, bi-triflorus, articulatus. Solia semipollicem lata, vaginantis, sursum sensim breviora. Pedunculi alterni, breves. Spatha lanceolata, longitudine subaequalis corollae. Flores magnitudine fr. sibirica. Corollae lobis exterioribus semipollicem lata, integerrima, emarginata, extrorsum a basi ad medium virescentia, carina alba, extrorsum violaceo-purpureo-violacea; supra extrorsum purpureo-violacea, inferne alba.

Germen Virginicum
absque pulvis

venis et punctis violaceis picta, medio lutea. interioribus patentes. cuneato, longitudine stigmatum, integerrime coenulo-violaceo. Stigmata violacea, margine alba, bifida, laciniis obtusis.

paronica 7. folio linear^{villoso} glabro, scapo subuniiflora Thunb. Fr. n. 35. Tab. 1.

Griseo paronica collis imberbita; folio radicali enfiiformi
glabro, caule simpliciter her. Suppl. pt. pag. 90

Habitat ad Cap. b. nei

Scapus teres, articulat^{us} villosus, simplex, subuniiflorus, pedalis. Solum
unicum lineare, subcanaliculatum, striatum, longitudine scapi
spatha acuta striata, glabro bipollicari. Pedunculi subantheris; veni
feri, glabri. Petala 3 externa majora ovata, obtusa, integra. Interna
interna lanceolata. Nectaria 3 inter petala majora a folioli ovatis obtusi
petaliformia ad basin. Corolla aurantia, basi macula punctata nigra
supra basi macula cordata coerulea basi tomentosa nigra. Capsula trigona

Thunberg

non vid.

virginica 30 Fns caule anicipiti multifloro foliis actiore +

Fns virginica; corollis imberbibus, germinibus trigonis, caule anicipiti.

Grön. virg. 7. Lin. Syst. Veg. 91. Gaerq. ^{collet.} ii. rar. 2. t.

Habitat in Virginia & Carolina &

Caulis pedalis vel altior, articulatus, foliis vaginatis. Solia angustiora, apice incurva, superiora sensim breviora. Spatha marginata venis sine membranae theat.

Elatior, Spathae lineari-lanceolatae. Corolla coerulea, purpureo-venosus. Capsula trigona, angulis sulco extantia Mich. l. c.

Fns hexagona; nectario tomentoso; caule tereti; foliis ensiformibus; corollis inferne ~~viridescen~~ viridescen-^{tes} tibus, superne purpureis; stigmate petalis interioribus breviora; capsula trigona, angulis profunde sulco bifidis et fere hexagona Walt. fl. car. 66. Fns virginica; caule angusta folioso, hinc acuto & ubi trifloro; calycis laciniis trifasciis mucido tomentosa: capsula oblonga, angulis sulcatis. Mich. fl. bor. am. l. p. 22.

biflora 4 foliis ensiformibus, glabris sicapo subtrifloro brevioribus Thurb. Fr. n. 6

S. V. pag. 88

Inis latifolia biflora Best. agrest. vern. ^{ord. 9. fol.} ~~biflora~~

Chamaeiris major saturate purpurea biflora Bauh. pin. 33.

Inis biflora Corollis barbato, caule foliis brevioribus trifloro

Lin. Spec. pl. pag. 56

Habitat in Leptandis rupibus 4

Scapi simplex striatis, bifloris, spithameis vel ramis
altior, foliis longior. Folia subsiliata, acuta, striata, venato pa-
tula. Petala violacea integra. Capsula baccis subsiliata. Thurb.

Spuria 31 Fr. caule subtrifloro foliis longiora, laciniis exterioribus corollae & spathae

lati, geminibus hexagonis
Fr. sylvestris maritima nasbonensis Lab. ii. 68

Fr. angustifolia pannonica Plus. pan. 252

Fr. angustifolia l. Plus. hist. v. 1. p. 228

Fr. foliis angustis prima Plus. hist. v. 1. p. 228

Fr. angustifolia major maritima major Bauch. theat. 600

Fr. spuria; corollis imberbibus, geminibus sexangularibus, caule tereti, foliis sublinearibus Lin. syst. veg. 93. 8l. Dan. t. Jacq. austr. p. 67

Quadr. mag. 2. t. 50 Fr. spathulata; imberbis, foliis ensiformibus angustis erectis, caule subbrevis, spathis vixibus, petalis majoribus spathulatis Lamark. nit. bot. 3. p. 300. illustr. 1. p. 123.

Habitat in Europa praetis.

Radix crassitie pollicis, squamis latis, fusco-ferugineis texta. Caulis sesquipedalis, simplex, teres, triquadri-florus, squamis vaginis foliorum texti
foliis semicunquam lata, margine parum crassiora. Spatha lanceolata. Flores coerulei.

basin versus dilatatae, canaliculatae

Corollae laciniis exterioribus extrorsum violaceae interius flavis striatis: interiores erectae lanceolatae, totae violaceae.

Gramenea 4 foliis linearibus, scapo subbifloro ancipiti, gemminibus hexagonis Thunb.
Fr. n. 31.

~~Fr. angustifolia? Clus. herb. 1. p. 230~~

~~Fr. angustifolia primum sed olea minor Bauh. pin. 33.~~

~~Fr. gramenea vallis imberibus, gemminibus sexangularibus,
caule ancipiti, foliis linearibus. Lin. spec. pl. pag. 50.~~

~~Fr. qu. fl. austr. 4. p. 2.~~

~~Abbatia in Austria ad radices montium 4~~

~~Scapus compressus sub biphyllus uniflorus vel biflorus
pedalis. Folia linearia angusta striata, scapo altiora~~

~~Flores coerulei lutei. Capsula hexagona ventricosa~~

Spec. praestituta L. montana a spuria non differt, sed specimina ab ipso L.
Fr. n. 31. ~~Fr. n. 31. L. n. 31. L. n. 31.~~

Orthoclelea 32 Fris caule subtereti flexuoso., gemminibus hexagonis

Quart. maj. 2. t. 61

Fris orthoclelea; corollis imbricatis, gemminibus sexangularibus,
caule subtereti, foliis ensiformibus striatis. Len. mant. 175. ~~Quart. maj.~~

Fris Gylldenstae d'tii Lepech. in act. petrop. 1701. 1. p. 292. f. 8.

Habitat in Oriente

Caulis sesquipedalis, vaginis foliorum vestitus, multiflorus, vix compressus. Dolia altitudine caulis, quinque ad sex in caule, dimidio angustiora quam fr. germanico, nervoso, striato. Spatha alternis, triflora, lanceolata, acuminata, apice membranacea. Corolla laciniis reflexis, exterioribus reflexis, spatulatis; lamina ovata, vix semipollicaris, flava, margine albida; unguis lamina duplo longior, medio parum dilatata, uti lamina senioribus obscurioribus picta: interioribus longitudine exteriorum, lanceolata, nivea, flavescenti-venosa.

Scorpeoides Iris acaulis, foliis canaliculatis, corolla laciniis tubis erectis
minimis, tuba longissimo La font. fl. atl pag 40 tab. 6
an Iris micropetala La Mart.

Habitat Algeria &
in bulbosa latifolia Clus h. p. Lib. Tournef.

halophila 23 Gris caule foliis altiore foliis radicalibus longissimis, caule fo-
liti altiore, gemminibus hexagonis +
Gris halophila Pall. it. 2. p. n. 99. vol. 3. n. t. B. 7. 2

Gris halophila; corollis imberibus, gemminibus hexagonalibus, caule
vereti: foliis radicalibus longissimis Hort. Kew. 1. p. 72

Habitat in Sibiria 4

Caulis sesquipedalis, triflorus. Folia fr. pseudacori, glaucescentia
Spatha magno, inflata, margine membranacea. Flores minores, pal-
lidi, superiore prociore. Corolla laciniis interiores angusto, stigma
te parum latius, medio nervo, venisque flandibus Pall. l. c.

Tricupis & folio lineari scapo subbifloro longiore, petalis alternis trifidis Thuab.

Fr. n. 15

~~Mura~~ In tricupidatae corollis barbatis, folio radicali ensiformi
petalis alternis trifidis Len. Suppl. p. 98.

Habitat ad Cap. b. p. c.

Scapus simplex teres, gemmulatus erectus uniflorus vel biflorus, sesqui-
pedalis. Folium unicum lineare nervosum erectum, apice dependens
scapo longius bipedale. Spatha lanceolata anguste valde adhe-
nente internodiis. Ovis longioris apice fuso. Petalorum maxime
limbo albo suborbiculato cum acumine pollicares. Lingua
extus virides intus flavae. Munda multoties breviora. Lamina trifida
laciniis lanceolatis divaricatis lineam longi. Stigmatis labrum
intervenit bifidum. Lacinus ovata obtusa albo erecto variat corollae
purpureis, flavis, albis violaceis Thuab.

ramosa 34 Inis caule paniculato multifloro Thunb. ⁱⁿ Dist. h. 24 +
Habitat in arenosis ad Cap. b. S. p. 24

Caulis inferne teres, digitum crassus, superne ramosissimus; multi-
florus: Rami subtrichotomi, compresso-angulati, flexuosi, glabri.
^{radicalis} Folia longitudine fere caulis, longe vaginantis, apice attenuata,
glabra, caulina sensim breviora et in spathas abeuntia. Bractea
ad ramificationes ovata, acuta, membranacea, ramis et pedunculis
breviora. Flores lutei. Thunb. l. c.

Inis ramosissima; corollis imberbibus, foliis ensiformibus planis,
caule paniculato ramosissimo obsoleta tetragono Lin. Suppl. 94

Tripetala 4 folio lineari scapo in iflos longiore, petalis alternis subulatis

Thunb fr. n. 14

Gris *Tripetala* corollis barbatis, folio radicali unico lineari capfor
mi - canaliculato, petalis alternis subulatis Len suppl. pag. 97.

Habitat in Cap. b. p. rei

Solum unicum vaginari, lineare, canaliculatum, glabrum, nervo
sum, laxum, dependens, scapo duplo longius. Scapus simplex erectus
terci, geniculatus, subniflorus, glaber, pedalis. Genucula bracteis
bivalvis pedunculam amplectans, infero brevior, acuta gla
bra, unguiculari vel ultra. Corolla coerulea. Lamina ovata
acuta. Petalorum minorum lamina lineari subulata - Germe
sex sulcatur. Stigmata linearia. Labium externum obtusum externum
longissimum longitudine fere camerarum Thunb.

Spathaceae 35 Grise foliis rigidis, caule tereti bifloro, spathis longissimis
Thunb. ~~Dis.~~ n. 29.

~~Habitat in Africa australi.~~

Grise spathulata; corollis imberbibus, foliis ensiformibus gla-
bris striatis rigidis, spathis subulatis longissimis Lin. suppl. 99

Habitat in Cap. l. spec. 4

Caulis simplex pedalis, multiflorus. Folia duo vel unicum, a
medio ad apicem sensim valde attenuata, marginata, nervoso-
striata, glabra. Spatha foliis similis sed latior, apice membra-
nacea, spithamæ Thunb. l. c.

minuta G. foliis ensiformibus glabris, scapo unifloro petalis oblongo obtusi

Thunb. G. n. 2. p. 1. pag. 80.

Fr. minuta corollis barbatis, foliis lanceolatis glabris, petalis
alternis trifidis Lin. Suppl. pag. 90.

Habitat ad Cap. b. p. ei

Scapus simplex foliis vaginatus, erectus, uniflorus, palmari,
folia lineata quatuor, alternatim vaginantis, subfalcato reflexa
integra, glabra, scapum aequantia, superiora sensim breviora
Corolla lutea Petala minora lanceolata Thunb.

microptera 36 Iris acaulis, corolla tubo longissimus; laciniis erectis minimis

^{patulis}
Iris bulbosa latifolia 1. Clus. rar. hsp. 274

Iris bulbosa latifolia flore coeruleo et candido Bauh. pin. 302

Iris alata; in herbis, foliis ensiformibus, tubo longo f. liformi,
petalis interioribus minimis patenti reflexis Poir. 4. 2. p

Dub. bot. 3. p. 302.

Lamarth. Illustr. 1. p. 124

Iris scorpiodes; acaulis, foliis canaliculatis; corolla laciniis tri-
bus erectis minimis; tubo longisimo Desfont. fl. Atlant. 1. p. 40

t. 6.

Habitat in Barbaria 4

tubus rupe niglandis major, basi emittens tubera plura fusi formia fasci

folia radicalia, plerumque, erecta corolla breviora, semipatentem
lata, sensim attenuata culata, folia rad crassitie pennis

Digiti minimi Cyano, sensim angustata. folia radicalia, plura, flore breviora,

semianguem lata, glis sensim attenuata, glabra. Scapus brevis
simus, plerumque uniflorus. Spatha tubo brevior. Corolla coe

rulea mag nitidior fere tridis germanicis: Corolla tubus tenuis: laco
riso limina ^{exterioris} ovato ob longo crenulata: erecta minores, lanceo

rest

Juncea & Scapulis teretibus foliis unifloris, foliis filiformibus scapo
altioribus

Fr. juncea: uniberbi, foliis junceis filiformibus, scapo unifloro,
spathis mucronatis Pers. d. vesp. germ. p. 2. pag. 135.

Legi in montosis circa Hammamelis Turcici

Stapus pedalis erectus, crassitie pennae columbae, simplex stria-
tus, adhaerens, glaber, vaginis foliorum teretibus. Folia alternis-
sima vaginantis, convoluta, filiformia caule duplo angustioribus
tenues pime striata, scapo altiori. Spatha diphylla foliolis
lanceolatis basi subventricosis acuminatis margine superne
et acumine membraneis Petala exteriora patentissima
Cernua alligata ovata emargina ceteris angusta

Fr. bulbosae angustifoliae floris flavo medio albo. Gr. l. Vind. Luf.

luteo. Stigmata maxima, longissima, communia, profundae bifidae.
Linn. & Bernh. & Luf.

unguicularis 37 Fris acaulis, Corolla tubo filiformi longissimo, laciniis omnibus
erectis subaequalibus

Fris unguicularis, imberbis: Tubo filiformi longissimo petalis om-
nibus erectis subaequalibus Poir. fl. 2. p. Lamarck. illust. t. p.

Dict. bot. 3. p. 302. 124.

Fris stylosa; acaulis; foliis ensiformibus; corolla laciniis sub-
aequalibus; tubo longissimo Desfont. fl. atlant. 1. p. 40. t. 5

Habitat in Barbano 4

Folia erecta, linearis-ensiformia, ^{sem} flora altiores, semina
quem lata. Scapus sesqui-pollicaris, uniflorus. Protha diphyllo
foliis similis, interior longitudine tubi. Corolla coerulea: tubus sex pollicaris,
tenuis. Laciniis lamina oblonga, inferne ^{interioribus} benam angustiores. Stylus
germen oblongum, longitudine tubi: Stigmata linearia, angusta, profunde bifida;
terres laciniis acutis.

stylosa 4ms acaulis

Hiphium 30 *Iris* foliis canaliculato-subulatis, ^{caule} ~~stipite~~ bifloro, ^{laciniis} corolla & stigmata
fere angustioribus, germine tereti Trigonium Erh. bot. Eindh. beyt bei
tr. 7. pag p-139.

Iris bulbosa flore luteo, mixto, violaceo # Basl. hort. cyst. est. ord.

mixto, variegato 4. fol. 2. 6. 10.

Iris bulbosa coeruleo-violacea Bauh. pin. 40.

Iris Hiphium; corollis imberbibus, floribus binis, foliis subulato
canaliculatis caule brevioribus Lin. hort. up. 17

Hiphium vulgare Mill. dict.

Iris variabilis Gay. collect. 2. p. 224 321

Habitat in Hispania & Lusitania 4 ^{convolutis subulatis}
Mullus oratus. Caulis persepipedalis. Folia caule parum longiora,
Spathae longitudine tubi. Corollae lacinae exteriores oblongae
Mullus minor quam in sequente. Folia angustiora. Corollae lacinae
exterioribus sex emarginatae Gay. l. 2.

Sipynachium 4 foliis lanceatis undulatis reflexis, scapo unifloro Thunb.

Sipynachium fr. n. 25
Eod. et
Panan. v. 2

Sipynachium napus Pluf. hist. 1. p. 216. Bauh. pin 40

Pluribus
pag 74-4-193

Sipynachium corollis imberbeus, foliis canaliculatis
bulbis geminis superimpositis Lin. Spec. pl. pag 598

Sipynachium minus Pluf. hist. 1. p. 216.

Sipynachium medium. Bauh. pin 41.

Pana nos elha
Sipynachium
profunde radicati
basi attenuati

Habetaria Hispania, Septimia & Barbana &
scapi & vertes fructuum superne spathi latius membr. striatis alba
natis membranacei basi foliis vaginatis, simplicis. Folia
linearia scapo duplo latiore canaliculata striata
spatha tri e singula flor. coenitica alterna

H. lob. 4. 197

elongatis canaliculatis, scapo subtrifloro

Xiphoides 39 *Gris* foliis conatimulato-subulatis, caule ^{caule} bifloro, corollae laciniis ^{corollae laciniis} petalis stigmatibus multo
laciniis, germine acute angulato Ehret. Lect. 7. p. 140

Gris bulbosa *anglicana* major, flora candido, violaceo, coeruleo, ^{est.}
Best. hort. Cyst. non ord. 4. fol. 7. o. 9. 10

Gris bulbosa latifolia caule donata Bauh. pin 30

Xiphium latifolium Mill. Dict.

Gris Xiphium Faique. Collect. 2. p. 320

Habitat in Hispania γ

Corollae laciniis emarginatis Faique l. c.

~~*Gris Xiphium*~~ Bl. Lin.
Spec. pl.

foetida 4. foliis ensiformibus, scapo unangulato Thurb. Fr. 214.

Spathula foetida ^{Hydr.} Dod. pempt 247. Bauh. hist. 2. p. 731.

Gladolus foetidus Bauh. pin 30

4ns foetidissima corollis imberbibus; petalis in senonibus paten
tis, caule unangulato, foliis ensiformibus Len
nei: pl. pag 174

Habitat in Anglia, Gallia, Aetruia &

Scapus simplex semiter vel uniangulatus; articulatus, foliis spathaceis
vaginatis alternis, multifloris bipedalis. Folia acuta nervosa, sic
pobrenoria, foetida. Petala coenulescenti. Infloia magnitudinis mediana
unques majorum subhis plii i rugosi: menora erecto-patula, signati
bus majora Thurb.

val. l. rdu
mubn
Spathula foetida
Lob. il

Spathula foetida Turth. 194 Rub. d. n. 49 Ves. l. verm. o fol. o
gladulus foetidus Bauh. theatr.

non ordi

Sisyrinchium 40 Gris foliis canaliculatis Scapo ^{sub} trifloro longioribus.

Sisyrinchium Cordi et Olesii Lobel. ic. 97.

Sisyrinchium majus Clus. hsp. 279. hist. 1. p. 216.

B. Parva noselha; Sisyrinchium Theophrasti Clusio Lob. ic. 97

Sisyrinchium minus Clus. hsp. 280. hist. 1. p. 216. Best. hist. cyst.
est. ord. 3. fol. 9

Gris ~~foliis~~ Sisyrinchium; corollis imberlibus, foliis canaliculatis,
4is, bulbis geminis superimpositis Lin. spec. pl. 59. Cavan. ic.
2. p. 74. t. 193.

Habitat Hispania, Lusitania, Barbaria &

42 Bulbi 8000 gemini, scapula duplo altiora, laxa, attenuata, arcuata, interdum
altera supra aeternum contortis. Scapus spithameus, simplex, tenuis, attenuatus superne testis spa-
thae subrotundi, tenuis, extus reticulato
tenuitate. Thir laxis, attenuatis, membranaceis, basi foliis vaginatis. Spathae
Tres, e singulo flor unicis. Corolla parva, pollide coerulea.
laciniis exterioribus macula lutea ornatis: interiora panum brava

videndum num Cavan. ic. ad 13 pertinet

Suetia Anni corollis barbati caule trifloro foliis albore, petalis undu
latis replicatis submarginatis La Mart. Enc: pag 121.

Habitat

Caulis sesquipedalis raris inferne folia aequat. Folia caule breviora
vix pollicem lata. Flores tres breviter pedunculati. Spatha
anda membranacea. Petala alba. majora extus. Dorsum veni

barba apice
tuba superior
pili superiores
tuba violacea

dui margine violaceo punctato linea versis medium utrinque
veni nonnullis violaceis. interiora spatulata utque violacea
convexo, lamina oblonga emarginata, integerrima latius
linea violacea basi integerrima venis violaceis perper margi
ne vel parum violacea intus linea in medio ab apice ad
medium violacea, et erecta convexa apice constricta
stigmata violacea utrinque marginem versus albidu
petalis interonibus dimidio breviora, bifida laciniis acutis
extrosam serrata, inferne integerrima, germen oblongu
obscure triquetrum laxe. Tubu, corolla violaceis

Juncea 41. Iris foliis convolutis subulatis, caule subdifloro altioribus, corolla
tubo elongato.

Iris mauritanica Blus. cur. post. 24.

Iris bulbosa angustifolia flore flavo medio albo Gisl. vind. lvi.

Hephaion minus, flore luteo Tournef. inst. r. h. 364

Iris juncea; imberbis, foliis junceis filiformibus, scapo unifloro,
spathis mucronatis Poir. it. 2. p. 135

Iris juncea; bulbo unido; caule subdifloro; foliis subulatis carea-
liculatis, spathe diphylle, acuta; tubo corollae elongato Desfont.

cl. Atl. 1. p. 39. t. 1.

Habitat in montibus circa Hamamachy Tunisi, in Atlante Desfontaine

4
Bulbus subrotundus. Caulis pedalis, crassitie pennis columbino, sim-
plex, erectus, striatus, articulatus, glaber, vaginis foliorum vestitus.
Folia caule duplo angustiora, basi vaginantia, tenuissima striata.
Spatha diphylle; foliolis lanceolatis, laxis, subventricosis, acuminatis
vete

H. Aion ^{Magnitudine 4. p. 200. ~~200~~}
margine superiore et acumine membranaceo. Corolla lutea: petala exteriora
patentissima; lamina ovata, emarginata: interiora angusta. Stigmata
bifida; calicis denticulatis. Capsula triangulari

Setifolia 429 ^{sub}
Tris folio filiformi erecto, cauleg monophyllis subunifloro glabro, spathis
^{acutis}
Tris setacea, corollis imbricatis, folio filiformi glabro,
caule simpliciter, spathis membranaceis Lin. pupph. 99

Tris setacea; folio filiformi-lineariter erecto glabro, scapo glabro
unifloro, spathis acutis membranaceis Thunb. Diss. n. 29. t. 1.
Habitat ad Cap. b. spei 7 erecto,

Caulis palmaris vel pithamou, simplex, erectus, uniflorus, raro
divisus, triflorus. Solum ^{unicum} *capitum*, raro duo in caule, erectum,
apice ² scapo duplo longius, apice cernuum. Flores minuti,
caerulei. Thunb. l. 1.

Spathealca 9 foliis ensiformibus rigidis, scapo tereti bifloro, spathe longis simili
Thunb. Fr. n. 23.

Habitat in Africa australi

Scapus simplex multiflorus pedalis. Folia duo vel unum
a medio ad apicem sensim valde attenuata, marginato nervoso
striata, rigida, glabra. Spathe folio simili sed latiori apice
membranaceo, spathe meo. Thunb.

angusta 47 Fris foliis filiformi erecto scapoque subunifloro glabro, spathis ob-
tusis. +

Fr^{is} angusta; imberbis, foliis filiformi lineari erecto glabro, scapo
glabro subunifloro, spathis obtusis Thunb. Diss. n. 20

Habitat ad Cap. b. sp. 4

Scapus spithamow vel ultra, subsimplex, terre erectus, ruzi-
natus, articulatus. Solum blapum inferne longe ruzinans eoque
longius, acuminatum, striatum, glabrum. Flores terminales,
unicus vel duo, erecti, simul florentes. Spatha exterior glabra,
viridis, apice rubro, pollicaris; interiores tenuissimas, alba.

Petalorum lamina acat pollicaris, ovata, obtusa, extus purpureo
nervosa, intus flava; minorum lanceolata, obtusa, extus fusco-
purpureo-striata, intus flava. Stigmatum labium interius bifidum; la-
terius oblongo, latera exteriora producta. Capsula trigona,
obtus. Thunb. l. c.

tennifolia 44 Ans acaulis, foliis filiformibus longissimis, ^{scapo brevisimo bifloro,} corollarum tubo filiformi elongato.

Ans tennifolia; Pall. N. 3. app. ⁿ 27. t. C. f. 2.

Ans tennifolia; corolla imberbi, spatha biflora, folio longissimo filiformi, tubo filiformi elongato Len. suppl. 97

Habitat in arenosis Dauria ^{et} ad Wolgam 3

^{caes} caespitosa Solia subscitana, scapo multiter longiora, ~~stomat~~ ^{sub} Flores terminales gemini pallide caerulei. Spatha terminales biflora, trivalvis: valvulis aequalibus, ac lanceolatis, acuminatis. Flores pallide caerulei, odora caryophylleo fragrantis. Corolla tubus albidus. Lacinis longis, lanceolatis, inferne versus sensim attenuata; exteriores disco albido, caeruleo-venose; interiores apice rix conniventes, lacte caeruleae. Stigmata profunde bifida; lacinis apice crenatis. Pall. l. c.

Urtica *trifida* *subuniflora* *foliis* *eniformibus* *scapo* *brevi*. ^{Cinean}

^{re} *trifida* *an* *spuna*? *Pall.* *J.* *vers* *germ.* *3.* *append.* *pag.* *26* *tab.* *P.* *fig.* *1.*

Habitata *in* *Siberia*

Radix *repens* *setis* *fordidis* *vesta*. *Folia* *plura*, *radicalia*, *palmaria*
Cinean *eniformia* *sive* *semuquam* *lat.*, *scapo* *breviora*
tempore *floendi* (*autumno* *scapo* *tripedale* *Pallas*) *attenuata* *acuta*
Scopi *inter* *duo* *folia* *spathiformia* *pollicaria* *altero* *inferiori*
1-2 *4* *in* *scapo* *foliis* *longior*, *longitudine* *digiti* *inter* *medii*
spathe *duo* *spathe* *in* *apice* *scapi* *ungueulares*, *oblonga*
obtusis *stramineo*, *calvula* *duo* *gram* *glume* *graminum*
referens. *Flos* *platanus* *vel* *2* *sepali* *alute* *cyaneis*. *Petala*
externa *reflexa* *alutior*, *medio* *albida* *venis* *saturnatis* *coeruleis*
interna *erecta* *cum* *stigmate* *inter* *se* *colorata* *lanicolata*
germe *12* *lobatum* *fulvis* *alternis* *pro* *fand* *coribus*. *Capitulo*
triquetro *set* *angulato*, *argulis* *carinatis*.

persica 45 ^{brevisimo}
Fris foliis linearibus - subulatis, canaliculatis, saepe ^{interioribus} ^{interioribus} ^{interioribus} saepe unifloro alboribus, corolla
laciniis ^{alternis} ^{alternis} ^{alternis} brevissimis, patentissimis
H Stephium persicum praecox, flore variegato Tournef. inst. v. h. 363.

Fris persica; corolla imbedi: petalo interioribus patentissimi
mis serratis, foliis subulato-canaliculatis, caule longiori
bur Lini. spec. pl. 59. Rust. mag. 1. t. 1.

habitat in Persia &

Radix bulbosa. Folia radicalia, ^{Tripollicaria} nervosa, ~~stipitata~~, glaucescentia. Sa-
pus brevissimus. Corolla tubus elongatus: laciniis tres majores erecto-
patentes, oblongis, medio dilatata, undulata, submarginata, albo
medio linea flava, punctis violaceis adspersa, apice violacea: interio-
ri ^{anguliculares,} ~~albida~~ linearibus, oblongis, convolutis. Stigmata longitudine lacini-
narum anteriorum, albida, medio linea dilute coerulea bifida;
laciniis semianguliculis, ~~se~~ ^{se} ~~laciniolatis~~, serratis *

H (Fris persica variegata praecox Terr. fl. 2. st. 152
Fris bulbosa praecox minus odora persica variegata Mon. hist. 2. p. 357.)

virginica 7. foliis enspiramentibus, scapo ancipiti Theob. Fr. n. 20

In virginica corollae imbricatis, geminis trigonis, caule
ancipiti gron. v. 7. Lin. Sp. pl. 50.

Habitatio Virginia 2

Scapus articulatus, foliis alternis vaginatus, pedalis longi
tudine foliorum, multiflorus. Folia angustiora apice vicius
v. superiora sensim breviora. Botho margine tenuissime
membranaceo. Theob.

vel aliter

verna 46 Iris foliis planis, spapo unifloro foliis brevioribus, petalis subequalibus. +

Iris virginiana pumila & chamœiris verna angustifolia, flore purpureo-coeruleo odorato Plukh alm. 190. t. 146. f. 6.

Iris verna; corollis imberbibus, caule unifloro foliis brevioribus, radice fibrosa. Lin. Sp Syst. Veg. 92.

Habitat in Virginia 4

Scopio ^{simplex} inferne spathis alternis tractus.

polytrachya 9 foliis lineariibus planis, scapo glabro ramoso Thunb. Fr. n. 40

Habitat in Cap b. spici

Scapus teres, superne durus, articulatus, glaber, multiflorus, pedali vel ultra. Folia alternantia linearia, apice fetaces — attenuata, nervosa, erecta, scapum aequantia. Flores magni, praecipue coerulei. Spatha apice fiansosa, laevis. Thunb.

Ventricosa 47 9ns subcaulescens; caule subhifloso foliis brevioribus, spathis ventricosis, germi-
nibus ^{trigonis} trigonis +
9ns ventricosa Pall. it 3. app. n. 62. t. 13. f. 1.

Habitat in montosis Dauria 4

Cespitosa. Cauli roduntalis, simplex, foliis vaginatis, lanceolato-cus-
formi instructo. folia paucis, angustissima. Spatha ventricosa, bi-
fida, bivalvis; valvulis tribus, latis. Corolla tubus elongatus pallide

coerulea: tubus elongatus: laciniis exterioribus erecto-patulis, oblongis;
interioribus erectis, oblongo-linearis. Stigmata laciniis corollae aequantur;
bifida; laciniis sublinearibus. Germe trigonum, lateribus bulbis bi-
partitis Pall. t. 1. c.

metaleuca

~~Luzeni M. scapo ancipiti, foliis subfalcatis, flore subpolitano Thunb.~~

~~M. n. t. Tab. 1.~~

~~Mossa Luzeni caule ancipiti unif. bifloro, foliis ensiformibus
inferius subfalcatis, floribus terminalibus Lin. Suppl. pag.~~

~~994 M.~~

~~Habitat ad Cap. b. p. ei.~~

~~Folia radicalia plura, disticha linearis ensiformia strata
bi-²follicularia: Scapi spathacea, mota articulos alter
na remota inferiori tripolliciana superior polliciana
Flores terminalis solitarii vel 2 raro tres pedunculati
erecti pedunculi breves spathe duo ad basin pedunculi
longi, lato lanceolato pedunculo dimidio breviorae unguis
lanceolatae concavae oppositae apicis membranaceae. Corolla
inqualis bipartita: lacinae 3 majore obovatae emarginatae
concavae basi albae versus apicem caeruleae pollicares
3 minores angustiores ovatae obtusae basi albae ad medium
apicem atro. Stigma multipartitum Thunb~~

5
10

quora in genere
Inuali caerulea et africana ~~Danthon~~, uti bermudiana, palmifolia
Siphonanthi. Pavonia et undulata in Ferraria.

Sibiria o 48 Iris caule fistuloso subtrifloro foliis altiora, gemminibus trigonis

Xiphion sive gladiolus Coeruleus minor Trag. 557

Iris sylvestris byzantina minor peramoena Lab. c. 69.

Iris angustifolia media sive varia Clus. pan. 252.

Iris angustifolia l. Clus. hist. 1. p. 229.

Iris pratensis major Best. hist. cyst. vorn. ord. 8.

Iris pratensis angustifolia, non foetida altior Bauh. pin 32. Theatr.

597

Iris germanica sibirica; Corollis imberbis, gemminibus trigonis,
caule tereti, foliis linearibus Lin. spec. pl. 57. Pollich. pala n. 36. Faigu.
Austr. 1. p. 6. t. 3. Cust. mag. 2. t. 50

Iris pratensis, imberbis, foliis linearibus planis sub erectis, caule fistuloso
brevioribus, gemminibus trigonis Lamarck. dict. bot. 3. p. 300. Illustr. 1.

p. 123.

Habitat in Sibiria, Austria, Helvetia pratis 4

Caules sub bi-pedalis, teres tri- vel multi-florus, teres, superne divi-pus.
Folio semipalmata, sub erecta. Spatha scariosa, brunnea. Flores coem-
lu. Corolla laciniis exterioribus, oblonga, sensim inferne versus angustata
verte

basi reflexis,
emarginata, integerrima, ~~exteri~~ inferne lateribus flaviscentibus, violaceo-venosis,
Dorso virides: interiores erecta, lanceolato-^{summa} cuneata violaceo-venosa, in medio albedo
reticulata: interiores erecta, lanceolato-lanceolata, integerrima, parum coloratione
la violaceo-venosa, basi e marginibus conniventibus canaliculata. Stigma
ta violacea, bifida, ~~et~~ ~~versum~~ serrata *

Variat corollis albis, laciniis reflexis violaceo-venosis.

ensata 49 Fris Caule subbifloro tereti, gemminibus hexagonis +

Fris graminea Thunb. jap. 34.

Fris ensata; imberbis, foliis linearibus, scapo subbifloro tereti, gemminibus hexagonis Thunb. in act. Soc. Lin. 2. p. 320

Habitat in Taponia 4

florentina 9. foliis ensiformibus glabris scapo ^{tr}subtus flos brevioribus Thunb.
Fr. n. 5: P. V. pag. 88

ratu
9ni florum
9ni albata florentina Bauh. pin. 31.

floribus
nivei coloris
9ni florentina corollis barbatis, caule foliis altiore
subflos, floribus sesquipedibus Lin. Spei: pl. pag. 554

9ni florentina Mell. ii. 154.
9ni albata germanica Bauh. pin. 31. 9ni rubra candidi
Key. Or. P. 44 p. 3 9ni albata germanica Bauh. pin. 31. 9ni rubra candidi
habitat in Europa australi, Carnea lob. ii
1-9

introspiciuntur
superioribus
subdentato
inferioribus
basi plicato undulato
fere marginate
serrulato, petalis
concoloribus
venule sic
Scapus teres stigmatis sesquipedalis crispus pernae digiti mini
vel altero. Callos nervosa sesquipollicem perla
Lamina petalorum majorum obtuse emarginata
ciliis albis longis
alba: minorum oblonga. Stigmata nivea labium interius
obtusum externum bifidum: laciniis acutis, crenulatis
Capsulae acuminatae pollicem subcompressa bipede obsolete
trigona, trifurcata anguiculata Thunb.
a germanica differunt petalis albis emarginatis petalorum
minorum marginibus basi reflexis. Stigmatis labio crenato

Corolla alba cum fere un
craulis petala majora dependunt non emor
gine oviculae
Character Thunb. emendandus
Diam. ad pedum marginem reflexa

50
graminea ⁴⁴ Iris caule sub bifloro ancipiti foliis albae brevioris, geminibus
hexagonis angustifolia
Chamaetypis Lob. ic. 69

Iris graminea; corollis imberbibus, geminibus sexangulatis,
caule ancipiti, foliis lineariibus Lin. Syst. veg. 92. Jacq. Austr. t. 2.
Habitat in Austria ad radices montium.

Caulis pedalis, non subdiphyllus, uni-biflorus. Folia angust-
ata, striata, & lobes caerulea. Capula hexagona, ventricosa.
*

verna 4. foliis linearibus planis, scapo unifloro, petalis alternis aequantibus
Thunb. fr. n. 26.

~~Fr. virginiana pumila f. chamoini verna angustifolia flore purpureo-
rosculeo odorato Pluk. alm. 190. tab. 196. fig. 6.~~

~~Fr. verna corollis imberbis, caule unifloro foliis brevioribus,
radice fibrosa Lea spec. pl. pag. 50~~

~~Habitat in Virginia 7~~

~~Radix fibrosa. Scapus spatiosi alterni, sectis simplex uniflorus.
Folia linearia nervosa Thunb.~~

non vidi non

biglumis Tris acaulis, scapo subuniflora foliis breviora, spatibus diphyllis glumaceis, capsulis triquetris sexangulatis

An Tris an spuria. Pall. it. 3. append. p. 26. t. C. f. 1.

Habitat in Sibiria &

Radix repens, caulis borderis recta. Folia radicalia, plura, palmaria, se-
micunquam lata, lineari ensiformia, tempore florendi scapo breviora,
autumno scapo tripledalia, atque lineari ensiformia attenuata, acuta.
Scapi inter duo folia, breviora, striati veginati, erecti, striati longitudi-
ne digiti intermedii, erecti, striati. Spatha in apice scapi, diphylla: folio-
lis unguicularibus, glumiformibus, oblongis, obtusis, anidis, subtilissime stri-
atis, stramineis. Flores solitarii vel geminii, terminalis, sessiles, dilute
cyaneae: laciniis exterioribus lanceolatis; exterioribus reflexis, dilatatis,
medio albida, senis caeruleis saturationibus pictis; interiores paucum
angustiora, ut stigmata intensius colorata. German Striatum, pulis
alter nis profundioribus

Capsula mayno, fusca, triquetra sexangulata; angulis carina-
tis. Semina testacea, subglobosa. Pall. l. c.

An Tris lactea Pall. it. 3. app. 64 varietas? differre nam videtur, partium
magnitudine

longifolia ⁵² Gris foliis linearibus canaliculatis longissimis, scapo tereti multifloro +

Gris longifolia; foliis linearibus, canaliculatis, longissimis, glaucis; glan-
pusteres, multifloris; radice bulbosus Andr. repos. t. 45.

Habitat in Cap. b. Spei v.

bituminosa ³ Gn^{is} foliis spiralis, caule viscoso Thurb. ^{is.} Det. n. 42. t. 2.

Gn^{is} bituminosa; corollis imberibus, foliis ensiformibus spiralis;
petalis reflexis, caule viscoso Lin. suppl. 90.

Habitat ad Cap. 6. p. 4.

Caulis pedalis, flexuosa ^{us} ~~erectus~~, articulatus, superne divinus, multi-
florus, glutinosus. Solum unicum, caule brevius, apice attenu-
atum, striatum, glabrum. Flores in pedunculis solitariis. Pedunculi
e vaginis cum scapo duo, pollicares et ultra, patentes, flexuosi
filiformes viscosi. Corolla flava: petala majora obtusa. Stigma-
ta lutea: labium exterius minimum, interius bifidum; lacini &
lanceolati, acuti, longitudine petalorum minorum Thurb. t. c.

Trifolium 4 foliis lanceatis glabris, scapo ramofo hirsuto Thuab Fr. n. 39. V

p. 92.

4 n. *Trifolium* corollis imbricatis, caule ramofo hirsuto, foliis Congioni-
bus ensiformibus glabris Lin suppl. pag. 97.

Habitat ad Cap. s. p. e. i.

Scapus divisi- ensiformis, multiflorus, pithamou. Pami seu
pedunculi flexilosi, patentissimi hirsuti uniflori usque triflori
Folia alterna ensiformi lanceata, undulata, nervosa, apice depen-
dentia, scapo Congione. Laminae omnes triflorae seu trise in fasciculis
Stigmatibus labrum interius bifidum: laciniis lanceolatis, carina
inter coerulea Thuab.

non vidi

54

visiana ~~+~~ Frns ^{planis} foliis, caule viscoso Thunb. ^{ir.} Diss. n. 41. +

Frns visiana; corollis imbricatis, foliis linearibus planis, petalis patentibus
caule viscoso Lin. suppl. 90.

Habitat ad Cap. b. spei 24

Caulis pedalis, teretis, flexuoso ^{us} erectus, superne divinus, glaber, per
perascens, glutinosus. Folia pauca, basi longiora, erecta. Radicum
li alterni, flexuosi, uniflori, glutinosi. Petalorum majorum lami
na, unguiculares, ovata, obtusiuscula: minorum angustiores et
breviores. Stymatis ^{camipus} labium interius bifidum; laciniis lanceolatis
petalorum majorum duplo breviora brevioribus; exterioribus bifidum
duplo brevius. Thunb. l. c.

angusta 4 foliis filiformi-linearibus erectis glabris, sicapo glabro subuniifloro,
spathis obtusis. *Plant. fr. n. 20. t. 1. p. 91*

Habitat ad Cap. Inei
scapus teris, erectus, subsimplex, vaginatus, articulatus spithamari
vel paulo ultra. Foliis sicapum inferne convergentibus
acuminatum, striatum, glabrum, sicapo longius. Flores terminaliter
unicui vel duo, erecti, sensim florentes. Spatha exterior glabra
vixi apice rubro pollicari: interiores tenues pome alba
lamina ovata, obtusa pollicares intus flava extus purpureo
nervosa. menora lanceolata obtusa, flava extus fusio purpureo
striata. Stigmatum labium intenus bifidum: lacina oblonga
caetera exteriora producta. Capsula trigona, obtusa. Thunb

55⁴
polystachya ~~45~~ ² Iris foliis planis, caule glabro ramoso, spathis apice lacinis +
Iris polystachya; imberbis foliis linearibus planis, scapo glabro ra-
moso Thunb. ~~Bot.~~ ⁱⁿ n. 40.

Iris lacera. Habitat in Cap. b. Spei 4
imberbis, foliis ^{reptis, see retro} Caulis teres, superne divibus, articulatus, multiflorus. Folia apice
linearibus, scapo setacea attenuata Scapum equantia, erecta, apice setaceo-
ramoso multiflo attenuata, nervosa. Flores magni speciosi, coerulei. Spatha api-
ro, spathis lace ca setosa Thunb. t. c.
is lamantk.
dict. bot. 3. p.
illustr. 1. p. 125

minuta Iris foliis anisiformibus glabris, scapo unifloro, petalis oblongis ob-
tusis Thunb. Verb. n. 2. †

Iris minuta; corollis barbatis, foliis lanceolatis glabris, petiolis alternis
trifidis Lin. suppl. 98.

Habitat in monte Leuwistad ad Cap. b. p. p. 2.

Scapus simplex, foliis vaginatus, ^{palmaris} erectus, uniflorus. Folia cincta
quatuor, alternatim vaginantia, subsalcata-reflexa, integerrima
prope aequantia, superiora sensim breviora. Corolla lutea: petala
minora lanceolata Thunb. l. c.

~~Tris~~

Tris foliis glabris, caule ramoso hirsuto. Thunb. ^{is} Diss. n. 39. 4

Tris Tris; corollis imberbibus, caule ramoso hirsuto, foliis longiori
ensiformibus glabris Lin. Suppl. 47.

Habitat in Cap. b. spei 4

Caulis spithameus, erectiusculus, multiflorus: Rami seu pedun-
culi flexuosi, patentissimi, hirsuti, uniflori usque triflori. Folia gla-
bro longiora, ensiformi-linearia, apice dependentia, undulata, ner-
vea. Petalorum laminae omnes triste seu triste reflexantes.

Stigmatis labium interior bifidum; lacini lanceolata, carina
intus coerulea Thunb. l. c.

ciliata 4 foliis enjfer medus Ciliatis Thunb Fr. n. 1.

Fr. ciliata corollis barbatis, foliis lanceolatis undulatis ciliatis,
petalis alternis obovatis Lin. Suppl. pag. 90.

Habitat ad Cap. 6. p. 1

Scapi plures, plunni & vaginis foliorum reconditi unicus floren-
tibus vaginatis, simplex, compressus, debilis albus, glaber, erectus,
uniflorus palmari. Folia radicalia circiter sena, basi convoluta,
scapum ad summum alternatim vaginantis, acuminate
erecto-patentia vel recurva, nervosa, glabra, integra margine
ciliata, scapo subaequali, internodiis semper brevioribus
magisque convolutis. Corolla lutea, petala minora obovata
stigmatis labium exterius bifidum: laciniis setacea. Capsula tryo-
na, sulcata Thunb.

Papilionacea ~~56~~ *Fris hirta*, foliis reflexis villosis cauleque diviso villosis

Fris papilionacea; hirta, corollis imberbis, foliis revolutis lin.
 Suppl. 90. Faeg. collect. Suppl. 159. t. 3. f. 2.

Fris papilionacea imberbis, foliis linearibus reflexis hirtis Thunb.
Diagn. n: 37. t. 2.

Habitat ad Cap. b. Spei?

Superiora breviora

Bulbus magnitudine avis corylli, ovatus, tunicatus. Caulis
manis, ~~caulis~~ divisus, ut folia pilosus, subnascens. Folia lon-
gitudine cauli, semper unquam lata, convoluta, flexuosa, re-
curvata, # suprema spathiformia. Spatha bina, vaginantes
foliis similes, piloso. Pedunculi trigoni, ex eodem centro bina
tres vel quinque, incrassati, inaequales, sensim florentes,
glabi. Petala majora lamina ovatis, acutis; minorum ovato-
oblongis. Stigmatibus labium interius bifidum, laciniis oblon-
go Thunb. l. c.

exilis nervosa

Variet. corolla tota flava, genu circulo viridi: petalis et pistil-
lis intus rubris, genu macula flava, circulo fusco: petalis intus
virescentibus

majoribus totis flavis, genu circulo viridi, petalorum trium minorum lamina
pistillonumque labiis interioribus sanguineis Thunb

58.
Crispa 56

Fr. glabra, reflexis
foliis revolutis crispis

Fr. crispa; corollis imbricatis, foliis ensiformibus revolutis crispis,
pedalis patentibus. Lin. Suppl. 98

Fr. crispa; imbricatis foliis linearibus crispis Thurb. Diss. n. 36
t. 1.

Habitat ad Cap. b. p. 4

Caulis palmatis vel ultra, superne divisis, flexuosus. Folia
inferne in caule, ~~in~~ cae eoque equalia vel longiora, attenu-
ta. Flores terminales, alterni, inferiores pedunculati, peduncula
ti, tres vel quatuor. Spatha unguicularis, lanceolata, acuta,
striata. Petala alterna majora unguicularia, obtusa, alterna mino-
ra angustiora. Stigmatis labium luteum, exterius brevis binarius
interius bifidum; laciniis lanceolatis, acutis Thurb. l. c.
Variet corollis luteis, coeruleis, in carnatis Thurb.

vifiana 9 foliis linearibus planis, fiapo viscofo Thunb. 4. n. 41.

9ns vifiana corollis umbellatis, foliis linearibus planis, petalis patentibus, caule viscofo, Lin. Suppl. pag. 98.

Habitat in Cap. b. p. p.

Stipus teres, glaber, articulis latis, flexuosis, erectis, superne duplo
glutinosis purpureo pedalis. Pedunculi alterni, flexuosi
glutinosi, uniflori. Folia pauciora, alterna, erecta, fiapo longis
in lamina petalorum majorum ovata obtusiuscula unguicula
res: minora angustiora et breviora. Hypanthio calicem interius
bifidum, lacina lanceolata, lamina majorum duplo brevis
res: exteri bifidum, duplo brevius Thunb.

59 ~~58~~ 59 Iris foliis tetragonis
tuberosa

Iris tuberosa belgarum Lob. ic. 98. Bauh. hist. 2. p. 730

Iris tuberosa, foliis anguloso, flore obocuse viridi colore

Monn. hist. 2. p. 348. 8. 4. t. 5. f. 6. Tournef. Cor. 56

Iris tuberosa; corollis imberbibus, foliis tetragonis Lin. Syst. veg. 93

Habitat in Arabia, Oriente

Radix tubera duo tria, oblonga, fasciculata. Caulis pedalis, erectus, simplex, uniflorus, foliis saginatus. Folio
3 le po altiora, triata: Vagina longa. Spatha diphylla,
longitudine florum, lanceolata. Flores pedunculatus in
ter latera spatharum subprope dext. Petalorum lami
no fusco-violaceo, Germen oblongum globosum, utrin
que acutum *

Compressa 9 foliis ensiformibus globis, scapo paniculato compresso Thunb Fr.
n. 12.

9^{na} compressa corollis barbatis, foliis ensiformibus planis, caule
ramoso compresso Lin Suppl. pag. 90.

Habitat ad Rep. b. p. ei

Caulis frutescens compressus, glaber, dichotome ramosus, articulatus
fornatus, decumbens apice erectusculus; bracteatus pedalis. Rami
elongati uniflori. Bractea seu spatula in caule et ramis lanceola
ta, alterno, carina acuta, glabra apice membranacea, pollicis
res fusca femineo fornata, in internodiis breviori. Folia alterna
acuta nervosa glabra, caule breviora pedalia. Corolla alba
lamina obtusa. Stigmata albida coeruleo-purpurea. Labium exterius
crenulatur interius bifidum. Lacina lanceolata erecta.
Thunb.

— Zubiá.

Hipheon flore a luteo nigricante Plum. & per. 2. v. 260. t. 261. f. 1.

Frus martinicensis; corollis imbricatis, geminibus Ungonis, petalis basi folio-
lis glandulosis Jacq. Amer. t. 7. Cust. mag. 12. t. 416

Habitat in Caribis West. 7

Caulis bipedalis, simplex vel bifariam divisis, directus, teretiusculus,
diphyllus. ^{angustis vel paucis latis,} folia disticha, ~~rigida~~ ^{rigida} ~~scissata~~, erecta patentia. Petala tria me-
jora corolla flava Spatha diphylla: valvula lanceolata, acuta inaequalis.
biflora. Flores pedunculati, flavi. Petala tria majora obovata, acumine
brevis primo terminata, basi porcula nectarifera, extus inferne gibba; tria
minora, patentia oblonga, breviter acuminata.

minime species tria potius proprii generis

Folio linearibus
tripetala 26 Fr. folio scapo unifloro longiore, petalis alternis subulatis
Thunb. Des. n. 14.

Fr. tripetala; corollis barbatis, folio radicali unico lineari-
ensiformi ~~canadato~~ canaliculato, petalis alternis subulatis
Lin. & suppl. 97. Jacq. collect. 3. p. 272. F. 2. 7. 24
Habitat in Cap. l. spec. 2

Folium unicum, vaginans, canaliculatum scapo duplo longius, latum
dependens, canaliculatum, glabrum, nervosum. Scapus simplex,
pedalis, ~~cautus~~, subuniflorus, ~~ter~~, geniculatus, glaber: geniculatus
bracteis spathis similibus amplexata. Flores terminalis, solitarius.
Spatha bivalvis, pedunculum amplectens, inferior brevior, acuta,
glabra, unguiculari vel ultra. Corolla coerulea; lamina ovata,
acuta: petalorum microm linearis subulata. Germen sexsulcatum.
Stigmata linearia: labium exterius obtusum, interius lon-
gispinus, longitudine fere laminarum Thunb. l. c

tripetala Ino stappa unni flori folia brassica

#

~~interioribus~~ ~~exterioribus~~ ~~marginibus~~ ~~reflexis~~
Susiana. 1 Iris caule uniflora foliis longiore, laciniis corollae interioribus reflexis
reflexis minoribus

Iris chalcidonica variegata Label. ic. 67.

Iris susiana. Plus. part. 243.

Iris latifolia major Plus. hist. 1. p. 217.

Iris chalcidonica latifolia Best. hort. exst. vern. ord. 8. fol. 14

Iris susiana; corolla barbata, caule foliis longiore uniflora Lin.

Spec. pl. 55. Curt. mag. 3. t. 91.

Habitat in Oriente. Venit Constantinopoli in Belgium 1572² 74

caulis pedalis, simplex, uniflorus, teres, sulcatus. tota seminequam vel
parum ultra lata, sursum minora, erecta, tenuissime striata. Corolla

omnium congenarum maxima, albo subnigroque variegata: laciniis
exterioribus subrotundo, undulato, apice inflexo: interioribus deflexis mino-

res, deflexis deflexo, ovato, obtuso, margine saepe retroflexo, parum

dilutius coloratis, seymate laciniis interioribus obtusis bifidis: laciniis

ovato, crenatis. Capsula obsolete trigona, acuminata.*

involuta.

* Corollis barbatis
foliis ensiformibus

florentina 2 Frs ^{foliis altior} Caule ^{foliis altior} subifloro, floribus sessilibus

Frs sativa floribus nivali coloni Math

Frs florentina Best. hort. syst. vern. Ord. 9. fol. 4

Frs alba florentina Bauh. pin. 31. theatr. 577. pin. 31

Frs florentina; corollis barbatis, caule foliis altior subifloro,
floribus sessilibus Len. ^{Spec.} Prop. 55.

B. Frs nostras vulgans candidis floribus Loeb. ic. 59.

Frs alba germanica Bauh. pin. 31. theatr. 576

Habitat in Europa australiori, Carnioliis &

Caulis sesquipedalis, crassitie digiti minimi et ultra, teris, triatur.

Folia sesquipollicem fere lata, nervosa, ^{glaucescentia} Corolla alba, inter tinctura-

lari coerulea: laciniis anteriores dependentes, ap. obtusa, apice sub

dentato repanda, basi ciliis viridi venosis, ~~inferne plicata undulata.~~

interiores oblongae, ^{basi undulata plicata undulata} Stigmata corollae concolora, bifida; laciniis

acuto crenulato. Cappula unguis pollicaris, acuminata *

Flores et radix odorata odorati

Floris albae in aerea

germanica 3. Fris caule multifloro foliis altiore, floribus in ferionibus pedun-

#1 Spathis adulationi
bus coloratis

Culatis ~~Th. Lamour. dict. bot. 3. p. 294. Illustr. 1 p. 294~~ Lin. Spec. pl. 55

Pallidus Pal. n. 34
Yves. Cube. ed. alt. n. 538.

Fris germanica Suchs. 317.

Fris latifolia vulgaris coerulea Besh. bot. syst. veru. ord. 8. fol. 5.

Fris vulgaris violacea Bauh. hist. 2. p. 79709

Fris germanica; corollis barbatis, caule foliis longiore multiflo-
ro, in ferionibus, floribus inferioribus pedunculatis

Habitat in Germania, Helvetia, Italia Gallia & Italia inculta

caulis inferne trivisus, subpedalis, teres. Folia desquippolli

#3 Spathulata, lamina obtusa,
nec emarginata,

em lata, reflexo-falcata, nervosa. Spatha vides, super
ne margine apice membranacea. Corolla magna violacea per

purea: laciniis exteriores plana, obovata, interiores integerrima, dilu-
tius colorata, hae magnitudine fere exteriorum. Stigmata violacea;
laciniis serratis. Parum odora.*

Omnes est rorsum ino Varietas plures habet Classis in his
qualiter dentata.

caulis
caulis Math. & Bauh. Hist. super ped. l. ext. & y. ext.

Iris suseana Thunb. foliis ensiformibus glabris, scapo unifloro pedalis rotundatis Thunb

Fr. n. 4 S. V. p. 88

Iris catifolia major Clus. hist. 1. p. 217.

Iris suseana, flore maxima ex albo nigrescente Bauh.

Iris suseana non est. Theatr. 579. Monf. hist. 2. p. 351. f. 4. t. 6. fig. 6.

Iris suseana variegata Lob. ic. 67. corolla barbata, caule foliis longiore
unifloro Lin. Sp. pl. 554

Habitata in oriente. venit Constantinopoli in Belgium
1573

Iris suseana

Clus. rarr. n.

243

Scapus simplex, teres, sulcatus, uniflorus, pedalis. Folia alterna
vaginantia, erecta & nervis striata. Corolla omnium con
generum maxima albo-nigroque variegata. Lamina petalorum
majorum suborbiculata, undulata apice inflexo erecto.

Iris chalcidonica
catifolia

Basler. Lyst. var.
ord. 8 fol. 4

Petal. minorum ovata, deflexa, margine saepe retroflexo obtusa
stigmata labio interno obtusissimo. extenore bifido. lacina
ovata, crenulata. Capsula obsolete trigona, acumine longo
apice amplo, lineis tribus purpureis Thunb

in herb. non adest

pallida 4 Grisea foliis caula multiflora brevioribus, spathis albis floribus sessilibus, spathis albis

Grisea dilute caerulea, involucri albo Tabern. ic 647

Grisea hortensis, pallida caerulea Bauh. pin 31. Tournef. inst. v. h

Grisea pallida; corollis barbatis, caula foliis altiora multiflora, spathis albis Lamanth. Dict. bot. 3. p. 294. illustr. t. 12

B. Grisea hortensis, pallida caerulea, involucri albo, minor. Tournef.

Grisea odoratissi inst. v. h.

ma; barbata; foliis ensiformibus glabri, brevioribus

Habitat in Oriente & paulo altior quam in reliquis, tripedalis, Jaces. Folia sesqui pollicem lata. Flores sessiles, remoti, duo vel gemini ad quatuor supra multos. Petala magis que in singula spatha. Spatha lanceolata, antea ante quam flores nitidine omnibus squalibus. Corolla pallida caerulea: petala exteriora obcordata, extus inferne carina viridi, supra dilata caerulea, basi violaceo-fusca te venosa, integerrima, vix emarginata; barba alba, apice flava interiora convexa conniventia, superne margine ^{sub}dentata, spathulata, inferne integerrima, ungue albedo canaliculato, venis quae essentibus pida, coctemum majoribus condolorum. Stigmata colorum petalorum, margine dilutiora, bifida; laciniis serratis, acutis *

~~Petalca 4 folio filiformi lineari erecto glabro ^{hib} unifloro, spathe acuta membranacea
Cist. Thunb. Fr. n. 29. t. 1.~~

~~7 ni spathe corollis imbricatis, folio filiformi glabro, caule
simplici, spathe membranacea Lin. Suppl. pag. 99.~~

~~Habitat ad Cap. b. p. ei~~

~~Scapus filiformis simplex uniflorus raro diversus
triflorus, erectus palmari vel pithamou. Solum simplex
unicum, rarius duo, erectum, apice cernuum, scapo duplo
longius. Flores minute Coelestis Thunb~~

~~et pro odoratibus ferebat ut dicitur. It. 9.~~

orientalis 5. Fr. Caulis subbiflorus ~~articulatus~~ foliis longitudo foliorum, gemminibus tri-

gonis +
Kohi Subatta Raeaph. amoen. 5. p. 172

Fr. germanica Thunb. fl. jap. 33.

Fr. orientalis; imberbis, foliis lanceolatis, spatio subbifloro tereti articulato, gemminibus trigonis, corollis reticulatis Thunb. in act. Soc. Sci. Linn 2. p.

328.

Habitat in Japonia 4

Caulis pedalis et ultra, erectus, teres, articulatus, striatus: folia linearia, apice attenuata, nervosa, glabra. Spatha foliis consimiles, sensim breviores. Flores subterminales. Corolla fusco-reticulata Thunb. l. c.

~~Fr. japonica Thunb. fl. jap. 33.~~

Fr. orientalis

Dichotoma 4. foliis ensiformibus glabris, caule paniculato Veret. Thunb Fr.

n. 13. f. v. pag. 89

Fr. *Dichotoma* Pall. ed. 3. p. 714. tab. A. fig. 2.

Fr. *Dichotoma* involucrata Venustrone barbata, caule Veret. elongato
paniculato, ramis alternis divaricatis bif. quadrifloris

Lin. Suppl. p. 974

Habitat in rupibus apricis totius Dacerae 2

Caulis Veret. glaber ramosis. Rami simplices elongati, nudi, patentis
fimi, cincti triflori. Folia radicalia sex vel septem, alternan-
tia, amplexicaulia, disticha, breviter, caulina ad ramificationem
brevissima. Flores longe pedunculati, dilute purpureascentes,
omnium congenerum minimi Thunb.

6
Sambucina 7 Inis caule multifloro foliis altiore, pet. laciniis corolla ^{emarginatis} arcuatis
ribus planis inter omnibus emarginatis.

Inis major latifolia S. Clas. hist. 1. p. 219

Inis latifolia belgica odore Sambuci Bauh. theatr. 509

Inis latifolia, cui in flore crassa vena purpurea. Bauh. hist. 2. p. 717

Inis sambucina; corollis barbatis, caule foliis altiore multifloro,
petalis deflexis planis; erectis emarginatis Len. spec. pl. 55.

Tacq. hort. Virid. 1. p. 1. t. 2. Curt. mag. 6. + 107

Sensum minor

Caulis bipedalis, superne divipus. Folia apice inflexo falcato,
hirsuta. Spatha uniflora, bivalve; valvulis ovatis, margine

violaceis, apice membranaceis. Flores inferiores pedunculati.

Corolla laciniis exteriore oblongae, integerrime, ^{basin versus} vasis saturationibus

violaceis picta, cum interstitiis dilutionibus: interiores ^{basin versus} incurvato arcuato
vix denticulato, basi violaceo dilutione coerulea, basi violaceo-

obovatae

subrenoso. Stigmata ⁵ carina coerulea, latera albedo. Coenules centis,
Carina coerulea; laciniis acutis & ovatis *

7
lucida & In caule foliis altiore multifloro, petalis exterioribus revolutis, inte-
rioribus erecto inflexis subundulatis submarginatis Hort. kew. 1. p. 68. f
Habitat in Europa australi &

Petala exteriora retroflexa, atro-purpurea, infra medium lituro
flavicanthibus ornata; barba lactea: interiora obovato-oblon-
ga, exterioribus paulo breviora; lamina purpurascens, ungue
equalido lutescente. Stigmata squalida lutescentia, per
superne pallida purpurascens Hort. kew. l. c.
Una varietas Inca & bambucina? sed omnino inodora Hort. kew.

bituminosa 9. foliis linearibus spiralebus, scapo viscoso Thunb. Fr. n. 42. Tab. 2.

S. U. pag. 92.

Græci bituminosa collis imberibus; foliis ensiformibus spiralebus; petalis reflexis caule viscoso Lin. Sup. pl. p. 90.

Habitat ad Cap. b. præ-

Scapus articulatus, flexuosus-erectus, superne durus, glutinosus multiflorus, pedalis. Tolum unicum, linearis, apice attenuatum, spirale, striatum glabrum, scapo brevius. Spatha articulosa vaginantes, striata, glabra. Flores in pedunculis solitarii. Pedunculi e vaginis cum scapo duo, filiformes, flexuosi, patentes, viscosi pollicari et ultra. Corolla flava. Petala majora obtusa. Hymata lutea labrum externum minimum catenus bifidum. Lacinis lacinula to acuta longitudine petalorum. Thunb.