

Tatis

1. *Vindona* 4. foliis radicalibus crenatis, caulinis sagittatis, filiculis oblongis
glabris
2. *Caspitancia* 4. foliis radicalibus denticulatis, caulinis sagittatis, superioribus
integerrimis. Siliquis linearibus pilosis ^{integerrimis} raris
3. *Armena* 4. foliis cordatis postice obtusis, filiculis cordatis
4. *Egyptia* 4. foliis omnibus dentatis

una cum *Crambe* ² *Munias* ad filiculosas amandatur a *Fuscos*

G. hatis

G. hatis Dalmatica filiculi pubescentibus

Habitat in Dalmatia herb. Mus.

Folia radicalia oblonga, basi attenuata, villis raris adpressis, integerrima: cau-
lena lanceolato-facetata, glabra. Siliqua et involucra et villosa canescentia

Herb.

egyptea 4-folius omnibus dentatis L. S. V.

Habitat in Aegypto

non vidi

armena 4 foliis integerrimis cordatis postice obtusi, siliiculis cordatis hinc
R. V.

4 foliis armena, foliis Brasiliae perfoliata, fructu coddii
formi lanefcente Tournef. cor. 14. Buob. cent. 1. p. 3. 7. 4.

Habitat in Armenia praevis siccioribus ad rivulos.

Caulis glaber. Folia oblonga, cordata, integerrima, arena
crasiuscula, sesqui pollicaria. Siliicula pendula, semurqui
c ulares, subcordata, ovata, mucronata & stylo persistente, tamen
stolo-ucano herb. Guss.

Castanea 9. foliis radicalibus crenatis; caulinis sagittatis, pedunculis
subtomentosi Lin. Bot. pl. 436 +
9. foliis orientalis maxima concipiens Tournef. cor. 124. Buett
cent. 1. p. 4. 7. 5.

Habitat in Hispania et oriente O

Caulis erectus, pedalis, teris, glaberrimus. Folia caulina lanceola
sagittata, inferiora obscure dentata, superiora integerrima
subavenia. Racemi elongati. Triclii penduli sub pollicari
extrosi, sum dilatae et pilis ^{havis} conopis reversis incanis, pedunculi
ex sulca glaberrima

~~Folia radicalibus ^{subcrenatis} denticulatis sub
caulis caulinis sagittatis ^{superioribus} integerrimis inferioribus
obscure denticulatis, filiculis linearibus incanis~~

Caulis erectus, angulatus, simplex, striatus glaber. Folia lanceolata
sagittata, obtusa villosa, canescentia, subvenosa, acutiora et
pinnis attenuata, integerrima pollicari. Rami floriferi
superiora et interiora. Filiculae ut in 9. huiusmodi. Ulopa.
9. foliis alexandria Scop. Del. fl. Inf. vix differat herb. mus.

Linctoria L. foliis radicalibus crenatis; caulinis sagittatis, filiculis oblongis

Lin. I. V

Q. sativa sylvestris Duch. hist. 330.

Q. sativa sylvestris f. *angustifolia* Bauh. pin. 113.

15. *Q. sativa sativa* f. *latifolia* Bauh. pin. 113.

Habitat ad littora maris balthici et oceanici Europa
Caulis ^{erectus} ~~erectus~~ bipedalis et ultra superne ramosis ~~terre~~ glaber,
et laxis a basi ^{contiguis} foliorum decurrentibus subangulatus glaucis viridis
Folia radicalia oblonga basi attenuata ~~geminata~~ ^{geminata}, caulina
integerrima obsolete venosa. flores paniculato corymbosa

glabris

canescens Gfati

Gfati orientalis fructu ovato canescente Tournef. Cor.

Habitat in oriente hab. Musf.

Caulis pedalis, superne more congerie nunc in ramis floriferis diversis; angulatus, villosus. Folia gemiamplexicaulia, suscipi pollicaria, lanicolata, obtusissima, integerrima, villosa, arenaria, superiora acutiora, attenuata. Racemi erecti - sili-
culo pendulo, oblongo, semiunguiculari, villosa, canescentes, obtusissima