

Ischaemum

$\frac{3}{2}$

1. muticum 9. ^{floribus} seminibus muticis, seminibus muticis
2. aristatum 9. ^{antheris} floribus aristatis
3. murinum 7. fructu hirsutissimo, calyce feminibusque aristatis, foliis ultimis fruticosis
4. ciliare 4. rachide piloso, flore utroque aristato tortili, valvulis calycinis apice striatis, foliis lanceolatis
5. rugosum 4. seminibus aristato tortili, valvulis calycinis exterioribus floribus sessilibus basi transversim undulato rugoso.

Calladoa ^{ulenta} Cavan 4o. s. p. 37. tab 4 (60) species 45 Ischaemum
26 Tab. 45 2

Fasciculatum Goehomium spicis fasciculatis, floribus hermaphroditis perian-
thisque ^{mutatis} ~~mutatis~~, calycibus basi plicatis

Habitat in Andia orientali ^{apice bifido}

Rubri teretes, glabri. Folia palmata, attenuata, plana, acuta, glabra.

Spicae tres ex apice singulis diversis ulmi, palmatae. Rachi flexuosa,

floribus conferti. Flores hermaphroditus perianthii: valvula lanceolata, ac-

uta, nitida, apice membranacea, basi plicis 2-3 ^{plura} plicata extrema media

tatem non attingentes: masculus pedunculatus, valvulis carinatis ter-
ribus.

herb. Hort.

Littorale *Sphomum*

Habitat in Zeylona Herb Royeni Honij ad Littora maris

Castmi repentes, ramofi, ansto nullo

Impatiens Aphanium panicula coarctata corollis 1 valvibus Lour. fl. cochina.
neg. 646.

Habitat in Cochinchina. 4

Culmus 3 pedalis erectus. folia subulata brevia alterna. Panicula termi-
nalis. flores ovati glabri mutui; parvi. Palyx 2 valvis bifloris

fasciculatum *Thonum*

Habitat in Abyssinia herb. Thonum

Caemi plures filiformes, glabri. Folia graminea, glabra, margine scabra
Spica terminalis 2-3, tripollicares, villosa. Flosculi lanceolati, sessile, ^{ante}
infra apicem valvulae extensoris corollae, totalis, flosculo duplo longior: pedicel
lati, ^{multis}, valvula extensor corollae calyce longior brevior apice
bifida.
confer cum *Schima* vel *Tekmeda* Forst.

erubesc. f. h. foliis lanceolatis, floribus nudis, calycis sessilibus valvula exterior
breviter lobata, corollae anthera tortili elongata Petr. off. 6. p. 35.

Phoemum anfratum

glabrum. *Q. prinis* var. *glabris nitidis*, floribus sub sessilibus magnis
Walt. fl. Carol. pag. 249
Habitat in Carolina

an Rottbolla?

non vidu

Gianofum G. - *Spicis filiformibus, floribus acuminatis exsertatis*
Lambert Walt. fl. car. pag. 249
Habitata Carolina

non vidi

barbatum Gsch. foliis lanceolatis, calycibus trifloris basi barbati marginibus
ciliatis: sepalis margine utrinque binodulosa, anthera tota geniculata
Nide. Obs. 6. p. 35 +
Habitat in Java.

Secundatum & praesens subsecundis, flombus receptaculo in nodulatis Walt
fl. Carol. pag. 249
Habitat in Carolina

sa Panicum densatum
non vid.

involutum 4. spica fecunda multica quadriflora : involuta recepta
culo foliaceo concavo ~~fort~~ fl. hyst. pag 77

non vidi

muticum 9. Seminebus mutis Lin. Spec. pl. pag. 14074
Tagad. Pheed. Mal. 12. pag. 91. 8. 49.

Habitat in India

Spica bipartita imbricata pedunculis alternis simplicibus
bifloris, angulatis culmo adpressis. Flos alter spagulum pedun-
culum terminat, hermaphroditus ex calyce biglumi unifloro
alter vero s. inferior. Flos androgynus, basi exteriori uncinis
pedunculo sessili insertis, ex calyce bivalvi, duriusculo,
longitudine florum flosculorum, continens flosculos duos;
alterum masculinum album foemineum. Pappellorum stigmata
crassa barbata. Semina mutia, siccis pedunculis spica
foliis vestitis Lin

— *Aschom. muticum* foliis lanceolatis, floribus mutis Retz. bot.
p. 6 pag. 34. *

~~non vidi~~

anistatum 4. Semenibus anistatis Lin. Spec. pl. pag. 14074

Habitat in India

Structura specis et florum omnia eadem cum *I. mūtiso*, at
culmus altior, specia longior, Pedunculus specis nudus. Semen
anista intorta, foliulis longiore armata Lin.

muninum *Ispomum* specis herpetiformis, calycis feminebus que anistatis,
foliis ultimo spatulatis

Ispomum muninum specia bipartita: calycis feminebus que anista
bis. *Forst. in Nov. Act. Lipp. 3. p. 105. prodr. n. 304.*

Habitat in Insula Tanna.

Caules teretes glabri, ramosi felleiformes. Folia angusta grammea
bi- / tri-pollicaria basi petiole aliquot ad marginem. Ligula petiolica
petala folium altum latius brevius specia involvens.
Specia gemina pollicaria longitudine spatula. Calycis valvula
canaliculata striata.

ciliare 4: foliis lanceolatis pilosis, rachide pilosa; flore utroque foemineo
antra tortili valvula calycis apice striata

4 *Phomum ciliare*, foliis lanceolatis, calycibus bifloris, pedicellis ciliatis
flore utroque foemineo antra torti geniculata Retz. obf. 6. pag. 36
Habitat in India orientali et China.

Culmi repente inferne compressi, striati ramosi; geniculis pilosis
Folia sequipolliciana striata utroque pilosa, vaginis striatis marginibus

et prosteris superne pilosis. Spicae terminales geminae sequipollicinae

Calycis bini. Alter sessilis in rachide flexuosus alter lateralis pedunculatus

Rachis utriusque ^{biflori} ~~sessilis~~ ^{biflori} ~~sessilis~~ alter masculinus multicus alter foemineus antra
celli pilosissimi

lobis. Flosculi ovati acuti pallidi. Calycis valvula exterior basi
lavi superne ^{nupernum} ~~interius~~ ^{colorato} longitudinaliter striata bifida.

Antra longo geniculata

negosum G. Sch. seminibus anisato tothili. Valvulae calycis extenombus floris septi
basi transversim undulato rugos

Habitat in India orientali.

Calami filiformes glabri. Folioa pollyonaria. Spica bipartita bipoli
cani rachis paltero latere plana pro excipiendo ^{glabra} floscula septi. Stems
cannat aciliata. Valvula calycis floris septi oblonga obtusa
apice membranacea basi lineis elevatis 5-6. undulatis confertis