

Astoria

Foertia

Foertia coccinea, foliis lanceolato-ellipticis subtus villosis incanis
acuminatis utrinque acutis, pedunculis racemosis bifidis
Quettarda coccinea, foliis amplissimo, ovato, acuto; florum
racemis erectis, terminalibus; fructu coccineo Aubl.
flor. Guianens. 1. pag. 317. Tab. 123.

Foertia Lin. Gener. Ed. Schreb. pag. 234.

Habitat in Guiana von Rohr &

Rami striati, recti, superne obtuse tetragoni, striati, sordide
cinereis subtomentosi.

Folia petiolata, opposita, patentia, semipedalia, pollicis qua-
tuor vel quinque lata, in acumine pollicari attenuata, ~~in~~
basi apiceque acuta, integerrima, ^{supra} ~~remota~~ obliqua tenuis-
sime nervosa, inter nervos simpliciter ~~ob-~~ obscure venosa,
glabra subnitida; subtus ~~villata~~ pilis stellatis villosis tomento-
so, incana, mollia, nervis erectis tantibus.

Petiol. sesquipollicares, subtus convexi, supra canaliculati,
cinerei

seite

Stipula utrinque inter petiolos, membranacea, lanceolata, bipartita, ferru-
ginea, substriata, glabra, excepto basi in costa, fere pollicaris.

Bracchium terminalis, erectus. Pedunculus communis tetragonus: partiales
compresso tetragoni, pollicares, oppositi infimi interdum terni; infe-
riores bis dichotomi; superiores ^{distanti} semel cum flora sessili in dichoto-
miis; pedicelli triflori, unguiculares, uti pedunculi cinerei. Et lors in
stipula dichotomia sessili, uti intermediis terminalium ^{sessilibus} laterales
pedicellati. Bractea utrinque ad basin pedunculorum et pedi-
cellorum, lanceolata.

Calyx superus, villosus-tomentosus: laciniis quatuor, ovatis, acutis, intus gla-
bris.

Corolla fere bipollicaris, color flavo-creti-cinereus tomentosus ^{sa}. Limbus peli lon-
gus, densis hirtus. Tubus intus glaber.

Stamina filamenta ~~sex~~ sex ⁱⁿ faucibus tubi, bracchia brevissima. anthera
erecta, lineares compresso triquetra, apice multicordata limbo parum
breviores.

Pistillum germen inferum, oblongum. Stylus filiformis longitudine corollae. Stigma
oblongum, compresso tetragonum, indivisum

Gerardia parviflora, foliis oblongis, inferioribus basi subcordatis, thyrsis ovato.

Habitat in Insula Trinitatis Ryan

Rami tetragoni, crassitie fere pennis cygnis, striati, a pilis copiosis semis
brevissemis que ^{cinereascentes} ~~cinereascentes~~ ~~canescentes~~: ramuli cinerei, basi tubulo
unguiculari quadrifido vaginati, oppositi.

Folia petiolata, opposita, semipedalia, palmam lata, oblonga, inferne
versus partem angustata, inferiora basi sinu subcordata, auriculis
rotundatis, duo supreme basi obtusa: Venella utrinque acuta, omnia
acuminata, acuta, firma, planisque utrinque glabra extepto costa
et nervi subtus, interdum subvillosa, venosa, palpra nitida, se-
cundum nervos transversim remota lineata, subtus pallide vi-
ridici, nervi costata; costis subpurpureascentibus.

Petiolus teretiusculus, sesqui pollicari. Stipula utrinque, biparti-
ta: laciniis lanceolatis, attenuatis, pollicari, erectis.

Thyrsis terminali, ovata, spithamou. Radunculus communis
strictus, rigidus, angulatus, villosus-subtomentosus. Radun-
culi partiales inferne soepe ~~rectis~~ ^{rectis} quaternis verticillatis,
vultu

inferi remotiores, duo inferiores interdum oppositi, superiores alterni sparsi, ap-
proximati, dichotome quinquefidii, villosi, superne compressiusculi: rami
compressi glabri & sculi, compressiusculi, altero latere convexiores, altero pla-
niores sulcatis & aliculis. Flor. dichotomia 3es belii, solitarius: terminales
terni. Bractea utrinque sub singula ramificatione et ad basin calycis,
ovata, acuminata, glabra, ferruginea, rigida.

Calyx margo superior, persistens, brevis, quadridentatus: dentibus duobus
parum majoribus.

Corolla monopetalala, hypocrateriformis, unguicularis, extus glabra. Limbus
sexfidus: laciniis linearibus obtusis. ^{hirsutis, apicibus natis} Tubus interne hirsutus si minus.

Stamina. Filamenta sex, in medio tubi, brevissima. Anthera lineares
longitudine tubi.

Pistillum. Germe inferum, obconicum, supra glandula glabra convexa
coronata. Stylus filiformis, glaber, longitudine tubi corollae.
Stigma crassum, altero latere planum subconcavum, altero
convexum cum linea acuta elevata longitudinali.

[Pl. Fl. pag. 29.]

Pomum majore aequitate pisi, globosum, calycis et glandulae germinis coronatum,
quinque vel sex loculari: loculis externis convexis, longitudinaliter torsis
anti adnatis.

(Genus quettando affinis.)

~~arborea pectus~~

umbellata *Morgravia* foliis ovato-^{oblongis} lanceolatis ~~per~~ ^{per} terminatis venos

~~Morgravia~~ umbellata Lin.

Sw.

Habitat in Montserrat Ryan 5