

Asopynum

1. f. manoides 4. Sepalis subulatis, petalis acutis
2. Thalictrides 4. Sepalis ovatis, petalis obtusis
3. aquilegoides 4. Sepalis obsoletis

1. fumarioides 4 stipulis subulatis, petalis acutis L.V.

Helleborus fumarioides foliis Amm. ruth. 74. 7. 12

Habitat in nemoribus Sabinae O

Confer. Pluk. almalt. 3. tab. 360. fig. 3.

responsum foliis

Caules scilicet, erecti, palmati, glabri, vixentes, superne

tenuissime striati. Folia radicalia plurima, longe petiolo

seu internata. foliola semunquiculata cuneiformia

subincisa ~~et~~ apice. Folia caulina paucissima nisi vesp-

apicem supposita et subflora. Structura radice tenui

Pedunculi axillares primum breves demum folio lon-

giori uniflori



*Thalictroides* 4 stipulis ovatis, petalis obtusis L.V.

Tab. 105.

Falgu.

*Præpunciulus nemorosus*, *Thalictri folio* Bauh. pin. 170. Monf. hist  
2. p. 437. f. 4. v. 20. fig. 12.

*Præpunciulus præcox* 11. *Thalictri folio* Bluff. hist. 1. pag. 233.

*Thalicttrum brachioides*, flore albo, *Italicum* Boiss. mus. 94. v. 29  
fig. 1. \*

Habitat in alpi bus Italicis, gratianopoli, inque agro viennensi, Car  
nesio locis umbrosis, vernalis.

Planta palmaris caule <sup>glabra</sup> striato felleiformi simplicis folia  
duo vel tria in caule inferius vibernatum folio  
oblongo apice subtrifido. Supremum vibernatum supra  
merum tripartitum lobis undatis. Peduncululi axillares  
solitarii, uniflori folio longior.

3, aquileoides. *A. stipulis obsoletis* Cn. l. v

*Aquilegia montana*, flore parvo, thalictri foliis Bauh. pinodr. 75. pin. 144. h. v.

3. p. 404.

Habitat in alpebus helveticis, Tridentinis, Apeninici

~~Caulis filiformis erecti palmatis glabri teretibus superne  
venosissima striatis. Folia plurima ad radicalia petiolat~~