

9va

integrefolia Fr.

Habitat in America boreali herb. Ventenat

Caulis herbaceus, pilosus, scaber. Folia pollicaris, lanceolata, acuta, basi den-
te utroque hastato, saepe dente uno alterove in medio remotissimo, sca-
bra, subpilosa. Racemus terminalis, cylindricus, densus, sesquipollicaris. Brac-
tea lanceolata, longitudine florum.

alias *monophylla* De Sa

imbricata A. foliis lanceolatis integris, calycis imbricato-tubuloso, flosculis foemi
nibus Wied. fl. Car. pag. 232.
Habitat in Carolina.

Carolina Trojer dedit la Martini an hinc vel ad sequentem
non vid.

monophyllo f. foliis infernis bipinnatifidis, calyce monophyllo, glomeratis
foemineis apetalis Walt. fl. Car. pag. 232.
Habitat in Carolina

non vidi

annua tra foliis lanceolato-ovatis, caule herbaceo Lin Am acid. 3. p. 25

Tanacetum foliis cordatis serratis trinerviis Rayn. Hort. Lugd. 530

Habitat in America meridionali (C. herb. Mus.)

Caules herbacei, bulbosus, angulatus, pilosus. Folia remota, petio-
lata, saepe pithamoua opposita, ovata, attenuata, acuta, trinervata
utroque punctata, supra asenia subtus pallidiora, pilosa, grosse
serrata. Pedunculi axillares et terminalis. Flores nudae in ra-
cemo simpliciter folioso

frutescens Tra foliis lanceolatis, caule fruticoso Amer. ai ad. 3. p. 25

Elichryso affinis peruviana frutescens Pluk. alm. 12. tab. 27. fig. 1.

Pseudo helichrysum frutescens peruvianum, foliis longis serratis Morf
hist. 3. p. 90

Habitat in Virginia, Penn &

Rami teretes villosuli folia petiolata alterna caulina elliptica

Innervia serrata aculeo armata e stygi minuti albedo punctata persequi
polliciana, floralia lanceolata flori in ~~supremis axill~~

Flores racemosi solitarii in ~~supremis~~ axilla folii floralis natis

caulini elliptici floralibus lanceolatis integerrimis