

97 *Ixia*. Spatha 1-2-valvis. Cor. ^{6-na Actus} (regularis, tubae rectae patens; tubo recto

Sanguis.

Ixia

Ixia indicata Jacquin. cum satavica
Thunb. a Wild. conjuncta diversa
videtur

Ixia cartilaginea Lamour. glab. 8, per
et glabularis

Ixia antholyrae formis
videtur potius moraea praesens
vel generis affinis

7^{ta} Bulbocodium Curt. mag. p. 1. 268. t. 10.

7^{ta} Bulbocodium; caulis uniflorus, foliis linearibus canaliculatis conniventibus floris bulbicatis patentissimis Farqu. collect. 3. p. 265. 4^{ta} var. 2. 1. 271.

4^{ta} Bulbocodium Curtis mag. p. 1. 265.

Habitat in arenosis maritimis maris mediterranei. 4

Bulbus interdum magnitudine nucis terebinthinae, interdum minor, glaber, laevis.

Solui tria-quinque, saepe spithameo, unicum reliquis longius; latum angustis & imo, bulbis utrinque ad costam, vane flexa; omnia cum

& caelo vagina inclusa. Scapus superne lateribus convexus, marginibus

oppositis acutiusculis, pauciflorus. Flores sensim florentes, unicus

tantum exsertus, reliqui inter spatham reconditi. ~~Stigma bifidum~~ ^{interdum}

Styli triplici B. gaudet Scapo saepe digitali, et spathae lanceolatae univariatae longi

tudine totius floris. Corolla plerumque scapo longior. Omnes

varietates quoad colorem variant.

in

Bulbocodium 4. Frax foliis filiformibus sulcatis flexuosis, scapo ramoso, ramis unifloris,
ni, spatulis tubo corollae longioribus.

Frax Bulbocodium; scapo uniflora bravis gemis, foliis angulata
tis caulinis, stigmatibus septuplicibus Lin. Syst. veg. D. Minor.

76. Mant. 320.

parviflora a Crocus vernalis minor Clus. hsp. 260.

Crocus vernalis angustifolius 2. Clus. hist. 1. p. 207. quoad figuram.

Crocus vernalis angustifolius 3. Clus. hist. 1. p. 208. quoad descriptionem.

Lizyrrhynchium Theophrasti Colum. ceph. 327

media β. Crocus vernalis minor 1. Clus. hsp. 259

Crocus vernalis angustifolius 1. Clus. hist. 1. p. 2.

γ Crocus vernalis angustifolius, variegata flora Clus. hist. 1. p. 208

grandiflora Lizyrrhynchium alterum angustifolium Colum. ceph. 2. p. 5. t. 7.

4. 1.

Lizyrrhynchium majus angustifolium, radice contracta, flora
majore variegata Moris hist. 2. p. 345. part. 4. t. 5. f. 1.

Bulbocodium crocifolium, flora magna albo, fundus
luteo Tournef. Cor. 50.

Promulea maritima

conymbosa 4. foliis lanceolatis crispis, scapo anicipiti Thurb. Fr. n. 10.

Caryophyllus monomotus pensilvanicus, nervosus triplex foliis, intus cavis,
flores conules, cauliculis secundum longitudinem alatis Plukenet
Alm. p. 177. Tab. 275. Fig.

Loca conymbosa floribus conymbosi pedunculatis, caule anicipiti
Linn. Am. acad. 4. p. 300 & Spec. plant. p. 51.

Habitat ad Cap. b. spei

Bulbus ovalis truncatus reticulatus. Folium radicale unicum
est filiforme, striatum nervosum recurvatum glabrum, scapo brevius
cauliculis 1. 2. basi panum vaginans striatum. Scapus inferne
simplex superne tubramosus, e membranis angustis utraque deorsum
ventibus anicipiti membranis intermedium subnervis, striatus flexuosus
fere glaber, prothamou erectus. Rami alterni distichomi,
compressi fastigati. Flores in singulis pedunculis 1. 2.
alternis alter saepe inferior simpliciter striato ovato brevis
apice rotundato rebicundo. Corolla tubus semper amplius
prothamou panum longior. limbi lacini lanceolati varietate
albi et coerulei

— scapo anicipiti folium radicale filiforme cauliculis lanceolatis
floribus conymbosi

Ochroleuca 3 Potia foliis linearibus unico longissimo reflexo subsulcato, scapo unifloro
4x4 ochroleuca; scapo unifloro, foliis linearibus ~~linearibus~~ subulato-
con ni ventibus prostratis longis & unis subgeminis Faiqu collect. 4. p. 100.
4c. var. 2. 7. 272.

Habitat in Cap. b. 3 pi. 7

Bulbus ca. p. n. duplo major, ovata, fusca, nitida. Folia tria - quatuor
cum totidem scapi vagina membranacea involuti, ^{interdum duo} angustissima
sa, bisulcata, duotria erecta, altitudine scapi, unicium, duplo
vel triplo longior. Scapi superne subcompressi. Spatha tubo
corollae longior: valvulae unguiculares, aequales, lanceolatae, con
curvae, striatae; interior margine membranacea. Corolla
subcampanulata.

Janat Corollis albis; laciniis tribus exterioribus extus virenti-
bus ~~reocollis flavis exteriori laciniis exterioribus extus viren-~~
tibus 4x4 bulbocodium varietas 4. ^{to} Thunb. ~~Corollis flavis; laciniis~~
tribus exterioribus extus viridibus, 4x4 bulbocodium varietas 1.
Corollis cyaneis; laciniis exterioribus extus virentibus.

9 tribus interioribus flavis

interdum parum
latiora, rigida

bergii:

humilis 4 in scapo ramoso, floribus secundis, foliis plicatis erectis Thunb. Doj. p. 84
S. V. pag. 84

Habitat in Cap. bono spei collibus 4

Scapus inferum simplex, filiformis, erectus, palmatis vel pectinatis. Folio 2-3 linearia
^{angust. spina}
glabra, scapo longiora. Dentes racemosi 3 ad 8 in rectitudine flexuosa. Spatha
virides truncata oblongo-ovata margine membranacea tubo vel perianthio brevior.
varia corolla lutea, albedo reflexa fimbriata, scapo indiviso pauciflora
-scapo ramoso multiflora Thunb. l. c.

rosea 2. Ixia foliis filiformibus, scapo unifloris corolla campanulata brevioribus
Bulbocodium pedunculatis nudis unifloris, foliis subulatis linearibus lon-
gioribus Mill. ic. 160. t. 240.

Croci capensis floribus violaceis Burm. prodr. 2.

Ixia rosea; scapo unifloro brevissimo aphylo Lin. Syst. veg. 2. Muur.

^{75.}
Ixia bulbocodium; flore amplo violaceo Lamark. Det. bot. 3. p. 335.

Ixia bulbocodium corollis roseis fundo luteo Thunb. ix n. 3. var. 7.

Ixia campanulata; scapo brevissimo paucifloro, corollis amplis
campanulatis scapo longioribus filiformibus striatis Lamark
illustr. 1. p. 109.

Habitat in Cap. b. spei 2

Valde affinis Ix. bulbocodis, an modo varietas? differre videtur foliis
angustioribus. Culta scapus parum longior evadit.

pyramidata *Astr.*

~~Habitat in insula Francia Commerf. herb. Thauri 4
Caulis apice divise in ramos 4-5, frithamos, simplicis. Folia eniformia
imbricata, caule fere longiora. Spatha lanceolata, conduplicata. Pedunculi
solitarii, uniflori~~

habes

minuta 1. Ixia * Scapo, vel caulis foliis breviora.
scapo unifloro, foliis linearibus & caecis subaequantibus, & capitulo unifloro
Ixia minuta; scapo unifloro Lin. suppl. 92.

Planta vix pollicari

Ixia minuta; scapo unifloro, foliis laevibus Thunb. bot. hist. n. 2. t. 1.

Habitat in Cap. b. spei Vitis arenosis inundatis. 7

Planta vix pollicari. Bulbus globosus, vix magnitudine pisi, retin-
latus. Solivagina inclusa, angustissima, subtus convexa, supra con-
cava, erecta, unicum pro singulo scapo, uti tota planta glabrum. Scapi
plenumque duo ad quinque, capillares, erecti teretes. Spatha
vix, vel vix linearibus, angustissimis, acutis. Corollae tubus corollae

Corollae

tubus albus, & tris purpureis. Limbi laciniis supra concavae
niveae subtus albae, & tris duplici purpureae, longitudine tubi,
lineam dimidiam longae. Capsula virescens, & tris purpureis Thunb
b. c.

Fxia fistulosa; foliis linearibus, fistulosis, floribus secundis nocte fragrantibus;
bulbus campanulatus, margine cincto-fibroso. Andr. reper. t. 59.
Habitat in Cap. b. Speir.

~~Mucronatus gl. folus~~

~~Habitat~~

herb. la Martini

~~folus angustis lanceolatis plicatis~~

Axia reflexa; floribus speciosi, reflexi; floribus ensiformibus, glabri Andr. rep. t. 14.
Habitat in Cap. b. speci

L. 110

9x1a foliis ensiformibus & capum polytachyum flexuosum subaequan-
tibus, spathae membranaceae dentatae. Longitudine tubi

Habitat in Cap. b. Spei

Offinis videtur 9x. pe. ereda, et folia duplo latiora, altiora, absque margine
cartilagineo: tubus corollae & spathae non longior

Bulbus globosus, reticulatus. Folia juncu pedalia, striata, acuta. Pedun-
culus laterales uniflori, terminalis quadriflorus. Spathae semiungui-
culares, apice fusco-purpureae, striatae; valvula altera vix dentata,
altera bidentata. Corolla semi-pollicaris.

Est varietas esculae striatae flore flavo conferenda

elongata 5 Arxia foliis filiformibus recurvis, scapo unifloro, Spatha ardis
corollae tubo brevioribus

Habitat in laticibus arenosis Sardiniae 4

Similis praecedenti, an modo varietas ^{longitudine} differat videtur Spatha pallida
nibus et utraque praesertim vero tubo corollae unguiculis ² spatha longiora

Bulbocodium ^{fili formibus pulcatis}
Folia foliis linearibus flexuosis, scapo ramoso ramis unifloris,
spathis tubo corollae longioribus
Folia *Bulbocodium* scapo uniflora brevisimo, foliis angulatis can-
linis, stigmatibus sextuplicibus Len. Syst. Veg. Ed. Mus. 76. Mart.
320.

pariflora a *Crocus vernus minor* 3. Clus. hisp. 260. Hist. 1. p. 200 quod ~~est~~
descriptionem *Crocus vernus angustifolius* 2. ~~et~~ hist. 1. p. 207.
^{Thymocodium}
media *Syrinchium* ^{Thymocodium} Plum. ephr. 327
grandiflora β. *Crocus vernus minor* 1. Clus. hisp. 259 ~~est angustifolius~~ Clus.
hist. 1. p. 207
c

Enciata (Gxia foliis linearibus basi attenuatis quadrinerviatis, stapo uni floro
Wed. 8. p. pl. 1. p. 197. +

Gxia Enciata, foliis Clavato-pubulatis quadrinerviatis, stapo uni-
floro ^{16.} Fairqu. suppl. 4. var. 2. 7. 290.

Habitat in Cap. 6. 8. p. 4

Bulbus obovatus, tunicatus magnitudine avellanae. Colia duo longiora reliquis
longiora, utrinque attenuata, una cum stapi vagina inclusa. Stapi duo vel
tres uncialis. Spatha bivalvis semiuncialis, viridis: valvulae lato-lanceo-
latae, acutae, concavae, striatae, aequales, longitudine tubi. Corollae

intus rubrae, basi flavo et coeruleis
leis striatae; unguibus erectis, floris, longitudine spatulae Fairqu. l. c.

tres interiores
extus coeruleis
cum striis pida
rationibus, exte
riores extus flava
violaceo striatae.

Canea *Itia* foliis cuneiformibus, floribus secundis, scapo simplici flexuoso Thunb. Desf.
pag. 10* S. V. pag. 05

Habitat in Cap. bona spei 7

Bulbus radientis foliorum dense involutus, avellana major. Folia 3-4. marginibus
Et nervo medio crassioribus, marginibus revolutis, tenuissime striata, glabra, erecta
Digitalia. Folia 1-2. spatuliformia in sepe. Scapus teres hinc et inde compressus
Fus; erectus, glaber, foliis duplo longior. Elater circiter 6. albo purpurascens.
Spitho cinerea, apice femineo, obtuso, integro Thunb. Desf. l. c.

Si mea Thunbergii scapus inferne in duos caules et caulis parum
supra radicem in ramis 2. duos caulis formibus diversis

Quadrangula 7. Fraxia foliis canaliculato-quadrangulis, scapo paucifloro, cord
larum tubus brevis pimus +

Fraxia quadrangula; bulbo squamato squamis exterioribus
maximis, caule simplicis pimo foliis canaliculato. quadran
gulis brevioribus De la Roche des. n. 2.

Habitat in Cap. l. spei 7

Bulbi quadruplo ordine squamarum; squamae margine lacini-
rae. Folia paucis, stricta. Scapus simplicis pimus. Flores
caste spicati, caerulei. Corolla in fundibuliformis: tubus
est longitudinis tertiae partis spatulae: limbi lacinae ovatae

Thunbergio conjungitur cum Frax. bulboidea, et differre
videtur bulbo squamis imbricato, nec tunicato. Affinior est
Frax. niata et ab illa quoque bulbo diversa.

De la Roche l. c.

quoad folia

Caroliniana. P. foliis ovato lanceolatis, caule ramis repente
lobis basi oppositifolius Walt. fl. car. pag 60
Habitat in Carolina

non vidi

fragrans D Arxia foliis linearibus, ^{rectinatis} scapo subcompresso subbifloro, spathis membranaceis aristatis tubum aequantibus +

Arxia fragrans; scapo subbifloro, foliis sublinearibus rectinatis, scapo unifloro Gaerth. Suppl. 9. 92. var. 2. t. 290

Habitat in Cap. b. Spei 2

interior scapum per totum ^{superantia}

Bulbus pusillus. Folia inferiora longiora pedalia, graminea, acuta, an-

gusta, ⁱⁿ tenuissime striata. Scapus semipedalis erectus. Flores

plenumque gemini, inferior sessilis, suaveolentissimi. Spatha

cariosa, alba, purpureo-striata; valvulae latae, Corolla tota

tutca: limbi lacinae subtriplo longiores, oblongae obtusae, pater-

nis & imae, subaequales. Capsula subrotundo-ovata Gaerth. l. c.

An hoc pertinet Arxia sublutea, foliis concoloratis & staccis scapo uni-
floro longifloro longioribus, spatha longitudine sub Lamont
Dec. bot. 3. p. 33. illustr. 1. p. 109?

foliis brevior

~~folia scapo breviora~~

an varietas bulbifera

aulica 9thia floribus racemosis, bracteis integris, foliis ensiformibus planis nervosis
Cochlear. Hort. Kew. 1. p. 57.
Habitat in Cap. b. spec.

non vidi

humilis 9 ^{erectis}
Gria foliis linearibus multiplicatis, floribus secundis
Gria bulbocodivida; caule foliis brevioribus, ramis unifloris De la Roche Desg. n. 6
Gria humilis; scapo ramoso, floribus secundis, foliis subulatis
erectis Thunb. ex. n. 4.

Habitatio Cap. b. Spei 2

Solia angustissima & pithamea et ulrid, angustissima, unicum
superne. Scapus simplex vel ramosus, filiformis, erectus. Rachis
flexuosa, quadri- octofloris: flores distantes. Spithae vix unguicula
laevi, oblongae, striatae truncatae, striatae, virides; tubosorum breviores
^{corolla}

Variat floribus lacteis vel albidis rufescentibus & in incarnatis
Thunb. l. c.

An huc spectat Gria flava; scapo folioso pubifloro, foliis linearibus
canaliculatis striatis longissimis, stylo brevi Lamark. illustr.
l. p. 109. ?

Gria bulbocodivida cum ⁴bulbocodivida conjungit. Cel. Thunb. ^{pergunt} m. h. i.
datur quadrare cum ejusdem Gria humili

linea flava
Gria

Enipha 7. foliis linearibus crispis, floribus alternis Thunb. Thunb. Pro. n. 0. 104

S. V. p. 04

4^{na} *Enipha* foliis subulatis crispis, scapo setaceo Lin. Suppl. pag. 917

Habitat ad Cap. S. Jacobi

Folia ciliatis supra, linear-lanceolata acuta, marginibus pulcherrime crispis. glabra nervo longitudinali crasso, scapo filis duplo breviora. Scapus simplex vel ramosus, teres, glaber, flexuosus erectus, multiflorus, subpedalis. Flores alterni, remoti. Spatha exterior tridentata, nervis totidem finata; interior bidentata, nervis duobus. Corolla tubus subviridis. Limbi laciniis caeruleis stigmata apice clavata variet scapo simplicem et ramoso; corollis caeruleis et albis. Thunb. non vidi.

~~* Caulis ramis foliis~~ ^{floralibus}
pyramidalis 10 4 ^{floralibus} foliis inferioribus ensiformibus, ^{superioribus} ovatis attenuatis

Axia pyramidalis; caule subramoso, foliis linearibus striatis. Distichis
patentibus: 8 superioribus latioribus sensim brevioribus spathaceis
Lamarck. Dict. bot. 3. p. 334. Illustr. 1. p. 109.

β humilior.

Habitat in Angula Franciæ Com merson. Ex herbario Fusdici et Thermani.

β in Cap. b. 9 p. 4

Bulbus obcordatus. Caulis spithameus vel semipedalis, erectus, apice

diversus in quatuor quinque ramos simplicis, interdum simplex,
et verso foliorum decurrente antipites. ^{Distichis.} Folia in fœva caule alterna,

superiora sensim ~~maiora~~ ^{longiora} ensi superiora sensim minor, ensiformis,
basi vaginaria, striata; suprema ante florescentiam semipollicaria,

spathacea, ante florescentiam ^{obovata} ~~imbricata~~, ovata, attenuata, recurva,
marginem membranacea, glauca. Corolla spatha ^{longe} ~~con~~ ^{longe} duplicata, lacinae
late. Flores ex axillis foliorum ^{floralium} spathiformium. Corolla tubus filiformis,

longe versus longitudine foliorum floralium, filiformis, versus
sensim ampliat. Limbi lacinae purpureo violacei oblongae, quin
que nervia, purpureo violacei.

Varietatem β non vidi.

* * Scapo vel caule foliis breviora longiore
hirsuta pilosa
pilosa || Frax foliis linearibus pilosis, scapo glabro; floribus alternis

Frax pilosa; scapo simpliciter, foliis linearibus pilosis lin suppl-92.

Frax pilosa; foliis linearibus pilosis, floribus alternis Thunb. ex n.

5.
Habitat in Cap. b. Spei 7.

Bulbus globosus, vix magnitudine pesi. Solia 3 uterque, erecta, alte
mutata, striata, pilis adspersa. Scapus ^{terminali et supra} foliis duplo altior, simplex,
erectus, apice flexuosus; teres, striatus. Flores tres vel plures, sub-
nutantes. Spathae pilosae lanceolatae, concavae, lanceolatae, acutae, virides, stri-
atae. Corollae ~~3~~ tubi capillatis: Limbi lacinae lanceolatae concavae,
~~extus~~ tres exteriores intus albae, extus purpureo viridescens, margine albo;
tres interiores albae

Antherae basi bifidae, sigmata hirta. Capsula hexsulcata. Vesperi ab
hora quarta flores aperit Thunb. l. c.

bulbifera G. foliis ensiformibus spathe membranaceis Letaeo Caiens Thunb.

n. 17.

Guzia bulbifera foliis lineantibus axillis bulbiferis, floribus alternis
faminibus lateralibus Lin. Spec. pl. pag. 51.

Habitat ad Cap. b. Spei

Scapus simplex vel ramosus, subcompressus striatus glaber, inferne
foliis sagittatis, palmatis vel pedalis. Folia ensiformia nervo
so striata, distica erecta, glabra, sicapo breviora, spatheata. Flo-
res tres vel quatuor magni: rachide inter flores flexuosa. Spatha
membranacea, nervosa reticulata, gineo apice fuso purpureo
tes, lacera, filamentosa anastata Corolla tubi spathe ut longior
limbus aetia medium, non vero usque ad tubum 6 partibus. Laci-
nia magna oblonga, obtusissima ^{orato} patente unat flore pur-
pureo, albo rubroque variegata, flavo, sicapo bulbifera, althon
vel breviori ramosa vel simpliciter Thunberg

hista 12 Frax foliis ensiformibus hirtis, scapo glabro, floribus secundis +
Frax inflexa; caule ad angulum flexo, floribus erectis secundis,
spatha exteriore calycina, corollae fere longitudine De la Roche
Des 8. n. 1.

Frax hista, foliis ensiformibus hirtis, floribus secundis Thunb. ic.
n. 6.

Frax secunda Laing. collect. 4. p. 100. Frax. 2. t. 277.

Habitat in arenosis humidis. Cap. 6. 8. per

Valde similis Frax secundae, differt: foliis valde villosis, nec albidis
foliis striata, scapo breviora. Scapus 8. simplex, inflexo-erectus. Flo-
rer saturate coerulei. Spathae integrae Thunb. l. c.

An Frax foliis glabris nervosis, hirtis, floribus 8. pinnatis termina-
tibus Mull. ic. 103. t. f. 1. huc pertinet?

anastata 4x. foliis ensiformibus glabris, floribus alternis sessilibus; spathe longitudi-
ne tubi lacera Hort. New. 1. p. 57. Schaefferi c. pl. rar. tab. 32

Gracilior anastata foliis linearibus, spathe anastato-dentata Thunb. ex. n. 15
a corollis purpureis

Gracilior uniflora scapulo uniflora, foliis ensiformibus, spathe lacera Lin. Mant. p. 27

Gracilior grandiflora de la Roche pl. nov. p. 23

B. corollis violaceis: laciniis margine stramineis

Gracilior foliis glandulatis nervosis, spathe lacera Mill. L. 150. t. 237. fig. 12

Habitat in Q. b. spei

B. albus reti-
culatus

Scapus simpliciter erectus, glaber, palmatis, usque pedalis vel
paulo ultra. Folia ceteris quatuor vel saepe linearia s. nervia
nervo medio et marginibus crassioribus; acuta, erecta, glabra,
scapo dimidio breviora. Flores secundi, raris sive unicus, natis
duo saepe a saepe usque ad novem in rachide vix flexuosa
spathe submembranacea, anastato-dentata. Corolla albocinerea
nata Thunb. n. 15

Secunda 13 Fria foliis linear-ensiformibus glabris, caule villosa & ciliatulo,
floribus & secundis

Fria sicillani foliis ensiformibus striatis, spica elongata Lin.
Spec. pl. 523

Fria secunda; caule ramoso erecto floribus & secundis, stigma
tibus latis membranaceis De la Roche Desp. n. 4

Fria secunda; polystachya, spicis cernuis secundis Berg. cap. 6

Fria secunda; foliis elliptico-ensiformibus, scapo villosa & gla
bro Humb. Des. it. n. 7. Faug. collect. 4. p. 1 80. 4c. var. 2. t. 277.

Habitat in Cap. l. spec. 4

Bulbus ^{subterreus major} ~~subterreus~~, basi truncatus, dorsum & quatuor-imbriatus.

Homoglyphina nacia
Conyle

Caulis epithamiae vel pedalis, raro simplex, plerumque ramosus,
flexuosus, erectus. Folia duo in caule, reliqua radiata,
subfoliata, ut nunquam attenuata, nervo medio crassiuscula, striata. Rachis
a floribus ad florem arcuatam flexuosa, quadri- sex flora. Flores
distantes, calycata caerulei. Spathae lanceolatae, virides, apice
brunneae. Perollae tibus brevis bimeri.

~~unulada adhaec non haec in h. i. p. t. adhaec ad haec ubi~~

hista *Gracia* foliis eniformibus hirtis, floribus secundis Thunb. Diss. p. 9. * S. V. pag. p. 84

Gracia inflexa la Roche Diss. p. 15

Habitat in Cap. bono sive arenosis humidis &

Folia spatulata, scapo breviora. Scapus simplex, inflexo-erectus glaber. Glomerata
rate canalic. Spatha integra.

Differt ab *f. secunda* foliis valde villosis, pilis albidis Thunb. l. c.

~~Scapus, glabro, foliis crispis~~
~~Folium~~
~~the~~

crispa 14 Fria foliis linearibus crispis, floribus albis Thurb. ix. n. S. t. ?
Fria undulata; foliis lanceolato-linearibus undulatis, scapo trifloro
Burm. prodr. 1. p.

Fria crispa; foliis subulatis crispis; scapo 3-6-acteo Lin. suppl. 91.
Habitat in Cap. b. Spei ?

Folia circiter quinque, scapo duplo-quadruplo breviora, unicum
interdum inferne in caule, angusta, attenuata, medio nervo flavescen-

Te. Scapus ^{multiflorus} simpliciter pedalis, simplex vel inferne ramo scapo
breviora, erectus, superne flexuosus, teres, laevis. Flores ^{nervi} inferiore
remotiores, & superiores confertiores. Spatha bivalvis, brevis, mem-
branacea exteriore tridentata, dentibus aequalibus, trinervi; interiori
bidentata, binervi. Corollae tubus subviridis: limbi laciniis coe-
ruleae. Stigmata apice clavata.

Variat floribus albis Thurb. l. c.

extensa 7 foliis ovatis floribus secundis, scapo flexuoso Thunb. Bot. Fr. n. 24. c. ii.

S. V. p. 87

4ra extensa caule simplici, foliis ovato-oblongis latere interiori exte-

si linc suppl. pag. 92. x

Habitat ad Cap. b. p. nei

Bulbus globosus, fibrillosus, ruber glaber. Folia radicalia duo ovata, obtusa, glabra, margine interiori complexantia, ibique pro scapo extensa, p. tercia semipollicaria. referunt folium unicum bifidum. Foliolum in p. medio scapi spatulas referens, solitariam scapus 7-8, erectus, glaber uniflorus et multiflorus, digitalis et palmatis. spatula glabra apice obtuso pubescente, extenore vix tubosior. Corolla tubus ruber limbo lacina obtusissima patente, extus nesciente, rubro striata intus albo rubro striata transverse caulis medio cauleculum edit, uniflorum. Thunb. non vid.

Cinnamomea 15 ^{subfalcato-reflexis} *4xia* foliis lanceolatis crispis, floribus alternis, ^{Corollam tubo spathae} ~~Thunb. ix. n. 9.~~

~~4xia~~ ^{longiore}

4xia *Cinnamomea*; foliis lanceolatis undulatis, spina secunda
Lin. suppl. 92.

4xia *Cinnamomea*; foliis lanceolatis crispis, floribus alternis ^{Thunb. ix. no. 7. 2}

4xia *Cinnamomea*; foliis falcatis crispis; floribus alternis, nocti-
floreis, *Cinnamomi* odore. Andr. repos. t. 44.

Habitat in Cap. b. sp. 7

Toto glutinoso ^{magnitudine} Bulbis ^{conicis} deorsum, deorsum truncatus, deorsum imbricatus. Soli
radicalia duo, scapo triplo breviora, subfalcato-reflexa, nervo medio
elevato; cotyledonis unicum, unguiculare, amplexicaule, ovatum,
obtusum, apice reflexum; caulina duo, inferius pollicare, ^{supra}
nervis unguiculare, remota, spathae formica; inferius pollicare, ^{tripollicare}

^{supra} trispicum convulso vaginario, vagina longa, apice compressum; superius ungui-
culare. Flores tres-novem, erecti. Rachis subflexuosa. Spathae
valve la exterior concava, obtusa cum adumine, apice purpurascens,
interior apice bifida. Corolla tubo spathae parum longior, purpurascens.
Limbi lacinae tres exteriores albae, tres exteriores extus purpurascens.

Thunb. l. c.

Flores nocte suade oleis insto *Cinnamomi*

Corymbosa 16 *Axia* foliis ensiformibus ^{foliatis} ~~ret.~~ ^{reversatis} nervosis, caule ancipiti
Caryophyllus monomotapensis nervosis bipleurifolius, intus cavis, flore
caeruleo, cauliculis secundum longitudinem alatis Pluk. n. Alm.

S. 7. t. 275. f. 1.

Axia corymbosa; floribus corymbosis pedunculatis, caule ancipiti.
Lin. am. ac. 4. p. 300. Spec. pl. 51.

Axia corymbosa; foliis lanceolatis crispis, basi ancipiti Thunb.
ex. n. 10. Fideiq. collect 4. p. 179. F. var. 2. t. 88.

B. floribus albis

V. humilis

Axia fastigiata; ^{ff} habitat in sabulosis et ipis viti Swartlandiae ad Cap. b. Spei 4
foliis ensiformi- Bulbus ovatus, truncatus, reticulatus. Caulis & pitha malle,
angulatis nervosis erectus, flexuosus, superne in ramos floriferos fastigiatos divisus,
crispis, caule ancipiti, erectus, flexuosus, superne in ramos floriferos fastigiatos divisus,
floribus ^{non simplicibus} glomeratis mono-diphyllus, e margine fo. exteriora foliorum decurrentes
fastigiatis ancipiti, interdum crispo interdum plano, ancipiti, striatus. Solum
unicum radicale, interdum caule altiore, interdum breviora,
erectum, quicque nerve, crispum: caulina similia, modo breviora,
et saepe margine plana. Pedunculi plerumque dichotomi, raro indivi
verta

Del. bot. 7. p. 337. illustr

t. p. 110

Bractea parva ad basin singuli pedunculi -

Si compressi. Clasae duo unicis vel duo in singulo pedicello, alter inferior, saepe
sessilis. Spathae oblongae, obtusae apice rotundato, subindur. Corollae tubus

Coenocera: Spathae parum longior: lineari laciniis lanicollatis.

Varietatem vide scapo semipedali, foliis radicali margine plano.

heterophylla 17 9^{ta} foliis radicalibus lineari-enseformibus stria planis, floralibus
lineariibus obtusis undulatis floribus longioribus, spathis univariis. †
Galaxia plicata, foliis plicatis. Faig. Coll. Suppl. 30. F. 3. var. 2. t. 291.

Habitat in Cap. b. Spei 4

Bulbus conicus, striato-rugeus; fuscus, arellana minor. Caulis sesuncia
li, ^{adnascens vel erectus} infra terram foliolo radicali spathaeformi acuto vaginato, terci; superne
in caeteris, albidus; ascend. apice ^{foliolo} diviso in fasciculum densum
foliorum, striato-plicatorum. Solum inferum circiter quinq. unciar
longum, lineare, inferne versus sensim latius; erectum, acutum; aliud
huic oppositum, oblongum sesunciale, oblongum, obtusum, latere fissu
amplexicaule, superne patentissimum: reliqua sublineare, obtusa,
undulata, patula. Flores axillares, albi. Spatha ^{non stipitata} albida, pellucida, apice
intra spatam et viridis, uncialis. Corollae tubus filiformis, uncialis, panem
incurvatus, superne triangularis: limbi lacinae lanceolatae, panem
conicae, patentissimae, subaequales, tubo triplo breviores. Faig. l. c.

erecta ~~IXIA~~ foliis ensiformibus, scapo polystachyo floribus alternis immaculatis
Thunb. Bot. pag. 167 S. V. pag. 85

* ~~IXIA~~ foliis linearis lanceolatis, floribus axillaribus et terminalibus Mell. Ic. 155.
fig. 2

~~IXIA~~ hypophloa La Roche disput. p. 20

~~IXIA~~ polystachya foliis linearibus, scapo spicis pluribus Lin. Spic. pl. p. 51*

~~IXIA~~ erecta, polystachya, tubis corollae capillaribus erectis spatibus duplo
longioribus Berg. Cap. pag. 54

* Ornithogalum spicatum minus album, foliis nervosis aspidium Pluk. Alm.
272. t. 380. fig. 1.

Habitat in C. b. sive collibus 2

Folia cincta 3-4 multinervia, erecta, glabra, scapo duplo breviora. Scapus
terres, glaber, erectus, pedalis usque bipedalis. Rami alterni, capillares, erecti,
digitales. Flores in scapo et ramis spicati, in rachide flexuosa digitali
spathe submembranacea, ^{sub}anfractuosa. Variat corollis luteis et violaceis unicoloribus
Thunb. l. c.

marginem et carina crassa

polystachya Thunb. huius forte quoque pertinet

— foliis planis + glabris, planis foliis planis
Anemoneae flora 10 9xi foliis linearibus ensiformibus erectis Scapo unifloro aequan-
tibus +
9xi anemoneae flora; Scapo unifloro, foliis linearibus ensiformibus; super-
ne obliquis, longitudine Scapi erectis Haenke collect. 6. 9xi var. suppl. 10.
9xi var. 2. 1. 273.

• Habitat in Cap. b. p. p. 24

Bulbus magnitudine fere avellanae, subrotundus, tunica striata, fusca ve-
tus. Folia radicalia, plura, decem pollicaria, disticha, striata, nervo
medio protuberante. Scapus teres, gracilis circa medium inflexus;
gracilis, nitidus, viridis. Spatha ~~brevi~~ brevis, & cariosa: valvula
altera bidentata, altera tridentata. Corolla alba flavescens teres
me tridentata; tubus longitudine: limbus diametro biunciali; lacinae
obovatae, parum concavae, obtusiusculae, subaequales. Stigmata apice
coalescentes Haenke b. c.

campanulata ~~fiapo~~ brevissimo pauciflora, corollis amplis campanulatis
fiapo longioribus, foliis filiformibus feniatis La Mart. T. Enc. pag. 107
Habitat in Cap. b. p. ei
varietas IX - Bulboidii

non vid.

coelestina 19 Tria foliis linearibus subulatis scapo unifloro multoties breviora Wied. spec.

pl. 1. p. 200. +

Tria coelestina; radice bulbosa subrotunda, caule tereti vaginato,
foliis linearibus lanceolatis, floribus expansis magnis caeruleis Bart.

d. 152. + 3.

Habitat in Carolina 4

Salsola 7 foliis ensiformibus reflexo-falcati Thunb. Fl. n. 23. tab
Salsola falcata caule simplici, foliis falcati Lin. Suppl. pag. 92.
Habitat in Cap. b. p. nei

~~Bulbus corymbosus, corium imbricatus, truncatus. Scapus simplex vel
superne trifidus, subd. rpi. vel simplex
ramosus, glaber, teris, superne purpurascens, multiflorus. Folia disti-
cha, reflexo-falcata, striata, glabra, scapo duplo breviora basi attenu-
ata. Flores alterni distantes 1/2 vel plures in singulo ramulo
Corolla tubus tubus ^{demum per 2/3} spathe longior. Lacinia lateralis interior
tres rotundata, alba: interior intus alba, extus rubra. Spathe parva
vel nulla exterior ovata obtusa interior brevior lanceolata acuta. Variat
Scapo simplici et ramoso, palmari et spithameo: floribus alternis
et secundis rachide flexuosa vel vit~~

~~angusta~~
~~recurva~~
~~recurva~~

Fistulosa 20 9 axia foliis linearibus, scapo simplicissimo, spicis secundis, floribus

9 axia linearis; ~~9~~ axia fistulosa; 9 axia linearibus fistulosis; floribus secundis noctu
scapo simplicissimo fragrantibus; bulbus campanulatus, margine acuto fibroso Andr. repos.
flexuoso glabro, 59.
foliis linearibus, Habitat in Cap. b. Spei 21

bulbo conico ^{collet. 4. p. 183}
45-rar. 2. t. 299. folia angusta, ^{nervo} scapo in Yermidis et marginali crassiores, ^{obis} duo scapo longe

vagina nuda, brevis & minima; vaginae striatae. Scapus pedalis, teres, gracilis.
Floribus octo-decim, distantibus. Spica rachis flexuosa. Spathae
lineares, acutae, striatae, viride-flavescentes, apice parum purpurea
3 centes, integrae; ~~et~~ valvula exterior longitudine tubi. Corollae lacinae
lanceolatae, subaequales tres exteriores & tres flavescentes interius pallide
purpureae centes, interiores albae

conferenda adhuc cum figura linearis 9

purpurea ~~4ta~~ foliis linearibus - nervosis brevibus, caule simpliciter
superne nudo pinnato La Mart. T. Cui: pag. 112.
Habitat in Cay. b. p. i.
vultu affinis crocata

non vid.

angusta 21 IXIA foliis linearibus, scapo simpliciter flexuoso, floribus secundis

~~IXIA linearis Jacq. collect. 4. p. 183~~

IXIA linearis; scapo simpliciter flexuoso glabro, foliis linearibus; bulbo conico,

Jacq. ic. rar. 2. t. 279.

Habitat in Cap. b. p. 14

Affinis habetur et similitudinem florum IXIA folicata. Tota glabra folia disti-
cha, erecta, angusta, striatula. Scapus ortopollicanis, foliis albis. Flores
tres-quatuor. Differt ab IXIA folicata petalis utrinque albis Jacq. l. c.

49
Jacq. collect.
4 p. 183

~~IXIA linearis~~

~~IXIA linearis Jacq. collect. 4. p. 183~~

angusta
IXIA

maculata. ♀ foliis ensiformibus sicapo polytachyo, floribus alternis corollis
basi maculatis Thunb. Fr. n. 29
♀ tra foliis glaucatis glabris, floribus corymbosis Veronalesibus Mill
w. 8. 156. fig. 1.

♀ tra maculata foliis ensiformibus, floribus alternis petalis basi ob-
scuris Lin. S. V. ed. 13. pag. 76

Habitat in Cap. 6. p. 1.
♂. v. rudi Schaeer. Fr. pl. rar. tab 6. p. 1. specis 8. p. 1. pedalis
♀. rubra ib. tab. 25

~~♀. alba~~

♀. flava

♀. flava apicibus purpureis

♀. albo coenulescens

♀. coerulea

purpurea macula pallida

3 Bulbus nucis avellanae major. Folia tra. 4. 5. ensiformia multiter-
ria nervi marginales et dorsalis crassiores, sicapo duplo breviora. Lea-
pus saepe simplex, raro polytachyo, teris, erectus, prothamius,
pedalis et ultra. Rami filiformes, erecti vel patentissimi. Spica
terminalis vix flexuosa. Spitha membranacea basi crispata, apice brun-
nea. vix nisi macula adnata basi corollae a ♀. eruta dignosca-
tur Thunb.

Virgata ~~21~~²² Trixia foliis setaceis, caupo ramoso virgato flexuoso Wied. Spec. pl. 1. p. 202.

Virgata 14 Moss caule ramoso, foliis planis, floribus alternis solitariis &

Moss virgata. Agropyrum collina p. 194, caule tereti ramis que virgatis, foliis
lineariibus longissimis, sepalibus solitariis ex spathis Jacqu. collect. ~~194~~¹⁹⁴ ramos.
Habitat in Cap. b. Spec. 4

#3. p. 194.

9c. nov. 2.

t. 220

Caulis sesquipedalis, teres, erectus, inferne flexuosus, gracilis: Ra-
mi virgati. Folia bipedalia, ^{paucis,} linearia, basi vaginantia, pinnis argu-
tissimis, flaccida, striatula. Spatha ^{bope} quadri-valva, convoluta,
acuminata, pallida, externa pilosa, amplexicaulis. Flores bre-
vis pinnis pedunculati, solitarii, ex spathis successive prodeuntes.
Periclypeo infundibuli formis: Tubus pallidus: laciniis lanceolatis,
oblongis, obtusis, planis, patentissimis, tubo triplo longiores, luteo-
cum fascia media virescente. Filamenta flava. Stigma sex-
fidum Jacqu. l. c.

got

, r

pusilla M. scapo an cicuti, foliis distichis, flore subsolitano Thuab

m. n: 4

Habitat

Scapus simplex, erectus, 1 florus vel biflorus, palmari. Folia
radicalia, disticha, lineari lanceolata, subsalcata, serrata, glabra
scapo breviora. Spatha naviculari, integra, longitudine floris.
Corolla corollae lacinis alternis angustioribus Thuab

an *Sisyrinchium*

non videtur

Scillaris 22²³

Tria foliis linearibus, floribus secundis, rachide flexuosa, Spathae val-
vula exterior membranacea integra, ~~complexa~~ tubo corollae brevissimus
Habitu ad Cap. b. spei 7 deorsum squamatus

ix. 12. 14.

Bulbus ^{magnitudinis} ~~ovatus~~ ^{pisi} ~~truncatus~~. Folia longe vaginantia, spithamaca, scapo
breviora, cincta tria, lineam dimidiam vix lata, crassiuscula, stria du-
pliciter profunda. Scapus teres, erectus: rami filiformes, nudi, flexuosi,
caeci. Flores remoti, saepe decem. Spathae valvula exterior parum longior,
membranacea, striata, basi viridis, apice cinerea, integra, interior basi
viridis, apice membranacea, bifida, cinerea. Corollae tubus brevissimus,
flavo-virescens: limbi lacinae concavae, flavae, tribus exteriori-
bus dorso purpurascens Thunb. l. c.

Scapus interdum simplex. Flores parvi

Linearis Axia foliis linearibus; Scapo simplici erecto Thurb. Diss. p. 12 * S. V. p. 84

Gria Linearis, caule simplici, foliis linearibus convexis striatis Lin. Suppl. p. 92.

Habitat in C. bono per campis arenosis 4

Bulbus ovatus, fibrosus, magnitudine avellanae. Scapus teres, glaber, palmaris et al

tra. Folia circiter 4: inferum longe vaginans, latiusque convexum, linea
media elevata, angustissimum, erectum, apice attenuatum, glabrum

Scapo paulo brevius. Superiora duo spatheata, ~~breviflora~~. Flores plerumque

Uppolluaria juniper 23 secundum rari unicur. Spatha convoluta, lanceolata, acuta, striata,
vepsit panum minor ovata
exterior major longitudine corollae, Corolla tubus albidus. Limbi laciniis
lineano obtusa cum acumine, unguiculatae. Stigmata revoluta. Capsula vix an

in mea longitudine
vix dubi gulata, sex striata Thurb. l. l.

capillaris 24. Ixia foliis linearibus cartilagineo marginatis, ^{radiculis formibus} scapi ramis ^{secundis} ~~subuni~~ flo-
ris, spathis membranaceis dentatis +
Ixia capillaris; caule multifloro, floribus pedunculatis erectis,

foliis linearibus erectis lin. suppl. 92.

Ixia capillaris; foliis linearibus, scapo polystachyo, spathis scarosis
Thunb. it. n. 12. t. 2. f. 2.

Ixia lancea; scapo simplici, erecto; foliis ensiformibus, adoras
revolutis; floribus secundis; racemosis Jacq. suppl. 13. ic. var.
2. t. 201.

gracillima ^{β.} foliis linearibus angustissimis non marginatis, spatha tubum su-
perante Curt. mag. t. 570

aulica v. robustior ramis multifloris, spatha tubo subaequante Curt. l. c.
Ixia aulica; foliis ensiformibus nervosis, floribus racemosis,
bracteis integris Hort. New. 1. p. 57.

incarnata ~~A~~ Corollae tubus ^{ce} ^{ut} ~~est~~ cylindrico anguste turpente, spatha
multo longioribus, limbo hypocrateriformi - patente. Curt. l. c.
Ixia incarnata; caule simplici, erecto; foliis ensiformibus,
adoras revolutis; floribus secundis, ^{picatis} Jacq. suppl. 13. ic.
var. 2. t. 201.

Bulbus reticulatus, fibrosus, magnitudine Avellanæ. Tolia & capo dimidio brevis
ra, angusta, nervosa. Scapus bipedalis, capillaris, teres, apice divaricus, erectus:
ramis pedice Flores in ramis solitarii, in apice & capi alterni, erecti, albi,
senos & reticulati. Spathæ venis fuscis. Thuab. l. c.

collyphites
calypulctus & spica glomerata in rubro communi involucro. Cæco calypulctus
Erechtini Euceno simpliciter, erecto: spica glomerata: calyx communis calypulctus
Korn. n. 3. p. 39. tab. 463
Folios in involucro communi
Euceno variegatissimus, glaber, byssodes albus. Cæco plena. Vagina uterino
Qui longior foris demissa. Spica simpliciter, simpliciter, capitula opposita
fructu. Calyx foris irregulari brevibus calypulctus, foliola subobovata
pubescente-compresso, vasa demissa, ex capto apice. Glomerati 3-4 foliolis
mes fore hermaphroditi. Follia. Semen ovatum, calyx & corolla parvissimi
pedicellæ rubrum.

incarnata ²⁵ ~~25~~ 9xia foliis ensiformibus margine reflexis, floribus ⁴secundis, ⁹spathae vel
vela exteriori tridentata &

9xia incarnata; caule simplicii, erecto; foliis ensiformibus, ad versus revolutis,
floribus secundis, spicatis. Jacq. Suppl. 13. 4c. var. 2. t. 201.

Habitat in Cap. b. p. 4

Bulbus magnitudine avellanae, subrotundus, reticulatus. Stipula semipe-
dale, longe vaginantis, erecta, firmula, margine parum incraspat, Stipula
tula, nervo medio protuberante. Scapus fere sesquipedalis, simplex
teres, gracilis. Flores cincti quini vel plures, erecti, cili, unciali,
in odori. Spatha membranacea; valvulis dentatis, stipula pallida purpurea
pro singulo dente, altera bidentata. Corollae tubus incurvatus, albidus
limbi laciniae ^{subaequales, 4} pallide rosae, oblongae, apice rotundatae, planae, pa-
tenti simae Jacq. l. c.

4. Longitudo tubi

ad se prop. tubi.

~~rubro cyanea
purpurea~~ ~~folia~~ ~~eniformibus~~ ~~velloso~~ ~~plectis~~ ~~scapo~~ ~~declinato~~ ~~velloso~~

~~Hab. in cap. b. mei~~
~~folia~~ ~~eniformia~~ ~~acutula~~ ~~ut~~ ~~in~~ ~~nocte~~ ~~velloso~~, ~~plectis~~ ~~neurosa~~
~~sempredalia~~ ~~vaginis~~ ~~ore~~ ~~hirsuti~~. ~~Scapus~~ ~~folius~~ ~~duplo~~ ~~brevis~~
~~declinatus~~ ~~velloso~~ ~~uriter~~ ~~florus~~. ~~Spatha~~ ~~trivalvis~~ ~~velloso~~
~~videt~~: ~~valvula~~ ~~exterior~~ ~~reliquis~~ ~~duplo~~ ~~longior~~ ~~Floris~~ ~~sespiter~~
~~corolla~~ ~~tubus~~ ~~pallide~~ ~~nubens~~ ~~limbi~~ ~~lacinae~~ ~~lacinae~~ ~~colatae~~ ~~ba~~
~~si~~ ~~rubro~~ ~~est~~ ~~tenis~~ ~~saturne~~ ~~cyanea~~ ~~subaequalis~~ ~~ab~~ ~~4~~ ~~ita~~ ~~velloso~~
~~differt~~ ~~colore~~ ~~floris~~ ~~limbo~~ ~~pat~~ ~~in~~ ~~stellam~~ ~~patentis~~ ~~primam~~ ~~expans~~
~~fo.~~ ~~foe~~ ~~qu.~~

varietas forte *fx.* villosa

26
linearis 24 4xia foliis linearibus ~~convexis~~ ^{acutis} angustis simis convexis, scapo simplici, floribus secundis,

Spathae ovatae, floribus secundis
4x^a linearis; caule simplici erecto, foliis linearibus convexis & striatis Lin.

Suppl. 92.

4x^a linearis; foliis linearibus, scapo simplici erecto Thunb. in 12.

Habitat in Cap. b. spei arenosis & caulis palmaris et ultra, Teres.

Bulbus ovatus, magnitudine Avellanae. Costa cinxer tria; inferum longe
vaginans, erectum, ^{angustissimum,} convexum attenuatum, utrinque convexum, linea media
elevata, ang. & scapo paulo brevius; superiora duo & spatheae, pollicaria,
superum versus parum minor. Flores raro solitarii, plerumque duo
vel tres, secundi. Spatha convoluta, acuta, striata: valvula exte-
rior ovata, long. Corollae tubus albidus: limbi lacinae obtusae ungu-
culares, obtusae cum acumine. Stigmata revoluta-patentia, pur-
purascencia. Capsula vix angulata, sex striata Thunb. l. c.

pelosa & *trix* foliis linearibus pilosis, floribus alternis Thurb. Desf. p. 3 + L. V. p. 29

trix scapo simplici, foliis linearibus pilosis Lin. Suppl. p. 92.

Habitat in Cap. bono spici collibus &

Radix fibrosa magnitudine pisi. Stem acuminata, subterrena, erecta, striata, scapo duplo breviora. Scapus simplex, teres, erectus, glaber, multus florus, pal-

mans & ultra, superne obscure purpurascens. Flores sessiles subnatae &

& alterni spathe Corolla extus rufescenti intus alba. Labi lacinis concavo, tres inferiores

lanceolatae vides
glabri vix angustae
culam videntur
breves

albo: tres exteriores intus alba, extus purpureo virescentes, margine albo

Anthera basi bifida. Stigmata hirta. Capsula bivalvata. Vespere ab hora
4ta flores aperit Thurb. L. C.

26
imbricata 25. *Ixia* foliis linearibus, ^{scapo polystachyo} caute ramoso, floribus secundis, spathis longitudine
27. ~~tubi corollae acutis.~~
Ixia imbricata; imbricat bulbo squamis imbricatis tecto, caule erecto
ramoso, spatha exteriora calycina tubi corollae longitudine De la Roche

Desc. n. 3.

Habitat in Cap. b. Spei 7.

Bulbus squamis imbricatus. Caulis didrachmalis: rami graciles. Folia caulis
dimidio breviora. Flores laxa spicati. Spathae ovatae: valvula exteriora
majora, margine colorato, apice acuto. Corollae lacinae lanceolatae, tres
extus nitrae, omnia interne luteo-alba. De la Roche. 6 c

Varietatem esse *Ix.* corymbosae suspiciat Thunbergius, at Bulbus reticulatus
neq. scapus aniceps, nec folia crispata, saltem secundum descriptionem
De la Rochei. An potius varietas *Ixiae* linearis ~~vel linearis~~?

lancea ²⁷ ~~26~~ 9 oxia foliis ensiformibus, ^{margine revolutis,} floribus & calycis simplici flexuoso, floribus
20 secundis, spatii obtusis.

Oxia lancea; foliis ensiformibus, floribus secundis, calycis simplici
flexuoso Thunb. diss. bot. n. 21.

~~Oxia lancea; calycis simplici, erecto; foliis ensiformibus ad oras
revolutis, floribus secundis radiceis. Jacq. Suppl. 13. f. 2. var. 2.
t. 21.~~

Habitat in Cap. b. Spei &

Bulbus caespitosa major, rudimentis foliorum dense involutus. Tolia
duo vel quatuor, ^{digitalia,} marginibus et nervo medio crassioribus, tenuissime
gignata, erecta; unicum vel alterum spatuliforme in calycis.

Calycis foliis duplo longior, teres, hinc inde compressus. Flores
circiter sex albo-purpureascentes. Spatulae obtusae, integrae, cinerasc
apice ferrugineae. Thunb. l. c.

~~Spatulae ^{corollae duplo brevioribus} ^{exterior} bidentata, interior bidentata. Jacq. Corollae
valde suavescentes: tubus exbulbatus, brevis, viridis, utrinque
pallidus, una coenulescens: limbi lacinae oblongae obtusae Jacq.
l. c.~~

~~9. Hanc videtur a mea pectore~~

polytaehya Gxi

~~*Gxi polytaehya* Gxiq. coll. 3. pag. 26~~

~~Habitat in Cap. 6 mes~~

~~Caulis 1 vel 2 tripedalis, erectus debilis, teres gracilis inu-
latus vagini antipetibus. Folia caulina 4-5 alterna longe
vaginantia erecta spicula, anguste ensiformia acuta rigida
la 5 nervia nervi incrassati prope marginales, semper
datis. Spica terminalis una alterave axillari pedun-
culata erecta secunda circiter 10 flora. Corolla carnea
lobis rubra. Spatha bivalvis parva alba membranacea
marginibus antice dentata. Corolla tubus longitudo in fa-
cie lacrima limbi obtuse ovata patens primo tubo
duplo longior. Gxiq.~~

polytaehya diversa eadem cum pentandria varietas
polytaehya

pectinata 27²⁰ ^{foliis involuto} ~~foliis~~ ^{subulatis}, floribus secundis, spatheis membranaceis
obtusissimis tubo elongato brevioribus.

Habitat in Cap. b. ^{simplex} 7

Caulis pedalis, ^{simplex} erectus, inferne teres, superne compressus, flexuosus.

Folia duo vel tria in caule, ^{basique} striata, pollicaria vel minima.

Flores septem, sesqui pollicares, parum distantes. Spatheae vix semi
pollicares, oblongae, nervoso-striatae, griseae, apice fusco marginatae,
subdenticulatae, interior parum brevior. Corollae albido-incarnatae,
tubus spathe duplo brevior. limbi laciniis oblongae, obtusae
^{longior}

an 9^o lanca Thunbergii? 9^o lanca Thunbergii diversa et
~~planta~~

vel haec forte Thunb. lanca et haec diversa

24
tenuifolia 28 Gria foliis subulatis quadrinerviatis, stapo filiformi, & pathis mem-
30. branceis dentatis tubo corollae brevioribus.

Habitat in Cap. b. & per. ex herbario Royenii 4

Stemina, semipedalia vel parum ultra, unicum & capite ^{parum} excedente, reli-
qua breviora, angustissima, medio nervi duo approximati, & unius ad
ad singulum marginem, uti stapus vaginae superne lineari-lanceolata,
sericea, involuta. Stapus foliis parum gracilior, laevi, nitidus.
Flores sex-septem. Rachis parum flexuosa. Spathae ~~membraceae~~
apice fusco-purpureascentes, tubo triplo breviores; exterior tridentata
& interior bidentata. Corolla tubo filiformis, purpurea: limbi
gensim dilatatur versus faucem: limbi lacinae pallide purpureae
lineari-oblongae obtusae.

emarginata *Stica* foliis linearibus - una latere exciso emarginati, caule ramoso, tubo

spathi multoties longiore La Mart. T. Enc. pag. 112

Cin *Stica* venicosa Vogel. pl. rar. Dec. 7. 4. 24. Febr. 2. ?

Habitat in Cap. b. p. ei

Corolla uncinata infundibuliformis, tubus gireus quinqueangulatus angulis

Stria purpurea limbi lacinae oblongae obtusae parum concavae basi

versus angustioris tres exteriores extus totae fere purpureae interiores

linea dorsalis purpurea, lacinae tres immaculatae, tres maculae parva

purpurea ^{est} ~~est~~ ^{caliculi} ~~est~~ ^{byrru} ~~est~~ ^{lymular} ~~est~~ ^{abtam} ~~est~~ ^{basin} ~~est~~ ^{dei} ~~est~~ ^{interne} ~~est~~ ^{inferne} ~~est~~ ^{intermedia} ~~est~~ ^{macula} ~~est~~ ^{bifida} ~~est~~ ^{flavescenti} ~~est~~ ^{superne} ~~est~~ ^{purpurea} ~~est~~ ^{inferne} ~~est~~ ^{albida} ~~est~~

non vid.

31.

filiiformis

IXia foliis ensiformibus, scapo simplici, spicis subnitentibus, spathis membranaceis ^{ovatis dentatis} tubo longioribus brevioribus

IXia anostata Schneey. i. l. t. 32.

IXia filiiformis; foliis ensiformibus, acuminatis; scapo filiiformi, erecto; spica nitente; laciniis calycinis tubo longioribus Venten-hort.

Calr. 40. t. 40. Redoute pl. lil. t. 30

Habitat in Caps. b. spei

Bulbus tunicatus, ~~vix~~ magnitudine avellanae. Solia disticha ^{ha}, nervosa.

Scapus gracilis, foliis duplo altior, nitidus. Flores purpurei, plures, inodori. Rachis flexuosa. Spathae valvula exterior ^{striata} tristriata, interior tristriata; interior bi-striata, bianistata. Corollae tubus gracilis, albidovire

sceni.

Redoute

maculatum

IXia tricolor C. 301

antholyeiformis ~~Stria~~ foliis ensiformibus distichis caule longioribus, floribus
virescentibus, petalis tubis longioribus et patentioribus La Mart. J. Enc. pag

109.

Habitata in Africa australi
ab alio ~~vaude~~ recedit.

non vid.

Cucurbita ~~30~~ ³¹ Gria foliis linearibus ensiformibus, floribus secundis, spatulae valvula
 32. ~~exterior tridentata~~ tubo brevior

Gria Cucurbita; Scapo polytachyo, erecto; foliis linearibus ensiformibus, obli-
 quis, erectis, striatulis; floribus secundis, natantibus Jacq. Suppl. 10.
fc. var. 2. t. 270.

Habitat in Cap. b. Spei ^{in magnitudine avellanae}

Bulbus subrotundus, depressus, tunica striata tectus. Folia longitudine
 Scapi val breviora, firma, bis vel ter obliqua, acuta, subtilis serie striata,
 Scapus pedalis vel sesquipedalis, ^{penne columbine gracilior} ~~dupli. ramo auctus~~, inferiore plerumque
 abortione. Flores secundis, inodori quatuor-septem, expansi nutantes, inodo-
 ni. Spatha alba, viridi paucistriata. Cate ovata valvula cate ovata,
 exterior ^{tridentata} ~~tridentata~~ ^{altera} ~~tridentata~~ ^{tridentata}. Corollae tubus gracilis, incurvus, viridi-pallens, spatula
 paulo longior: limbus albus, extus basi leviter flavo-viridulus; lacinae
 ovales, obtusae, patentes penae, alternae parum angustiores, ^{interius utraque} ~~interius utraque~~
 apice villosa Jacq. b. c.
Spathae valvulae apice coalescentes *

an huc pertinet Gria foliis linearibus, floribus spicatis sessilibus
 Mill. u. 104. t. 156. f. 2? vix enim ad flexuosam spectat.

Et albo-coerulescens

~~3~~ 3 coerulea Facq. ii. var. t. 14

3 purpurea macula rubro pallida

nigra. Schneeg. ii. t. 25. Facq. ii. var. t. 20

violacea Habitat in Cap. b. spec. 4

Facq. ii.
var. t. 23

ab Facq. polystachya vix nisi macula basi corollae diverxa. Capus
placumque simplex, rarius polystachyus. Folia angusta, interdum
gracilia latiora. Viridis specula elongata gaudet, et bractae apice integrae,
quod tam en quoque occurrunt interdum in reliquis varietatibus: Plures

Plures adhuc varietates vide apud Facq. t. 40. var. t. 21. 22

E. 65/

maculata 37 *Ixia* foliis linear-ensiformibus marginatis, & caepo polystachyo,

33 corollis basi maculatis tubo spathis longiore

~~*Ixia maculata*; foliis en-~~

~~*Ixia maculata*, foliis ensiformibus, floribus alternis, corollis basi ma-~~
culatis Lin. Man. 320

Ixia maculata; foliis ensiformibus, floribus alternis, petalis corollis
basi maculatis Kunt. ix. n. 14.

α albida

β. flava

Sisyrinchium majus africanum, flora luteo macula notato Old. afr.

32.

Ixia foliis gladiatis glabris, floribus corymbosis terminalibus Mill.

id. 104. t. 156. f. 1.

γ flava apicibus purpureis
floribus alternis. petalis basi obscuris Lin. Man. pl. 1664

δ viridis

Ixia viridis flora; foliis linearibus angustis striatis, caule simplicissimo
spicato, spathis exterioribus induratis Lamarck. Dict. bot. 340. illustr.

1. p.

Ixia maculata viridis; foliis linearibus, caepo caespitibus simplicibus
floribus alternis, corollis viridibus in centro anthe purpureis Schneid. 44

tt. 1. t. 6. Haenke. ii

ver. t. 23.

33
erecta ~~32~~ ³⁴ *foxia* foliis linearibus ensiformibus, ^{marginatis,} scapo polystachyo, floribus imma-
³⁴ ~~culatis,~~ spathe tubo corollae ~~longioribus~~ ^{longioribus} ~~venosis~~
Gnathoglym. spicatum minus album, foliis nervosis africanum Pluken. alm 272 t. 310. fig. 5.
foxia foliis linearibus - lanceolatis, floribus alaribus & terminalibus
Mill. ic. 104. t. 155. f. 2.

foxia polystachya; foliis linearibus, scapo spicis pluribus lin.

Spec. pl. 51.

foxia thysiflora; caule polystachyo, spicis alternis, cauli
approximatis, geminis inter brachas pedunculatis De la Roche

Disq. n. 7.

foxia erecta; polystachya; tubo corollae cum epullaribus erectis, spathe duplo longioribus Berg. in 5.
foxia erecta; foliis ensiformibus, scapo polystachyo, floribus

quoque
an huc pertinet

foxia foliis linearibus, floribus spicatis sessilibus Mill.
ic. 104 t. 156. f. 2.

alternis imbricatis Thuab. ix. n. 10.

Habitat ad Cap. b. Spec. 4
9. Hort. B. novobr. 1. p. 9. t. 10

Folia tria-quatuor, pedales, longe vaginantia, erecta, striata, nervi margina-
les et costae protuberantes. Scapus interdum bipedalis, gracilis, teres erectus,
teres, ^{pedunculatis} alternis, remotis, digitales vel breviores, capillares, erecti. Rachis
longitudine digiti minimi, flexuosa novem floris, pauciores in laterales,
flexuosa. Spathae breves, membranaceae, punctis minutis adpressae; ^{liber} valvula

exterior tridentata, tri-striata; interior bidentata, bi-striata. Corollae
tubus capillaris; ^{spathe longior.}

variat corollis albis, luteis et violaceis unicoloribus #

Chloroleuca 7. foliis linearibus, scapo semitereti unifloro

Ixia chloroleuca Jacq. coll. 4. p. 100

Habitat ad Cap. b. p. i.

Folia radicalia plerumque duo, linearia, angustissima, latibus conniventibus; telluri incumbenda a altero pedale altero bipedale. Scapus semiteretis, nodis, semipedalis. Flor. unius exitus. Spatha bivalvis valvulis ovatis acuminate scapo exsertis. Corolla campanulata tubo brevissimis lobis albis laciniis lanceolatis apice incurvis profundiusculis tres alterno exitu videtur Jacq.

accedit ad *Ixiam rostratam*

34
35 Strophia 7xica foliis linearibus ensiformibus marginatis, floribus alternis, spatii membra
natis integris longitudine tubi valvula exteriora tridentata longitudine tubi

Habitat in Cap. b. 8 p. i. Ex herbario Royeni 4

Bulbus reticulatus Solia radice alia plura, alternatim disticha, tri-quadripollicaria, inferiora
minora, intimam longius. Votum vaginans, attenuata subtilis, vime striatoy

nervi medio et marginales crassiores. Scapi pedalis, erectus, teres, laevi,
inter flexus flexuosus. Flores quatuor vel sex remoti. Spatha ^{trina}

H. unguiculare

tridentata, interiori apice ^{dentata} ^{tridentata}. Corolla ^{multica} alba, venis fuscis ^{interdum} puncta
tubus tenax griseus: Limbus campanulatus, basi tinctura flavescen-
te; Laciniis oblongae, obtusae, omnes interdum macula lineari fusca

affinis videtur lucida

34
36 tenuiflora ³⁴ *Gria* foliis ensiformibus, scapo ramoso, flenibus distichis, spathe
tubo brevioribus, ³⁶ membranaceis exteriore integra, laciniis corollae linearibus. valvata

Habitat in Cap. b. spci. 7 Ex herbario Royenii &

Solae semiunguem lata, attenuata, striata, nervo costali curvato.

Scapus inferne teres, superne parum angulatus, in pedunculos duos

vel tres divisus. Bractea duplex ad basin pedunculorum, exteriore

lanceolata; ^{ferruginea} exteriore in axi pollicari, in anstam attenuata, interior

triplo brevior, bifida. Pedunculi, rigidiusculi, remoti, subim-

compressi. Flores quindecim, in lateralibus paucioribus, disti-

chi, remoti. Bractea flexuosa. Spathae semiunguiculares, apice

ferrugineae; exteriore integra nervo colorato ¹³ striata, in periorbidentata,

bistriata. Corolla alba ¹³ sordide albescens. Tubus pollicari.

limbi lacinae angusta, obtusae.

pendula ²⁶ ~~35~~ 9 oxia foliis lineariformibus, scapo polystachyo, spicis pendulis.
37 Thurb. ix. n. 16.

9 oxia pendula; foliis lineariformibus, caule paniculato, racemis
pluribus pendulis Lin. Suppl. 91.

Habitat in Cap. b. spei hunc locis udis prope Krum rivier &

Radix ^{bulbi} moniliformi-articulati: articuli orbiculati, approximati, orbiculati, depressi, carnosi, rescentes. Folia ^{pedalia et ultra} longa, longe vaginata,

apice in acumen
sa ferrugineam
membranaceam
desinentia

8 tristata: vaginae marginae tenui membranaceae. Scapus major
apice scapus orgyali, teres, laevissimus, superne divisus
in pedunculos: pedunculi capillares quatuor vel quinque
remoti, capillares, nutantes, bi flori: flos alter sessilis, alter pedicellatus. Spithae membranaceae, laevae, hyalinae, nervosae, lanceolatae, natae, magnae, campanulatae. Corollae in ar

plures in termi
neis, omnesque
paucis

Spicatus Glad. caule simpliciter villosa, floribus umbellato spicatis
La Mart. T. Enc. pag 120.

Habitat in C. 6 p. 1

Differe videtur a *Glad. spicato* Lin. floribus per parvas
spica non distincta, brevior

nunc cognoscatur

37
flabellulatis ⁴ xia foliis exsiformibus reflexo-falciatis, stapo simplici flexuoso, spathe
30 membranaceis angulatis tubo brevioribus

Habitat in Cap. b. spec. Ex herbario Royeri 2a.

Folia digitalia, acuta, striata. Capus spithameus, superne panum
compressus. Flores quatuor, remoti, pollicares. Spatha vix unguiculati
pursurea: valvulae exteriore ante tribus, interiore duabus. Corolla flava;
tubus filiformis. Limbus campanulatus, venosus; lacinae oblongae, ob-
tusae.

pentandra 37

Gxia foliis ensiformibus. ~~Vinassa~~ nervosis, floribus alternis, spatha exteriori
nig. valvula ~~tridentata~~ ^{tridentata} carinata ~~tridentata~~ longitudinaliter tubum subaequante.

Houtt. Syst.
pl. 11. p. 33. t.
77. f. 2.

Gxia scillanensis; foliis ensiformibus striata, spica elongata. ~~3 spec. pl. 5. 2.~~
Gxia pentandra; floribus pentandris; staminibus curvis, foliis ensiformi

bus Lin. Suppl. 92.

Gxia pentandra; foliis ensiformibus, floribus pentandris Thunb. ex

n. 22.

Gxia polystachya

Habitat in Cap. b. 3. spec. 4

Solia inferne in scapo, disticha alternantia, inferiora sesqui pollicaria,
parum litoria, in sequentia acuta, in sequentia sesqui - bi pollicaria,
attenuata, acutiora, omnia tri- quaque nervia, subtilis ^{linea} striata

Scapus semipedalis vel longior, simpliciter vel ramosus, teres, lavis.
Pachis flexuosa, multiflora. 8 locis ^{parvis} in feriore remotiores, & superiores
magis approximati. Spatha brevis, membranacea, basi fusca, apice

valvula
Eoentiles leviter ^{valvula} dincta, exterior tridentata, denticibus subaequalibus,
gubulatis, interior bifida. Corollae tubus capillaris, spatha vix longior,
virescens. Lacinae limbi lacinae purpureae. Stamina limbo duplo
breviora.

Stamina 8 apice una, rarius quatuor-quinque. Antherae didymae
ovatae, incumbentes. Stigmata tria ³ saepius, rarius quatuor-quinque
filamentis parum breviora, plumosa. Thunb. l. C.

Setacea 40

Gria foliis linearibus, scapo uni-~~multi~~-multifloro, spatha herbacea
longitudine tubi
Gria setacea; foliis linearibus, scapo flexuoso glabro Thunb. Gria n.
13. Habitat in Cap. b. & per
Habitat in Cap. b. & per 4

Bulbus semi-
na Coriandri
parum major

Folia radicalia duo-tria, vix pollicaria, angustissima, angustissima,
acuta, uti reliqua planta glabra, medio nervo elevato, unicum in
scapo inferne striatum. Scapus capillaris, saepe vix longitudine digiti
minimi, parum flexuosus, simplicis v. ~~multiflorus~~ ^{multiflorus} uniflorus, interdum vix
fl bifidus ~~biflorus~~ ^{biflorus}. Spatha binervis subinflata: valvulae oblongae
semunquiculares, ~~concavae~~ ^{concavae} ~~aequales~~, ^{aequales} concavae, oblongae, acutiuscu-
lae, striatae. Corollae laciniatae limbi tres exteriores intus albae, extus
rubro striatae; tres interiores totae aeternae, basi macula fusca.
Vanae flore virescente, limbi apice albo: flore luteo. Thunb. l. c.

41
geminata ³⁹ 9^a foliis linearibus, basi ramose, flonibus belandis, spathis lanceola-
tis longitudine tubi, valvula exteriori bifida.

Habitat in Cap. b. Spei 4

Folia ^{rami vel gemmae} basi ^{rami} triplo vel quadruplo breviora, angusta, & triata. Spathis ^{pedalis, 4} ^{longitudinis} ^{rami} ^{triplo} breviora, angusta, & triata. Spathis ^{longitudinis} ^{rami} ^{triplo} breviora, angusta, & triata.

11 Super no angula
Tur

axilla ramus ^{gemmae} scopiformis, basi ipso parva breviora, ^{longitudinis} ^{rami} ^{triplo} breviora, angusta, & triata.

angulatus. Flores quinque, duo in ramo, distantes, secunda, fere
pelticari, basi flexuosa. Spathae vixide, minima herbaceae, fere
angulatae. Corollae flavescens; Cincti lacinae lanceolatae
acutae extus tres exteriores extus rubicundae.

~~sp. Spathae herbacea~~
affinis videtur, lancea et Spathae haec ^{longitudinis} ^{rami} ^{triplo} breviora et
mi mem. ^{longitudinis} ^{rami} ^{triplo} breviora et

floribus saepe
Graecia foliis linearibus, sic pro ramis, Spitham velvula est non bifida lani

42
radicata ~~46~~ ~~47~~ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰
^{ansiformis} ^{caule glauco}
^{floribus secundis} foliis linearibus obtusis, Scapo flexuoso geniculato simplicis,
limbo corollae patenti Wed. spec. pl. t. p. 202.

Yucca radicata. scapo simplicis, geniculato; foliis linearibus, glabris, basi
conicis, basi plana excurrente in orbiculum dentato radiatum.

Jaqu. Suppl. 15. t. 4. var. 2. t. 200.

Habitat in Cap. b. spec. 7

Bulbus avellana minor, conicus. Caulis fere sesquipedalis, crassitie
pennae columbinae, simplicis, debilis. Folia caulina circiter
quatuor, caule multo breviora. Flores circiter septem, distantes,
inodori. Spathae, valvula exterior oblonga, acuminata, convoluta,
striata, virescens; interior angusta, brevior, bifida bi-
dentata, hyalina. Corollae tubus longitudine spathae, erectus cu-
lus; limbus nudus; lacinae lanceolatae, sordide albentes, obsi-
re striatae, patentes; tres anteriores sordide rubentes, paulo
latiores et longiores. Stigmata interdum quatuor Jaqu. l. c.
Flores interdum scapulis interdum spithameis trifloris.

~~floribus secundis~~

Scillani f. foliis lineariis floribus secundis, rachide flexuosa Thunb. fr. n. 14.
 Habitat ad cap. sp. ~~saepius~~ ^{vaginatus} ~~magnitudine~~ ^{nisi}.
 Bulbus ovatus. ~~membrana~~ ^{sapere} ~~textura~~ ^{vaginatus} ~~radicibus~~ ^{radicibus} glaber ramorum
 rami filiformes ~~nisi~~ ^{flexuosi}; lati; glabri, florentes. Folia longe vaginan-
 tia lineana ~~circiter~~ ^{dimidiam} ~~tra~~, craspedula lineam ~~vel~~ ^{longe} lata, ~~forma~~ ^{forma} duplici-
 profundo, ~~scapo~~ ^{brachio} breviori, ~~per~~ ^{per} ~~tham~~ ^{tham} ~~moda~~. Flores secundis, remotis. Rachis flexuosa
 la multiflora saepe 10. Spatha exterior paulo major, glabra, striata, basi
 viridi; apice cinerea, membranacea, integra; interior basi viridi; apice
 membranacea, bifida, cinerea. Corolla tubus brevissimus flavo-virescenti. Lim-
 bi lobis concavis, flavis. Tubus exterioribus dorso purpuriscentibus Thunb.

Diversa a lin. qua secunda Thunb. uti et et flexuosa Lin. et
 secunda Bergii. Quis proinde tamen dubitabit

foliatis ⁴³ Gotia foliis ensiformibus reflexis - falcatis, spathis corollae ~~sub~~ corollae
tubum tubo aequantibus acutis.

Gotia falcata; caule simplici; foliis falcatis Lin. suppl. 92.

Gotia falcata; caule simplici foliis ensiformibus reflexis falcatis

Thunb. ix. n. 23

Gotia falcata; scapo polystachyo flexuoso, foliis ensiformibus

striatis, scapo brevioribus, rachis erecta Jacq. collect. 4. p. 103.

Fr. rar. 2. t. 276.

Habitat in Cap. b. spec. 4

Bulbus basi truncatus; deorsum squamis imbricatus; magnitudi-
ne pisci. Folia disticha, [#] striata. Scapus semipedalis, simplex

vel ramosus, erectus, saepe valde flexuosus, interdum minus,
superne purpurascens, ^{bi-tri-} multiflorus. Spathae valvulae linea-

ri-lanceolatae, ^{ac} striatae. Corollae tubus purpurascens;
limbi lacinae acutae, exteriore parum longiores, intus albae
exterior rubrae; interior albae.

Germen triquetrum Jacq. l. c.

interdum recta

Petaea 4 foliis linearibus, scapo flexuoso, glabro Thunb 7x. n. 13.

Habitat ad Cap. Spei

Rubrum proferens, calaber levi. folia lineana, acuta, pollicaria
angustissima, scapo breviori, linea media elevata, glabra subterna
in medio scapi folium lineare semipollicare, Scapus filiformis
longitudine ut digiti minoris, filiformis, erectus sive reflexus
simplex vel bifidus. spatula subringlata vix, valde conivata ma
ta glabra valvulis vix ^{interdum} canaliculatis semunqui sulcatis longitudine
tubi. Corolla breviflora ^{interdum} flori luteas vel rufas.

45
excisa ~~44~~ ^{margin} Gria foliis oblongis latere interiori inferne excisis, scapo flexuoso,
44 floribus secundis.

Gria excisa excisa. caule simpliciter, foliis ovato-oblongis, latere
interiori excisis Lin. suppl. 92

Gria excisa; foliis ovatis, floribus secundis, scapo flexuoso Thunb.
ex. n. 24. t. 1

Habitat in Cap. b. sp. 7 Juncifera
Bulbus radix globo spis, fibrillosis. Folia radicalia duo, oblonga semipollicia
nra, obtusae, marginem interiori inferne excis amplexant antheri, inque
exciso angustiora; unium, spathae formis in fra medium scapi.
Scapus digitalis vel palmaris, uni florus vel multi florus,
teres. Spatha glabra, tubo brevi agultata brevis et ima; valva
to obtusae, sub renatae. Corollae tubus filiiformis, ruber: limbi
lacini obtusae et gimae, patentes: ex
capis
caulis varis et una a medio cauli calum edit, uni florum. Corol
lae tubus ruber: limbi lacini obtusae et gimae, patentes,
extus rufescentes, intus striatae, intus albae, sub ut in que
nubo striatae Thunb. l. c.
variat glumis lanicollatis, longitudine dimidii tubi, floribus uno duo lin. b.
vide l. c.

minuta 4. scapus uniflorus, foliis corabris Theob. IX. n. 2. Tab. 1.

9^{ta} minuta scapis unifloris Lin. Suppl. Gray 92. h. v.

Habitat ad Cap. b. pae

Planta minuta ut pollicari. Bulbus magnitudine pisi globosus, setis
lo testis. Folia linearia scapi longitudine; angustissima subtus convexa
supra concava, glabra erecta, unum pro singulis scapis. Scapus raris uni-
cus superius 2-4 vel plures; simpliciter erecti uniflori glabri bracteati.
bractea duo parum supra medium lineari-filiformes, opposita lineam
vix longa. Corolla tubi albus, foris purpureus. Limbi carinae supra
concava nitida subtus alba, foris duplici purpurea. Theob

On this species 4^{ta} & 9^{ta} are rather variable in their characters.
I have seen in some individuals in the same place. 1. ?

aristata 46 Ixia foliis ensiformibus, scapo subcompresso flexuoso, spathis
45 membranaceis petalisco-lacenis, corollae tubus brevissimus

Ixia foliis gladiatis gladiatis nervosis, spatha laceni Mill.
ii. 158. t. 237. f. 1.

~~Ixia fimbriata; foliis ensiformibus, caule angulato flexuoso
simplici, spathis~~

Ixia aristata; foliis linearibus, spathis aristato-dentatis Thunb.
Do. ix. n. 15.

Ixia fimbriata; foliis ensiformibus, caule angulato flexuoso,
simplici, spathis fimbriato-lacenis Lamarck. Dict. bot. t. p. 339
Illustr. t. p.

β. Corollis purpureis

Ixia foliis gladiatis glabris, caule uniflora Mill. ii. 158.
t. 237. f. 3

Ixia uniflora; scapo uniflora, foliis ensiformibus, spatha
lacera Lin. mant. 27. Jacq. collect. 28. p. 101. 42. var. 237.
f. 3.

V. Corollis violaceis.

Ixia foliis gladiolatis glabris, & spatha breviora quinque feda Mull. in 1790. t. 237.

Ixia grandiflora, caule simplicissimo, foliis lanceolato-linearibus, floribus distichis De la Roche Desp. n. 11.

Habitat in Cap. b. Spei. Ex herbario Royenii & Lamarckii.

Bulbus truncatus, nucis avellanae parum minor, fibrosus. Folia radice

caulis ^{erectus quinque septem} plura, disticha, bi-tripollicaria, attenuata, striata, Scapus quadra-

Rachis flexuosa, multicaulis Bulbi nulli in axillis. Scapis quadri-pollicariis vel parum
ultra, erectis. ^{rarisime unius} ~~floribus~~ ^{# plerumque} ~~trifloris~~ [#] Strobiliis, secundis, distantibus, magnitu-

dine fere Ix. crocatalae. Spathae iniquiculares, nervosae & striatae, api-
ce multifidae; laciniis setaceis, longitudine & spathae, inaequales; ^{lobis} fusca-
que purascentibus. Corollae tubus tres laciniis oblongae, obtusae

1850

emarginata ⁴⁵ *Quia* foliis ensiformibus, in fere margine interiore medio angustatis,

⁴⁴ bracteis tridentatis tubo corollae brevioribus.

46 *Quia* emarginata; foliis linearibus uno latere exciso emarginatis,
caule ramis o, tubo & spathae multo longiore Lamourch. Int. bot. 3 p 342

illustr. p. p. 112.

Habitat in Cap. b. spec 4

Folia radicalia quinque-septem, disticha, bi- & tripollicaria, ^{inferiora minus} lanceolata,
acuta, a medio versus basin angustiora, striata, nervo medio pro-
tuberante. Scapus & pithameus vel semipedalis, erectus, ^{tersus} uni ^{versus} bicaudatus.

Rami pro breviores, folium ad basin brachii linearis. Rachis flexuosa.

Pedunculi solitarii
vel bini

quinque vel septemflora, flexuosa. Oloris distinctus. Spathae valvula
exterior oblonga, truncata, dentibus lateralibus brevibus, intermedium sub-

latus, patens. Corolla infundibuli formis: tubus quinqueangulus
semi pollicaris, spatha triplo longior, gracilis, sordide cinerascens

angulis purpureis: limbi lacinae ^{longiorae} oblongae, basi obtusae, basi
versus parum angustatae, pallide incarnosae, exteriores extra totae

bases purpureae, interiores linea dorsali purpurea, tres inferiores versus
basin macula purpurea, duas laterales cum macula laevata alba et
linea purpurea versus, faciem deorsum, intermedia cum macula bi-
nata lineata bipartita lactea et inferne versus tubum alba lineula alba.

patens ~~47~~ ⁴⁷ 4^{ta} foliis ensiformibus, corollis campanulatis ^{ratensis} patulis, laciniis alternis
patulis, filamentis erectis Hort. kew. 1. p. 59 +
~~Habitat in Cap. b. spei 4~~

patens 47 9^{ta} ^{sub} foliis ensiformibus, corollis campanulatis patulis, laciniis alternis
angustioribus +
4^{ta} ^{glabris, micis terminalibus,} patens; foliis ensiformibus, corollis campanulatis patulis,
laciniis alternis angustioribus, filamentis erectis Hort. kew. 1. p. 59.
Habitat in Cap. b. spei 4

bicolor 40 Arxia foliis ensiformibus nervosis, ~~scapo~~ reflexis, & capo ramoso flexuoso.

Arxia bicolor foliis ensiformibus multinerviis reflexis, & capo ramoso,
corollis luteis basi coeruleis Thunb. in Bot. & Mohr Archiv. t. p. 1. p. 23.

Habitat in Dania paludosis Cap. 6. spec. 2

Apelmonis vel spicae capitulum filiformis, flexuoso-erectus, glaber, foliis paulo longior. Stylus unus
thumalis ad quadruplum. Corollae limbus totus luteus; lobus apice coeruleus, bas-
lutescens Thunb. l. c.

Semagnum L. Culmo tereti nudo, spica duplici, involucri valvula majore
spicam operante. Lin. fl. Sv. 404

Gramen cyperoides minimum, caryophylli prolixi capitulo simi-
plici squamato Monf. hist. 3. p. 245. f. p. 112. fig. 46.

Habitat in Europa paludibus &

Stolones procumbentes imbricati folia radicalia stracca altitudo
na culmi 2 2 infra ad basi caulium vaginis culmum tubulosis
~~culmorum inferne~~ ~~in culmo sub spiculis singulis~~ ~~in unicum~~
superne in culmos cupis axilla pedunculis altitudine
culmi floris fasciculati semigraci pauciores in fasciculo inferi-
re similes floris sili. albi

similes negricanti a 3 vel sexies minor folia pollicaria
fasciculata apice fusca spicula terminales geminat
similes negricanti involucri folium inferius lanceolatum
attenuatum longius spiculis parum longius altera mul-
to brevior

bulbifera ⁴⁸ ~~49~~ *Ixia* foliis linear-ensiformibus, caule subcompresso flexuoso, & spathis membranaceis setaceo-lacini tubum aequantibus.

49 *Ixia* foliis linearibus, glabris, caule folioso bulbifero Mill. ic. 150. t. 236. f. 2.

Ixia bulbifera; foliis linear-ensiformibus, axillis bulbiferis, floribus aeternis, & staminibus lateralibus Lin. am. ac. 4. p. 300. Spec. pl. 51.

Ixia bulbifera; foliis ensiformibus, & spathis membranaceis setaceo-laciniis Thunb. ic. no. 17.

Ixia holosericea; ~~specie simplici; foliis linear-ensiformibus, glabris, & spathis aristatis~~
holosericea B. axillis absque bulbo non bulbifero to laciniis Jacq. hort. Schoenbr. 1. p. 9. t. 17

monantha V. *Ixia* monanthos; caule unifloro, foliis lanceolato-linearibus longiora

Bailei Roche Diss. p. 9.

axillis absque bulbo.

Habita in Cap. b. Spec. 4

Palmaris,
caulis pedalis vel ultra, simplex vel ramosus, & striatus, foliis vagi-

H *Brithomaea*,
garsum minorum

natur. folia tria vel quatuor in caule[#], erecta, attenuata, & striata:

Bulbi vaginali margine angusto membranaceo. Bulbi supra axilla
res, & solitarii-terni, ovati. Rachis flexuosa. Flores distantes tres vel
plures, distantes. Spathae nervosae, laciniis fusco-purpureo-roseis
tubis. Corollae tubus venis longitudine spathae: limbi laciniis oblo-

que, obtusae

donat floribus purpureis: rubro alboque variegatis, flavis. Thunb.
B. Gaudet foliis latioribus quam reliqua.

fimbriata Ania foliis cuneiformibus, caule angulato flexuoso simpliciter, spathe fimbriato-lacinis Lo. Meisn. & Eri: pag. 111.

Habitat in C. b. pra.

ab Ania angustata differt caule humiliori, floribus duplo vel triplo majoribus

non vid.

44
3 qualida ~~44~~ 9 stria foliis linearibus - lanceolatis, floribus alternis, laciniis limbi ovato-oblongis, Hot. Kew. t. p. 61 spathe membranaceis fissis tubo brevioribus +
50 9 stria 3 qualida; foliis linearibus - lanceolatis, floribus alternis sessilibus, tubo bractearum longiore, laciniis ovato-oblongis Hot. Kew. l. p. 61.

patula a. Laminis cuneiformi, oblongis obtuse emarginatis basi subhyalinis

stria b. foliis strictis, laciniis ovato-oblongis integerrimis basi concoloribus. Curt. mag. t. 487

Habitat in Cap. b. p. 7

Varietas a. Seiae convictae valde affinis, sed differt: Laminis convictae limbi laciniis angustioribus, magis pellucidis ideoque venis est stria nibus, leviter emarginatis, pallide rufescentibus seu sordide carneis, cum parvo flavescere

Varietas b. folia vix spithamea acuminata, stria, plana, scapus foliis duplo longior teres. Bractee duae ad basin vix seminiales. Perolla pallide lutea: limbi lacinae ovato-oblongae, obtusiusculae; exterior prope apicem rufescentes; interior una coeteris paulo latior
Hot. Kew. l. c.

undiflora ~~forma~~ foliis linearibus angustis striatis, pinnis longissimis, spatulis
exterioribus incisis La Mart. T. Enc. pag. 112.

Habitat in Q. b. p. ai
Spec. intendum sequipedale

50 ⁴²
Crotata ~~50~~ *Foxia* foliis ensiformibus, corollae tubo longitudine bractearum,

51 *Lacinis* obovatis basi hyalino fenestratis

Foxia ~~crotata~~ *planifolia* caule multifloro, spatha brevissima Mill. ic.
160. t. 239. f. 2.

Foxia *crotata*; foliis ensiformibus, floribus alternis, petalis basi
hyalino fenestratis Lin. pl. rar. 1. p. 13. t. 7.

Foxia *mulleri*; foliis linearibus angustis; vaginis acutiusculis, spica
terminali, spathe griseis. Berg. cap. 0

Foxia *crotata*; foliis ensiformibus, floribus secundis, corollae basi
hyalino-fenestratis Thunb. it. n. 20. Curt. mag. 6. t. 104. ^{hyalino.}

15. ~~Lacinis~~ *Lacinis* margine hyalinis floribus striatis, laciniis inferne margine
hyalino *Foxia* *fenestrata*

16. *floribus* lobis *caeruleis*

Habitat in Cap. b. sp. 4

Solia circiter quinque, *subfoetida*, *digitalia* vel *palmaria*, *subfoliata*.

Scapus foliis dimi nervoso-striata. *Scapus* foliis dimidio vel duplo

4 interdum semi
pedalis
altius, ^{simplex} vel ramosus, ^{subcompressus} erectus, ^{superne} flexuosus,
^{duo-nervi} laevi. ^{duo-nervi} Flores ^{secundi} vel ^{alterni} ^{spathae} oblongae ^{subrotundae}, membranaceae, ^{purpureae} striatae et punctatae, ^{pro} ^{opice} coloratae *

15. *Foxia* *fenestrata* ^{conspicua} vix nisi varietas esse videtur

anistata *Ixia foliis ensiformibus, scapo subcompresso flexuoso, spathe mem-
branaeis, bracteis lateris, corollae tubis brevissimis*
Ixia foliis gladiatis glabris nervosis spathe laevem Mill. ii. 15 p. t. 237. f. 1.
Ixia anistata; foliis linearibus, spathe anistata-dentata Thunb.

ix. n. 15.

B corollis purpureis

Ixia foliis gladiatis glabris

Ixia foliis gladiatis glabris, caule unifloro Mill. ii. 15 p. t. 237.

f. 3.

Ixia unifl

tricolor 52 Gria foliis ensiformibus erectis, Stipite flexuoso puberifloro, Spathis fusis
maculatis, tenuis pinnis plicato-plicatis Curt. mag. t. 301. +

Habitat in Cap. b. Spei ♀

Scapus pedalis, plerumque simplex, teres, flexuosus, bi-triflorus. Flores
magni Corolla magna: laciniis subunccatae basi flavi, medio fusis
macula fusco-purpurea inter uerugum et deorsum emittens lineam
eiusdem coloris, extus Eriocae Curt. t. 2.

longiflora
fusa
fusa paniculata; corolla paniculata, tubo floris longipinnis

capitata - *Spica ovata simplicis* Loefl. 1724 S.V.

Gramen spica subrotunda echinata Bauh. prod. 16. pin. 7. Scenob.
gram. 74.

Gramen montanum echinatum Tribuloides capitatum Col. Ephr.
1. p. 340. t. 338. fig. 1.

Gramen minimum, spica globosa echinata Barr. ci. 20. fig. 1. Et 202
fig. 2.

Habitat in Europa australi

gramen saepe vix pollicare interdum palmare. Culmi plures glabri
virescentes striati basi colicopi, simplicis spici. Folia pollicaria ubi vagi-
na, striata pubescentia. Capitulum terminale magnitudine
vixi majoris undique echinatum.

Deusta 53
aristata

IXia foliis ensiformibus; corolla tubo & spatulis brevior, laciniis exterioribus ^{extus gibbis} interioribus basi carinatis

IXia crenata; calapo simplici, brevi, paucifloro & macula atra supra fenestratam Thunb. ix. n. 15. var. a.

a. laciniis limbi exterioribus inferna macula atris-purpurea, fauce interioribus immaculatis

IXia deusta; foliis lanceolatis nervosis, floribus alternis & spithib. tubo bracteis brevior, laciniis obtusis; exterioribus basi maculatis carinatisque Hort. New. 1. p. 60

β. corollae fauce lineatis

IXia miniata; foliis ensiformibus, calapo polytachyo, corollae fauce ^{is} lineatae ^{is} huius hyalinis Faig. hort. Schoenbr. 1. p. 10. t. 14.

γ. laciniis quinque macula lineari flava, infima immaculata Zucc. hort. flor.

δ. ³² laciniis tribus exterioribus macula vermescina. Zucc. hort. flor. hort. flor. p. 32.

ε. laciniis tribus maculis vermescinis obcordatis lineis flavis int. & subtis ^{exterioribus} ^{extis} maculis obcordatis vermescinis medio linea flava saepe bifurcata & interrupta, duo lineae flavae vermescinis marginatae, & extis immaculatae.

ζ. umbella, flos laciniis fundo subhyalinis sex maculatis; maculis tribus cordatis ^{vix}

totidem que alterius floris Fuit. hort. flor. 52.

Habitat in Cap. b. spei 7

Folia palmata vel epithyma, acuta - Scapus simplex, foliis paucis interdum
vix altior. Spathae vix semi unguicularae, secundae, circiter sex, oblongae exterior
exterior concavae, carinatae, basi herbaceae in dis, superne membranacea,
flore explicitae fixae. Corolla plena que fulva: tubus breviter angustus:
limbi lacinae ovatae, leviter emarginatae; tribus exterioribus to versus basin
linea elevata, brevi *

radians 549

foliis ~~sempiteris~~ ^{uniflora} ~~filiformibus~~. Scapo ~~que uniflora~~ ^{simplici} ~~ramosissimo~~ ^{uni}
9 filiformibus, ~~gloribus~~ ^{gloribus} ~~solitariis~~. Scapo ~~que uniflora~~ ^{simplici} ~~ramosissimo~~ ^{uni}
9 filiformibus, foliis filiformibus Scapo erecto uniflora, corolla bicolori.

Thunb. in Web. et Mohr. arch. vol. 1. p. 1. p. 23.

Habitat in Cap. b. ^{speci} arensis ^{et}
Solia bipulica, scapo breviora. ^{vaginae in fletuae} Scapus ~~flexuoso~~ ^{erectus}, palma ans usque ^{et} pithae
maeus, simplex et ramosus. ^{et} los grandis. Corollae limbus apicis ^{et} concu
leus, medio orbis albidus, basi purpurea cum macula ^{et} saturatiora. Spathae
longitudine tubi. Thunb. l. c.

~~fructus s. utrumque, capitulo geminato globoso, involucro raphide
foliis lanabibus. Thunb. prodr. p. 1. cap. p. 17.
Littoralis in cap. b. prodr.~~

69
Corymbosus 77 70 Scirpus spicis subulatis, corymbis lateralibus simplicibus :
terminalibus proliferis, culmo folioso Lin. Am. acad 4. p. 303. +

Habitatio India

Culmus bipedalis, trigonus. Folia basi vaginantia. Spicae ferrugi-
nae: Involutionum uni versale corymbo longius. Seta foliacea
infra singulum pedicellum. Spicae ferrugineae. Squamae superio-
res, longiores, convolutae in spicam subulatam Corymbis simplex,
pedun culatus et singula foliorum caulinorum ala: terminalis
proliferus pedunculis intermediis longioribus proliferis. Spicae
ferrugineae: Squamae superiores longiores in spicam subulatam.
un. l. c.

hyalina ⁵³
~~fenestrata~~

Folia foliis ensiformibus, fol. floribus secundis, laciniis corollae obovatis in ferne margine hyalinis +

Folia fenestrata hyalina; floribus fulvis, petalis latere hyalinis in medio baseos linea flava lin. Suppl. 91.

Folia fenestrata, foliis ensiformibus; floribus secundis; corollae laciniis

Laque. collect. Habitat in Cop. b. Spec. 4 ad medietatem usque hyalino-fenestrata.

3. p. 270. var.

2. t. 209

Caulis teres, sesquipedalis, simplicis & inus, interdum ramo acutus, inferne erectus, supra folia horizontaliter reflectus.

Folia sesquipedalia, disticha, erectiuscula, acuta, summa breviora. Stem circiter septem, distantes, bi pollicares, & saturate

Apophthae margine biancase

macula ^{Cipiani} flava ad basin laciniarum

miniat #. Corollae tubus pallidus. Fer men ovatum, trique tum Laque. loc. et lin. t. c.

pendula ~~4~~ ⁴ ~~tra~~ foliis linearis ensiformibus, capro polytachyo spicis pendulis Thunb.
Desf. p. 157 S. V. p. 85

~~4~~ ⁴ ~~tra~~ pendula, foliis linearis ensiformibus, caule paniculato ramis
pluribus pendulis Lin. Suppl. p. 91*

Habitat in C. b. spicis humidis copiose 4

Radix moniliformis articulata: articuli orbiculati, depressi, approximati carnosif
resescentes. Scapus oxygali, teres, glaber, superne divises, ramis capillaribus
3-4 nutantibus flexuosis. Folia inferne vaginantia, acuta, striata, glabra
pedalis vel ultra. Spatha membranacea, lacera. Bractea fetacea
spica floribus alteris, remolusculis, 4-9. Corolla incarnata, magno
complanata. Omnium altissima, spicifera corollis magnis purpureis. Thunb
et Lin. l. c.

flores gemini in pagulo ramo

purpurea 56 Gria foliis ensiformibus subfalcatis nervosis

Gria crocata Thunb. varietas 6 Thunb. Diss. n. 20. var. c.

Gria purpurea; foliis linearis-ensiformibus brevibus nervosis, caule simplici. Superne nudo Lamour. dict. bot. 3. p. 341. illustr. 1. p. 112.

Habitat in Cap. b. spei. Ex herbario Lamour. 4

Uelae affinis. Gria crocata foliis radicalibus plura, sesqui pollicaria, semiunguem lata, acuta. Scapus
ta.
semi pedalis et ultra, inter flores flexuosus, erectus, teres. Flores circiter sex, distantes. Spatulae semiunguiculares, membranaceae, nervosae
superne purpureo punctatae: valvula exterior triplicifida; interior
bifida. Corolla magnitudine fere Gria crocatae, laciniis basi nec totis
nec margine hyalinis.

Iubiae

triticea

Ixia foliis vaginantibus subulatis, spathis imbricatis triticeis, floribus
approximatis Burm. prodr. 1. +

Habitat in Cap. b. spec. 2

Ixia

Habitat et colore Ixiae africanae ferruginea et africana. Scapus bipedalis.

Spithae duodecim, alternae. Flores tubulosi Burm. l. c.

Folia eadem cum Antholyza lucidor.

pyramica

Ixia foliis ovalibus, planis nervosis, petioli vaginantibus, spatha bivalvi
pyramidata Burm. prodr. 6. +

Plukn. phyt. t. 424. f. 8.

Habitat in Cap. b. spec. 2

Folia sex alterna, glaberrima, oblongo-ovalia, nervis quinque ad
petiolum contractis. Petiolum brevissimum, vaginantes, glabri, margi-
ne petio albi caribus. Scapus palmaris, sem. flex. triflorus. Corolla
maxima, lutea, unguibus purpureis centibus. Burm. l. c.

Potius Gladioli spec. 2

tubulosa

Ixia spathis appressis lanceolatis, tubo-florum filiformibus Burm
prodr. 1.

Habitat in Cap. b. spec. 2

Binae in hac specie varietates, altera foliis in star junctis, floribus

vide

albidis tenerioribus; altera foliis latioribus, petiolis foliis longitudo
contractis, floribus rufescentibus maculis rubris. Flores specie distincti,
post evolutionem secundae Burm. l. c.

forte a Gladiolo tubato non diversus.

Spicata Ixia foliis ensiformibus, spica simplici secunda Burm. prodr. l. 7.

Spicae nudae. Flores parvi, septem. Spathae binae, bivalves, multicae;

Habitat in valvulis ovalis, nervosis. Corollae tubus spatha duplo longior. Locus.
Cap. b. spec. 7 irregulariter diversus, violaceus Burm. l. c.

Versimile species Gladioli.

Carvophyllacea Ixia foliis quasi formibus planis, floribus tubulosis Burm.
prodr. l. 7

Habitat in Cap. b. spec. 7

Caulis brevis simplex, foliosus, declinatus. Flores albescentes, macu-
lis flavis Burm. l. c.

arcuata Ixia scapo foliaceo, foliis planis in flexus acuminatis, floribus tubu-
losis. Burm. prodr. l. 7

Habitat in Cap. b. spec. 7

Sin gulam foliorum in fascium decursum, quae Besquipalmaria longi-
tudine scapi sic in flexu ducit, ut apicibus summes flores sepius abin-
gant, quorum corolla tubulosa, purpurascens, calycibus magis tubulose
Burm. l. c.

Habitus ~~Bo~~ Bulbi solitari vel plures, ^{alter} ~~usque~~ ^{un} supra alterum. Folia acuta radicalia,
disticha, [#] acuta, e nervis tenuibus striata. Scapus erectus, simplex vel
margine va in pedunculis divisus. Flores ^{in plurimo} ~~plerumque~~ plures, sessiles, alterni. Spa
ginantia thae uniflorae.

+ Ditricha

aristata Gria; foliis planis inflexis acuminatis, scapo folioso, floribus tubulo
sis Burm. prodr. 2.

H. Dipsacaceae non
valeo, D. arque
inter reliquos
non inserui, an
potius Gladioli spe
ies? tubulosa

Habitat in Cap. b. spei 4

Singularis foliorum inferiorum decursa, quae sesqui palmaria longitudine
sui inflectuntur, ut apicibus summos flores saepius attingant, quorum

corolla tubulosa perpurascens, calycibus magnis tubulosis Burm. l. c.
num ad unam ex enumeratis pertinet vel speciei ab illis at specie C. f. f. a. descriptio
~~Gria spathe compressa lanceolata, tubo florum filiferis Burm~~
prodr. 1.

Habitat in Cap. b. spei 4

Biniae in hac specie varietates, altera foliis instar juncei, altera
foliis laticoribus, petiolis foliorum longitudine contractis. Flores spicati.
Ditrichi, post evolutionem secundi in prima albescens teneriores, in
altera rufescentes maculis rubris: amborum tubi tripollicares Burm.
l. c.

ovata Gria foliis radicalibus binis ovatis