

Ahora

Arbor Compositi facie myrti: foliis pithamigiis obtusis venosis reticula-  
tis nitidis forte huius generis folia interdum minoribus hypoleucis, obtusa  
basi cordata pedunculatis 3 ni

tenuiflora Frora foliis elliptico lanceolatis, floribus paniculae latiss, corollam  
tubo capillari

Habitat in India orientali.

Rami obscure superne obscure tetragoni. Folia petiolata, spitha mon  
et ultra, palmam lata, utrinque acuta venosa, glabra membranacea.

Stipula orato, acuminata. Pedunculi longi, pariter glabri,  
pariales oppositi, remoti, patentissimi, 2-3 pollicares, superiores  
breviores, apice ter tripartiti; pedicelli uniflori, gemmae minutae  
corollam viae magnitudinis capituli aciculi, dentibus 4 minutis corona  
tam glabrum. Corolla semi-pollicaris, glabra. lacini limbi lineares,  
acuti, etate reflexi. Anthera longitudine laciniam. Stylus longi  
tudine corollae, tenuissimus, superne crassior, bifidus.

ebracteatus - Convolvulus

Habitat

herb. Desfont.

oblongo vel sesquipollicion

Caulis herbaceus, tenuis, villosus. Folia petiolata, semipollicaria, remota, cordata,  
acuta, integerrima, aerea, <sup>humida</sup> enervia, villosa. Petioli longitudine <sup>ae</sup> folii. Pe-  
dunculi axillares, solitarii, uniflori, petiolo duplo breviores, ebracteati. Ca-  
lyx pilosus: tubus corollae ovato. Corolla Conv. pentapetalae parum minor,  
quinquefida, glabra

parum acuminata

*Corydalis Ixora*

Habitat in Phleppenis herb. Mas

Rami teretes, glabri, uti reliqua partes, apice compressi. Folia petiolata, spithamea et ultra, elliptica, attenuata, venosa, supra nitida, subtus pallidiora, costa per nervos proferente, integerrima. Petioli unguiculari. Pedunculi terminali terni, compressi, trichotomi, calycis marginis brevis, dentatus. Colla semis pollicari

macrophylla Guora foliis ovatis subsessilibus, floribus fasciculatis

Habitat in Guinea Geed 5

Rami teretes, superne obscure tetragoni, uti reliqua partes glabri. Tolia brevissime petiolata, pithamda, palmam lata, basi subcordata, membranacea, aerea, acuta. Stipula membranacea evanescens; mucrone adpresso inter petiolos. Pedunculi ex apice, prope Terni. Flores brevissime pedicellati. Calyx maris brevissimus. Corolla bipollicaris. Limbus quadrifidus. Stamina quatuor ultra faucem prominentes

ternifolia 4xora foliis ternis lanceolatis subsessilibus. floribus fasciculatis  
Carron. Ic. 4. pag. 3. tab. 305  
Habitat in nova Hispania 4

Spinosa 9x. fructu oppositi foliis ovatis rugosis, pedunculis trifloris axillari-  
bus. Ca. Martii 7. E. p. 203.  
Chomelia Jacq.  
Habitat in America 5

no vid.

montana Ixora foliis hastato oblongis basi cordatis, flore fastigiato Lour. fl.  
Cochinch. pag. 26.

Habitat in montosis Cochinchinae  
Caulis fruticosus erectus, ramosus, 4 pedali. folia lanceolata ex tropici  
latiora obtusa, integerrima, glabra, opposita subsessile. Flores  
coccinei varminati  
an varietas coccinea

novemnerva ~~Frax~~ foliis nervosis apertis, caule scandente, cymis terminalibus  
libus. Cass. fl. Cortic. pag 76.

Habitat in Cortincheria &

Frutex magnus, scandens, ramosis. Folia ovato-lanceolata cetero  
nna pubescentia, & nervis opposita flores albi. Corolla tubus  
longispinus. Stamina supra faucem. Stigma ovatum bifidum  
Balis & locularis laculis spermi

non vid.

rolacea — *Grass* foliis nervosis pilosis, floribus aut illantibus Loursens  
fl. Cochinch. pag 76.

Habitat in Cochinchina &

Indet magnis scandens, ramosis. Folia lanceolata, & nervis  
intermedia, subsessili. Flores rolacei. Semina aspera

*Lycopis atellantus*

non vid.

Chinensis. Flos foliis ovatis utraque acutis petiolatis, floribus fasciculatis  
laciniis corollae obovatis La Mart. J. E. p. 285.

Rumph. 4. V. 47.

Habitat in China Java &

conine foliis ovatis basi cordatis subamplexicaulis floribus  
fasciculatis laciniis corollae lanceolatis La Mart. p. 284  
tab 66-fig. 1. videtur esse eadem cum p

angustifolia Gt. foliis anguste lanceolatis, cyma composita pedunculata Ver  
minali La Mart. T. E. p. 205.

Pavetta Burm. fl. ind. T. 13. fig 3.

Habitat in Andiat

non vid.

Cunicolata G. Don foliis sublanicollatis basi angustatis floribus fasciculatis  
laciniis corollae laciniatis La Mart. F. E. p. 205  
Habitat in India orientali }

non vidi

codata ~~flora~~ foliis ovato lanceolatis basi cordatis; cymis paniculatis; tubo limbo  
breviore

~~flora~~ parviflora Ca. Mart. T. En. reg. 205. tab 66 fig. 2.

Habitata India Insula Francisco

nun. vid.

alternifolia L. foliis alternis Jacq. Am.

Asminum aliud aborefiens, foliis folani minus Plum. De: 157. fig. 1

Habitat in martinica sylvis 5

Arbustula erecta, 12 pedalis. Folia ovato-lanceolata, acuta, integerrime nitida, petiolata. Pedunculi axillares multiflori. Calyx minimeus 4-dentatus inferus. Tubus corollae longissimus. Limbi lacini <sup>4-5</sup> 4-fido lineari-lanceolato obtuso. Stamina 4 non raro 5 superne in tubo stigma capitatum. Bacca ovato-oblonga subbilocularis semina 4 ad decem.

an hujus generis?

non  
sidi

~~Tomentosa @ foliis <sup>pub</sup> integerrimis lanatis Lin. Mart 331.~~

S. V. poj. 153

~~2 Tomex tomentosa Lin. fl. zeyl. 594~~

~~1 Arbor Malabarica flla dicta Burm, zeyl. 26.~~

~~Habitat in India Orientali~~

~~Rami petioli folia subtus pedunculati & calyces tomento, densissimo  
vesti. Folia supra rugosa etate nuda <sup>at enim semper tomentosa</sup> juniora utroque tomentosa  
robustior quam reliqui. Variat foliis latioribus brevioribus  
integerrimis vel denticulatis et foliis parum angustiori-  
bus longioribus crenatis. Pannicula dichotoma ramis divarica-  
ti~~

Coccinea G. foliis ovalibus semiamplexicaulibus, floribus fasciculatis Pl. reyl. 22

S. V. p. 152 x

Schedi Rhed. Mal. 2. p. 17. t. 13.

Jasminum indicum, Laurifolium, undorum umbellatum, floribus  
coccineis Pluk. alm. 146. t. 59. fig. 2.

Arbor indica, Lauri amplioribus foliis obtusis Pluk. mant. 26. t. 364. fig. 1.

Jasminum flore vestra petalo, Flora Linnei, Schedi Horti Malabarici  
p. 125. t. 57.

Habitat in India

Rami glabri superne alternatim compressi. Folia sessilia oblonga lan-  
ceolata glabra basi tripollicaria venosa, penim acuminata supra  
nerviis <sup>foliis obtusis</sup> stipula <sup>tripollicaria</sup> subovata breves cum acumine subulato angus-  
to stipula ipsa duplo longior Comibus <sup>interdum, obtusa</sup> terminalibus compositis. Calyx  
glaber parvus laciniis minutis lanceolatis. Tubus corollae fere bipolli-  
cariis filiformis. laciniis limbi lanceolato acuto interdum oblon-  
go apice rotundato. bracteis <sup>floribus</sup> minuto subulato ad basin florum  
<sup>fasciculatis</sup>

sessilibus lanceolatis oblongis corymbis terminalibus fasci-  
gratis

americana *Acacia foliis ternis canaliculata ovatis, floribus thyrsoides* in Am. Acad.  
S. p. 393. & L. V. p. 153.

*Parvella foliis oblongo ovatis oppositis, stipulis setaceis* Browniam.  
142 t. 6. fig. 2.

Habitat in America h.

arbor. Folia longe petiolata, glabra integerrima. Stipulae singulis petio-  
lis interjecta. Semen anillo involutum. Corolla tubus et limbus multo  
brevis quam in reliquis hinc

~~Folia opposita habet Brown. lamina limbi canaliculata attenuata, pediculis  
subterminales terni in flori~~

alba f. foliis lanceolato ovatis, floribus fasciculatis L.V. pag  
Bamphetti Rheed. Mal. 2. p. 14. tab. 14.

Gasminum indicum, laurifolium, inodorum umbellatum, floribus al-  
bicantibus ad Schetti album Plukn. alm. 196. t. 109. fig. 2.

Habitat in Andra

Rami teretes glabri superne compressi sculi cortice fusco. Folia petiola-  
ta opposita, saepe spithamea lanceolato elliptica utraque acuta  
glabra venosa nervosa supra nitida. Petiolum bipollicari <sup>sub</sup>quadrato  
ramam ambientes utraque inflexam acuminata. <sup>sub</sup>umbellati  
li decempositi <sup>sub</sup>umbellati ut in procedente fasciculati. Tubus  
corollae bipollicari laciniis limbi oblongo. Calyx 16 fere integer  
bractea subulata decidua ad basin florum

petiolati  
lanceolato elliptica, fasciculati, terminalibus  
fasciculati fasciculati

12 parviflora Astora foliis subsessilibus Canciolato oblongis, panicula terminali. Tab. 11.

Habitat in India orientali

Rami inferne <sup>pressi</sup> teretes, glabri, articulati, inferne <sup>oppositi</sup> teretes, superne com-

folia brevissima petiolata, tri- <sup>supra nuda</sup> f. tri polliciana, glaberrima, venosa, integerrima acuta

Stipula utrinque brevis, subtruncata, acuminata.

Panicula terminalis, palmata, bracteata. Pedunculi parciales <sup>oppositi</sup>, remoti, folium parvum ad basin noduli, tripartiti; rami <sup>denum tripartiti</sup> pedicelli ultimi fasciculati. Flores coccinei.

Calyx minutus, quadridentatus: dentibus obtusis

Corolla infundibuliformis, unguiculata. Tubus filiformis, pro-  
apice parum crassior. Limbus quadrifidus: laciniis lanceatis,  
obtusis.

Ramina corolla parum longiora.

Stylus longitudine tubi corollae, ad lantem pilis rariis adspersus.

Stigma emarginatum.

(Affinis A. coccinea differt vero floribus quadruplo minoribus; stylis <sup>conspicuis</sup> ~~conspicuis~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>conspicuis</sup> ~~conspicuis~~ <sup>di</sup> ~~di~~ <sup>longatis</sup> ~~longatis~~ <sup>dispositis</sup> ~~dispositis~~ <sup>recte</sup> ~~recte~~

Folia in terra caerulea sessilia nus sessilia nec amplexicaulia, variat lacini  
nisi corollis subovatis obtusis et lanceolatis acutis

multiflora 4: foliis lanceolato-ovatis fasciculatis pedunculis aggregatis unifloris brevissimis, bacis monospermis Sw. prodr. pag. 30.

Habitat in Jamaica 5

an Potius Guett.

*Saxifraga fasciculata* L. Folio ovato-elliptico, ramulorum subfasciculatis  
pedunculis filiformibus subtrifloris Sw. prodr. p. 30.  
Habitat in Jamaica