

# Tatropka

1. gossypifolia L. foliis trif. quinquepartitis: lobis ciliatis petioliisque setis ramosis glandulosis
2. glauca L. foliis qu. trif. quinquefidis serrato dentatis, petioli nudis stipulis palmatis
3. spinosa L. foliis trif. partitis, lobis sursum angulatis integerrimis, caule fruticoso aculeato
4. glandulosa L. foliis quinquelobis villosis: lobis denticulato glandulosis, caule fruticoso extripulato
5. variegata L. foliis lanceolatis integerrimis
6. moluccana L. foliis ovatis integerrimis subdentatis
7. dwanicata L. foliis ovatis acuminatis integris glaberrimis, radice dwanicata
8. Curat L. foliis cordatis angulatis
9. multifida L. foliis multipartitis lobibus, stipulis setaceis multifidis
10. maritima L. foliis palmatis: lobis lanceolatis integerrimis lobibus
11. Tanipha L. foliis palmatis: lobis integerrimis: intermediis sine lobatis.
12. urens L. foliis palmatis dentatis aculeatis

13. herbaea f. aculeata foliis trilobis: caule herbaeo

~~14. elaphia f. foliis ternatis ellipticis integerrimis subtus canis longi petiolatis~~

*Fatouha persiana* in herb. Mus. vidi florescentia parum diversa a Rost. et Revall.

Gastropoda?

*Strobilata* ad in *Gripula* *fronci* *Commerf.* *herb. Musc.*

affinis *Prunio* *specioso* *Burm.* *ind. tab. 63. fig. 2.*

folia petiolata, 5 que partita: lobi pennati pidi; laciniis lanceolatis bipollicia  
ribus extrorsum decrescentibus, profunde et grosse serratis, glabra, subtus ad  
nervos setis parvis urentibus adpressa, uti petioli superne. Glandula  
nullo flos. non vidi

partata *Gatropha folis ovatis peltatis integris glabris*

Habitat in Puerto Rico hort. Parf. 5

globa, Caulis fruticosus, erectus, cortice cinereo. Folii bipollicaria, <sup>integra, 2-3 lobata</sup> squamata, <sup>semissi-</sup>  
ma venosa, <sup>acuta</sup> integerrima. Venella nitida. Pedunculi laterales, subramosi pedicelli 3 flori, <sup>fil-</sup>  
intermediis scissili. Corolla <sup>alba</sup> sphaerica, campanulata, laciniis ovatis, acuta-filamentis 10.  
5que brevior

acuminata *Tropaeolum* foliis lanceolatis extropium dilatatis acuminatis

Habitat herb. Gusf.

Rami teretes, inferne glabri, superne villosi. Folia petiolata, frassa, bipollicaria  
obtusata, apice in acumine <sup>semi</sup> pollicari producta, acuta, integerrima, glabra  
venosa. Stipula minuta ad latus petioli. Pedunculi axillares, folio duplo lon-  
giores, parciales alterni, pedicelli racemosi. Bracteae subulatae, unguis in  
Cares.

*narsifolia* *Tatroptha* foliis quinque partitis, laciniis dentatis inciso-pinnatifidis

*Tatroptha narsifolia* La Mart

Habitat hort. Panif. herb. Augf.

Caulis teres, glaber. Folia petiolata, alterna, quinque pollicaria, profunde quinquefida: laciniis lateralibus bifidis, irregulariter subpinnatifide et inaequaliter dentato-inciso; lobis attenuatis, glabris, fetis raris in nervis utriusque et in petiolo et pedunculo. Glandulae duae supra ad insertionem petioli. Pedunculus elongatus, foliis longior, apice primum trifidus, dein dichotomus.

punicea *Adropsha* foliis indivisi orato-oblongis acuminatis basi bidentatis.

Habitat in Domingo herb. Lo Revellere Ca Peaux. 5

Caulis fruticosus, erectus. Rami teretes, glabri, filiperne pubescentes. Folia petio-  
lata, alterna, distantia, tripollicaria, basi subcordata, venosa, venae supra  
exstantes, utrinque glabra, acuminata, acuta, integerrima, basi versus petio-  
lum utrinque denticulo glanduloso. Petioli foliis breviores. Pedunculi axillares, pe-  
tulo duplo longiores, apice ramis quatuor umbellatis cum flore solitario sessili  
in centro. Pedunculi bis vel ter trifidi, pubescentes. Bractea linearis-lanceo-  
lata. Calycis laciniis ovata, obtusa, glabra. Flores unguiculares, punicea.  
Petalala oblonga emarginata, basi acuta. Capsula magnitudine nucis  
Coryli

*Manihot minima Chamodryfolia Plum.*

Habitat in America Herb. Thonini.

Caulis spithameus, statim a basi ramosus: rami ascendentes, feli for ones.  
Folia unguiculata

habes



*Gossypifolia* 7 foliis 5 n. f. quinque partitis lobis ciliatis petiolisque fectis ramosis  
glandulosis <sup>symb. bot. 1. p. 70.</sup>  
*Ricinus americanus*, foliis *Staphisagria* Bauh. Pin 432: 510

*Ricinus americanus* perennis, floribus purpureis, *Staphisagria* foliis  
4 Con. hort. 1. p. 17. Tab. y. Merlan. Junn. 20. Tab. 30.  
*Ricinus minor*, *Staphisagria* folio, flore pentopetalo purpureo Sloan.  
<sup>hist. 1. p. 179. t. 9. p. 34.</sup>

*Tatropa gossypifolia* foliis quinque partitis: lobis ovatis integris: fectis  
glandulosis ramosis Lin. Spei. p. p. 1170. Jacq. Coll. 1. p. 154

7 *Ricinus indicus vilosus* *Unifidus* f. quinque fectus, foliis *Atropur*  
patis Pluk. phyt. 56. fig. 2.

Habitat in America meridionali 7 2

Stipulis ciliis que petiolorum multipartitis apice glandulosis  
foliis <sup>non</sup> f. quinque lobis ovatis glabris acuminatis  
ciliatis ciliis glandulosis uti bracteo et calyce. Bracteo  
et calyce lanceolato acuminato. Nectarium glandula  
parva s. receptaculo inserto stamina 10. Styl. tres

Gossypifolia <sup>Gatropha</sup> foliis quinquepartitis: lobis ~~ovatis~~ <sup>oblongis</sup> ciliatis glandulosis, petiolis quibus  
fatis ramosis glandulosis.

Gatropha gossypifolia: lobis ovatis integris: fatis glandulosis ramosis

Lin. S. V. par. 865.

~~Sentia ramosa~~ venosa tenera

Bolia foete triloba: lobis ovatis cum acumine, ciliatis, ciliis glandulosis

glaucis Tatropha calyculata, foliis <sup>fidis</sup> trif. quinquelatis trifidisque serrato dentatis, petioli  
nucis, stipulis palmatis lacinis setaceis glandulosis mollebus, pinnulis dentato  
Ricinus nuda eripatanus, flore purpureo, trilobato folio, motibus dentatis et ornato

Pluk. alm. 320 tab. 220. fig. 1. in fide Horti sicci.

Croton lobatum offic. Desf. pag. 162.

Habitat in Arabia et India Orientali.

Caulis herbaceus, erectus, pedalis, pubescens.

Folia petiolata, glab. trif. sive quinq. fidia, basi cuneiformia, glabra, glauca  
subserena, subtus nervosa villosa et lacinis oblongo, acuminato, serrato-  
dentato; dentibus acutis, inaequalibus, apice subglandulosis.

79

Petiolus absque pili glandulosis, subvillosus, pollicaris, foliis longior  
Stipula utrinque solitaria in 4 vel 5 setis divisa; setae inaequales, apice  
glanduloso, simpliciter, rarius ramosa.

Peduncululi versus apicem, oppositi folii, tri-pollicares, elongati, altitudine  
caulis.

Flores comp.; Compositae dichotomae; fl. <sup>res</sup> femineae in dichotomia, <sup>breve</sup> pedicel

Cate. lanceolato-subulato.

Petalos <sup>peripetalo</sup> pentaphylli: laciniis foliolis lanceolatis, ciliatis.

Corolla feminea pentapetala: petalis longitudine calycis, ovatis

Filamenta alterna breviora. Anthera 8.

Germen triquetrum. Stylus 1. Stymata tria.

Capfela trilocca, magnitudine fere nuda asellano, mucata

Semen magnitudinis pisi, figura seminis Ricini

( a 9: Gofypifolia abique ullo negotio dignofitur primo intuitu colore glauco.

Differt proterea, foliis basi productis non vero transverfis. 2) lobis oblongis acutis  
tis nec ut in gof: ovatis ciliato-glandulosis 3) petiolois nudis absque pilis rufis  
glandulosis.

Spinosa Patropha calyculata, aculeata, foliis tripartitis lobis sursum angulatis integerrimis  
caule fruticoso aculeato  
Croton spinosum, foliis tri sive quinque lobis integris, glabris, stipulis spinosis Boiss  
deser. pag. 169

Ramiteretes, glabri cortice purpurascente rugoso, supernis glaucis  
Folia petiolata, alterna, glaberrima semipollicaria, tripartita. lobi oblongi  
obtusissimi superne dilatati utrinque lobulo angulati: laterales minores, an-  
gustiores, basi interdum latere exteriori lobulo acutis

Petiolus foliis parum brevior, teres.

Aculei utrinque solitarii ad basin petioli loco stipularum, cortice eorum  
teres, subulati, petiolo breviores.

Corymbi dichotomi. Stylus foemineus in dichotomia sessilis

Calyx pentaphyllus.

Corolla pentapetalala

2. *Spinosa* *Gatropha* caespitulata, aculeata, foliis ~~int~~ lobatis: lobis angulatis integerrimis, caule fruticoso  
*Croton spinosum*, foliis 3-5 lobis integris, glabris, stipulis spinosis & ortho-  
deser. pag. 163.

3. <sup>glandulosa</sup>  
~~Malloja~~ Gastrophe calyci lata, foliis quinquelobis villosis; lobis denticulatis glandu-  
lofis caule glanduloso et stipulato.

Croton villosus; foliis palmatis quinquelobis, glandulose serratis costis.  
destr. pag. 163.

Erutea ramifera, cortice rugoso, villosa.

Dolia petiolata, alterna, reniformia, villosa, mollia, <sup>sub</sup>viridia, quinqueloba:  
lobi rotundati; inaequaliter denticulati, glandulosi; glandulis fuscis  
Petiolus longitudine folii, villosus patens.  
Glandulae plurimae ad latera petioli et in axillis

variegata Fraxinea calyculata, foliis lanceolatis integerrimis. Tab. X X1.

Proton variegatum Hoffm. Desf. p. 163

Frutex + Hamister etc. <sup>hinc</sup> in fere cortice fusco rimoso, superne glauco

Costa subpetiolata, alterna, lanceolata, integerrima, obtusa, mucrone rigido  
terminata, glaberrima, pagina superiori interdum picta, bipollicaria.

Stipula utrinque bina ad latera petioli, callo insidentes, subulata, rigida,  
petiolo saepe longioribus, divaricatis, persistentes, inferiores solitariis aculeifor-

mes  
Compti axillares, foliis breviores.

Bractea lanceolata, carinata.

Calyx quinquepartitus; laciniis oblongis

Corolla petala: petalis oblongis

Anthera 8.

Capsula glabra, oblonga.

variat foliis latioribus et angustioribus

a Prot. variegato diversa est, <sup>cui</sup> flores picti, stipula nulla.

Atque omnes a genere Protoneis alieno sunt quamvis flores calyce instructur, quod  
quod enim Protoneis vidi gaudent floribus pictis vel raris emisso



moleccana 7 foliis ovatis integerrimis subdentatis L. Fl. Zeyl. 3407  
nux moleccana, folio infra Rivini, semine regio Herm. Zeyl.

<sup>34</sup>  
Habitat in Moleccis, Zeylona 7

Folia ovata acuta vix dentatulo uno alderove Paei Herman  
dia supra <sup>sub</sup> mollea, basi supra ad insertionem petioli glandula  
fusca seu bipartita vili minuti vix oculo nudo discernenda  
Petioli folio duplo longior. Cyma multiflora calycibus  
tomentosis. Stamina numerosa

divaricata Gr. foliis ovatis acuminatis integris glaberrimis racemis divaricatis  
Sw. prodr. pag. 90.  
Habitat in Jamaica

non vidi.

curias 4 foliis cordatis angulatis Lin S. V. 865 Jacq. hort. v. 3. t. 63

Picinus americanus major, semine nigro Bauh. Pin. 432.

mundabignacu Mart. bot. 47.

Picinus ficius folio, flore pentapetalo viridi, fructu tera pendulo Sloan  
herb.

Tatropa aspergens, ficius folio, flore herbaico Brown. jam. 348.

Habitat in America calidioribus

Stamina 10.

Rami glabri, glauci virentes. folia petiolata alterna, tri: qua-  
drupollicaria, glabra subtus pallida tri: vel quinquangulata  
venosa ~~angulata~~ acutis integerrimis. <sup>Pachylobis</sup> ~~Comptis~~ parum infra  
apicem. Pedunculis alternis. Flores congesti. Calycis foliola 5:  
oblonga corolla brevioribus. Corolla pentapetala, ~~oblonga~~ <sup>comptitudine</sup>  
gigi. Nectarium glandulosum ad basin filamenti. Stamina filamen-  
ta 5 distincta, 5 connata.

Corolla

non specimen ex India orientali potius speciei Sereculis  
conferatur Plant. corom.

Descriptio Jacq. hort. Vindob. mutanda

multifida 7 foliis multipartitis lobatis, stipulis setaceis multifidis Lin. L. V.

Awellana purgatnx Bark. pen. 410.

Puccinoides americanus, tenuiter diviso folio Breyer. Cent. 116. t. 53. Monf. bot. 3. p. 340. f. 10. Tab. 3. fig. ult.

Manihot folio tenuiter diviso Dill. elth. 217. Tab. 173. fig. 213.

Habitat in America meridionali

Caulis crassitie pollicis circumscribitur, adpressus stipulis multifidis, cat. eralibus, setaceis, unguiculatis, subramosis. Folia 7. vel 10. partita laciniis lanceolatis pennatis fidis pennis inaequalibus suboppositis seta terminatis integerrimis subtus glaucis glabris. Pedunculus erectus terminalis longitudine foliorum, glaber. Flores cymosi. Bractea ad basin pedicellorum acerosa. Laciniis calycis rotundato

manihot 4 foliis palmatis: lobis lanceolatis integerrimis lobis hinc 5. V.

ray.

Arbor fuit venenata, radice osculenta Bauh. Pin. 512.

Manihot inodorum f. Yuca foliis cannabinis Bauh. Pin. 90. Pluk  
alm. 241. Tab. 205. fig. 1.

Manihot theveti f. Yulla et Casvari Bauh. hist. 2. p. 794. Mer. sur.

4. fig. 4. 5.

Prunus minor, viticis obtuso folio, caule verrucoso flore pentapeta-  
lo albedo, ex cupis radice tuberosa, fuit venenata fuzgi-  
do, americani panem conficiunt Sloan hist. 1. p. 130. Tab. 85.

Habitat in America Australi

Stamina 10.

Caulis et rami glabri teretes. <sup>alterna</sup> Folia petiolata tri vel spax.  
ita: lobi lanceolati attenuati palmari f. glaberrimi  
subtus glaci, obscure venosi. petioli longitudine loborum. Raie  
mi axillares longitudine lobum petiolorum floris formam inferis  
res.

*Tanipha* foliis palmatis: lobis integerrimis: intermediis sine lobatis Mant  
1726. p. v. pag. 065

*Tanipha guineensis* Loef. d. 309.

*Gatropha carthagenensis* Jacq. Alm. 256. t. 162. <sup>1</sup>Bot. Vol. 3. Tab. 17

Habitat in America calidioribus

Facies *Gatropha* manihot <sup>1</sup>sepe fere pedalis. Folia quinqueloba  
oblonga acuminata, in medio utroque sine profundo extenoni  
bus sepe integri

non vidi

in flore seorsum secundum figuram Jacq. d. 309

urens 4 foliis palmatis dentatis aculeatis Lin. I. V. 865. Jacq. hort. Tab. 21 <sup>1-p. 8</sup>

*Ricinus thymaloides americanus* Catesbeus et urens floribus albis

Com. mel. hort. 1. p. 19. tab. 10

*Ricinus Catesbeus*, fici foliis: spinulis mordacis armatis Plut.  
alm. 326. Tab. 220. fig. 3.

Habitat in Brasilia

~~Truncus~~ quadripedalis, crassitie saepe pollicis vel ultra, ad per  
sus uti petioli pedunculique foliisque subtus aculeis albis su  
bilatis rectis et reflexis urentis <sup>spinatis</sup>. Folio basi cordata femi  
-inloba interdum <sup>saepe</sup> partita, acuta <sup>dentata</sup> saepe subpinnati  
fid a <sup>supra</sup> glabra basi ad insertiorem pedunculi glandu  
la magna. Flores cymosi. Calycis pulverulento tomentosi  
glauco.

herbacea & aculeata foliis trilobis: caule herbaceo L.V. pag.

Gusjevia frutescens frinosissima usens, foliis digitatis et laciniatis  
Hort. Amm. herb. 256

Habitat in vera Persia & herb. Gusj.

Folia 5-7 lobis, lobi oblongi remotissime dentibus fiticis & nervis  
est currentibus ultra folii marginem. Glandulae duae ad insertionem  
petioli



globosa f. capsulis globosis Vetruciois Gortn. de Sem. Cen. 7. 7. 109. 173

michi ignota

~~Thaja~~