

# Fuglans

1. regia 4. folioli ovalibus glabris subserratis subaequalibus
2. alba 4. folioli septenis lanceolatis serratis: impari sessili
3. nigra 4. folioli quindenis lanceolatis ovato-lanceolatis: exterioribus minoribus, geminis supra axillaribus
4. cinerea 4. folioli undenis lanceolatis basi altera breviora
5. oliviformis 4. folioli tredecim ovato-lanceolatis attenuatis subtus villosi interioribus minoribus
6. angustifolia 4. folioli tredecim lineari-lanceolatis serratis sessilibus basi aequalibus nervibus ellipticis
7. bicolorata 4. folioli ternis

inifsa Fuzlan

Nux puzlan folio laciniatis Persicula. Guss. K. 41. 5. P.

Habitat. heb. Guss.

folia vernata <sup>Lobelia</sup> jezuzayne inifsa, pennata <sup>ida</sup>, pennata vel vane inifsa.

Guylani

Habitat Herb. Desfont.

Loliola 9, 6 vel 7 pollicaria, interiora minor, Terminale petiolatum, reli-  
qua sessilia, lanceolata-elliptica, remote serrata, serraturis mucrone fuso  
terminatis, attenuata, utrinque glabra, costa subtus villosa. Petiolipii  
breviter.

Austriani

Habitat herb. Desfont.

Foliola 17. Tripolliciana, extensa minor, ovato-lanceolata, sessilia,  
hermenale petiolatum, attenuata, ut in variis speciebus altero latere obli-  
qua, subtus villosa, supra glabra.

Gugloni

Habitat herb. Desfont.

Folia 7na. Coleola omnia sessilia, 5 pollicaria, interiora minus, ovato-lanceolata, subtus petiolisque tomentosa, serrata, attenuata. Amenta 4o mentosa, pedunculata, 3-4 pollicaria

*Fraxini folia* *Fraxinus*

Habitat in America boreali

Rami teretes, glabri, purpurei. Folia quondena: <sup>exteriora minora</sup> foliola tripolluciana, opposita vel alterna, sessilia, terminale petiolatum, subovato-lanceolato, serrata, attenuata, axillis nervorum subtus tomentosi, ceterum glabra.

*Triglochin Lololus quinis lanicolatus ferratis lateralibus sesquialteris terminalibus  
caudum utroque attenuatis*

*Habitat herb. Desfont.*

*Tolcola ferrata, ferratensis in junonibus Tamentopi. Pedunculi in summitate,  
cauti trifidi. Amenta pedicellata, bi pollinaria, Bractea subulata.*

alba 4 foliis septenis lanceolatis serratis: impari sessili Lin. t. V.

Nux juglans virginiana alba minor, fructu nucis moschato simili: Corti  
et glabri summo fastigio velut in aculeum producto Pluk. alm. 254. Tab.  
309. fig. 2.

Nux juglans alba virginiana Catesb. carol. 1. p. 30. Tab. 30

Habitat in Virginia

Foliola saepe quana, impari brevissime petiolata

Rami teretes, glabri, cortice fusco. Foliola sessilia, ovata, uti petioli:  
utroque glabri. Petioli juniori villosi-tomentosi Less. Desf.

regia 9. foliis ovalibus glabris subserratis subaequalibus len. S. V.  
Nux juglans Dod pempt. 216.

Nux juglans f. regia vulgaris Bauh. pin. 417.

β. Nux juglans fructu maximo Bauh. pin. 417.

γ. Nux juglans fructu tenero et fragili putamina Bauh. pin. 417.

δ. Nux juglans bifera Bauh. pin. 417.

ε. Nux juglans fructu serotino Bauh. pin. 417.

Habitat in Persia &

serotina.  
folia quadrifida: foliola integerrima, interna et externa minima, axillis  
nervorum tomentosa herb. Guss.

# in herbano ~~est~~ dispersa

Glabra *A. foliolis cuneiformibus serratis: extenontibus majoribus*  
Du Roi Habesch-Baumf. 1. p. 335

*filiata* G.

Weden. Berl. Baum. p. 154

Habitat in America boreali

~~ruad~~

nigra 7 foliis quinqueis lanceolatis: anterioribus minoribus, geminis <sup>nulis</sup> superioribus  
latibus den. Spec 1415 + R.V. Taiqu. m. f. 2. p. 3.  
Rex virginiana nigra Heron Lugdb. 452. & 453. Cat. Ess. Carol. 1. p.  
67. t. 67.

Habitat in Virginia, Maryland &  
Gemmula s. glandula supra alam folii, nec ex ipsa ala.

Rami circuncati cortice inaequali superne vellis nigricantibus  
subtomentosi. Folia apices ramorum albescunt. Folia sessilia  
pernata <sup>pernata</sup> <sup>pernata</sup> <sup>pernata</sup> ovata lanceolata intima et externa minora  
opposita basi versus integerrima, serrata acumine brevi termina  
ta altero latere sursum extrorsum basi obliqua denella  
utroque tomentosa imo state fere glabra percoli  
tomentosi amenta infrafoleacea

ovato-lanceolatis

*cinerea* 7 foliolis undecim lanceolatis basi altera brevior Lin. Spec. pl. pag.  
1415. \* S.V. Jacq. mufel. 2. p. 4.

Habitat in America septentrionali  
Folia ex undecim foliolis, venellis etiam supra nudis, basi foliorum  
brevior extenore et quasi carpiosa.

Guylani oblonga Ou Poir

Oleofolium *f. foliis* & *redicim* ovato *concoloratis* attenuatis *subtus* villosis

<sup>intima</sup> *minora*  
Habitat in America septentrionali

Rami glabri, petioli uti nervi et vena *subtus* villosi. Stipulae  
oppositae brevissime petiolatae, terminale longius *exteriora*  
sensim longiora & vel quadrupollicaria *inequaliter serrata*  
altero latere *latiora* *exteriorum* basi obliqua

*angustifolia*. 7 foliolo tridecim linear-lanceolato serratis scapulis basi  
aequalibus, nervibus ellipticis Hort. Kew. 3. p. 367.  
Habitat in America septentrionali.

Pecan. *S. Solis subquini canicolatis simulati* seplibus utraque Cortis  
Walt. fl. Car. pag. 236  
Habitat in Carolina

non vidi.

baicata *F. foliolis* Verni Lin. l. V. pag. 859.

Habitat.

non vidi

Campanum Juglans folus obovatis repandis petalis longis racemis Terminalibus.

Lour. pl. Coch. pag. 573

Campanum Rumph. amb. lib. 3. c. 12. t. 50. ?

Habitata Cochinchina.

Arbor magna. Folia basi cordata vix glabra, magna parte mascul.  
et foem. in eodem racemo. Calyx irregulariter dehiscentis sepe ~~fidus~~  
Cor. petala 5. oblonga. filamenta 10. g. styli 2. bifidi. stigmatibus simplicibus  
Intra ovulis nuce ovula heliata

an speciei Terminalis uti ab Lour. profano est pro character cum juglans  
se non convenit