

Tuncus

Comptes Rendus de l'Académie.

repens
fasciculata

Junci
Schoenus

† Schoenus fasciculatus; angustiuscule planifolius: fasciculis lateralibus
Juncus repens; terminalique brevi bracteato: spiculis planiusculis, oblongis, glabris,
culmis repentibus, squamis mucronatis: setulis pamine laevi duplo longioribus, sursum
foliosis: foliis
planis, angustis
gramineis: capitulis
Habitat in Carolina Richard & Georgia Richard 24
lis paucis gemis, Radices betaceae Pulmurepentis, ad nodos ^{us} emittens duos vel tres
sespili tres pedun
culatisque, pauci
floris: calycibus
viridulis, pubulatis

alios, foliosos, floriferos, palmares
Radices betaceae. Pulmus repens ad nodos foliosos, et culmi duo tres
bi- tri
articulati.
Solia inferna duo tria, bipollicaria, linearia, plana, laxa. Capitula
in umbella biradiata
axillaria, solitaria, interdum tria terminalia, intermedio ^{floris} sespili,

† Pedunculata
absque involu
cro

subturbinata a spicis superne parum divergentibus. Spicae
quinque - ses, sessiles, Calycis glumae lineares attenuatae ^{unguiculari} pubulatae
Capsulae apice patulis. Capsulae lineari, teres, longitudine
fere glumarum.

Dactyloidesi. Culmo triquetro, capitulis ~~fructuatis~~ subracemosis ovatis squamis
acutis

Habitatur cap. 6. spec.

Culmo triquetris Dactyli glomerato. Culmus glaber superne triquetrus
Spicula aggregata in capitula ovata brevi pedunculata gemi-
na a pedicello vagina ^{sub pedicello} altera brevior pedunculata, magni-
tudine necnon longi ^{terminata} vagina tubulosa brevis ^{terminata} ~~terminata~~ canico-
lato longitudine capituli ~~terminata~~ Spicula canico-
lato squamis caniculata acuta pallide vix luteo litum ferri
ginea

glomeratus. Culmo triquetro folioso, capitulis paniculatis glumis ciliatis
Thunb. pedr. fl. cap. pag. 17

Thunb. in Cullen
Lupulinae Bernh. sp.

15 proli fera Tuncis folus nodos articulatis umbellis ^{deior} profifens floribus capitatis

Habitat in cap bono frei

similis 4. Articulato ad Culmo sesquipedali; umbellis pedunculis trich
tomi, Involucra polyphylla ovato-lanceolata flores capitati

29

uno cum reliquis novis de finberda Altenus

Comes foni

Cepellaris Hucus

Habitat ad fretum Hudsonis herb. Mus.

Caulis plures, digitales et ultra

Castaneus Junius folus planis amplexicaulis; capitulo terminali subze-
meno multifloro basi foliato, bracteis acutis Smith. fl. brit. pag. 303.
Radix repens. Culmi erecti, spithamei vel ped. alti. Vertices, foliosi
folia omnia caulina, alterna, erecta, vaginanda, supremum capi-
tulis subjectum, reliquis brevius. Capitula terminalia, erecta, unum
super alterum, aliquando solitaria, atro fusca nitida, saepius quadri-
flora, subinde 6-flora, rarius 11-flora. Bractes solitane sub singulis
flores, a calyce parum remotae, lineari-lanceolatae, acutae, fuscae
Calycis foliola lanceolata, acuta, dorso trinervi. Stamina 6. Capsula
elliptica oblonga, obtusa, apice nigra, mucronulata, calyce duplo
longiori. Semina utraque appendiculata Smith. l. c.

Junius Jacquai Lym. Syn. 07

habitat in paludosis alpinis Scotiae, glaucum aces

Tenaxia Functor

copiose in humidis turfosis circa Oloburg Stolpato.

Culmi plures erecti, pollicares, digitales vel parum ultra, simpliciter summi
vel superne semel vel bis dichotome divisi, foliosi filiformes, teretes.
Folia spatulata pollicaria vel breviora subtertia, glabra 2-3 in culmo
vagine longitudine folii margine membranacea, alba, folium infra
cujus apicem obtusum folium insertur. Flores septem in dichotomia
ad latera ramorum unius: et unicus terminali. Squama ~~duo~~³
~~at~~ sub flore ovata obtusiuscula submembranacea, duo 3 diebus ab altero
latere ^{flore} at altero flore breviori. Calycis foliola 6. tria exteriora tan-
toolata acuta longitudine capsula, ~~2~~³ interiora parum latiora.
breviora omnes dorsi videri, margine ~~fusio~~ fusio margine ipso albedo
membranacea. Semen globoso triquetrum

16 niveus *Funicus* foliis planis subpilosus, corymbis foliis brevioribus, floribus fasci-
culatis Lin. - I. V. pag. 741.

Gramen leucanthemum Dalech. hist. lugd. p. 426

Gramen hispidum, angustifolium minus, paniculis albis Bauh. Theatr. p. 106

Funicoides nemorosum, flore niveo, Schenk. p. 320. T. 7. fig. 7.

Funicus planifolius, paniculis umbellatis, petalis interioribus duplo longiori-
bus Hall. bot. n. 1328.

Habitat in alpebus Bohemis, Thobis, Helvetiis, Italia, Mons pelii ⁴⁹⁰ ^{ultima culmina alpeum}

Gramen pedale vel bipedale. Folia et vagina pilosa. Panicula fastigia-
ta convexa pedunculi lateralibus longioribus ad latera extrofum

mutantibus. Bas squama ad basin pedunculorum et pedicellorum lanceo-
lata membranacea subulata. Squama florium proprio ovata. Flores plerum-

In majoribus specie
alt. 1/2 pedale in equali
bus pedunculi capit-
laser

que tres quatuor saepe in capitulo hemisphaerico collecti capitato 3-
vel 4 in fructu pedunculo, ut flores 3 vel quatuor ante florescent con-

minuti, denum majoris quam in reliquis speciebus hujus generis

petalis lanceolatis interioribus parum minoribus ante florescentiam ob-
longo obtusiuscula
Dignoscitur floribus candidis

2^o pilosus *Ancus* foliis planis pilosis corymbi pedunculis ^{umbellatis} bifidis: floribus dichotomis

~~Lesplebus~~
~~gramen hirsutum nemorosum Lobel. Ic. p. 16.~~

✓ *vernalis* *gramen nemorosum hirsutum latifolium majus* Bauh. Pin. 7. Monf. hist. 3.

p. 225. f. p. 1. g. fig. 1.

Ancus foliis planis, hirsutis, floribus umbellatis solitariis retolatis anfractis Hall. h. 1325

Ancus pilosus foliis planis pilosis, corymbis ramosis Lin. l. V. pag. 341.

Flor. Dan. 441.

Habitat in Europa Sylvis

Gramen pedale. Folia radicalia plura, caulina duo inferae pollicaria
omnia plane linearia attenuata latiora quam in rare ad margi
nem pilosa. Pedunculi plures terminales capillares in corymbum
simpliciter vel bifidi: 13 flori quorum intermedius sessilis flori
bus clausis ovalis obtusiusculis

29 *Campestris* *Funcus* *Funcus* foliis planis subpilosis, spicis sessilibus pedunculatisque

Lin. l. V. pag. 341.

Gramen hirsutum in capitulis polysyllis Bauh. Pin. 7. Theatr. 103. Scheuch. gram.

³¹⁰
Gramen exile hirsutum, cyprioides Lobel. Ic. p. 15.

Funcus planifolius, spicis petiolatis nudantibus, pedalis aristatis Wall.
hist. fl. par. no 1330.

B. *Gramen hirsutum, capitulo globozo* Bauh. Theatr. 104.

Funcoides hirsutum capitulo glomerato Scheuch. gram. 312. Monf. h. 3. f. 8.
t. 9. fig. prima.

V *Funcus* foliis planis, culmo paniculato, spicis ovatis fl. Lapp. 127. T. 80
fig. 2

D *Funcus* foliis canaliculatis glabris culmo paniculato, spicis globosis

E *Funcus* foliis planis glabris, spicis teroibus subsessilibus

S ~~*Funcus montanum namosum villo*~~

Gramen hirsutum elatius, panicula juncea compacta Rai. angl. 3. p. 416

h *Funcoides Bohemicum, panicula minore nigricante, Capo supra eundem
erecto ad longius producto* Mich. gen. 42.

Habitat in Europa parvis v. d. E. in alpebus Lapponiis

Gramen Spithameum Radice repente Culmo tereti striato. Folia lineari lanceolata
culmo dimidio breviora sparse pilosa, prosertim ad marginem et ad ad
fauces vagino. ^{geminales} Trico plerumque ^{geminales} trico intermedio sessilibus cum folio
lanceolato longitudine spica ad basin, spicula oblonga et floretibus 5-7 confer
tis. In flori bracteis squamis propriis ovatis hyalinis. Petala supra margine
membranacea hyalina. Styli longiora petalis dimidio longiora. A
capitulis minoribus interdum ^{gemine} terni interdum solitarii floribus, petalis
acuminatis styli non exsertis

32 *Spicatus* *Tuncus* foliis planis, spica racemosa nutante Lin. Fl. Lapp. 1254. 10. fig. 4
Flor. Jan. t. 270.

Tuncus alpinus latifolius, panicula racemosa nutante pendula Tell. p. 91.

Habitat in Alpibus Lapponiis Norvegia. 7

Culmi spithamei vel pedales teretes filiformes foliis uno alterove remotis
infructi. Folia angusta, glabra culmo tenui brevem vaginant
vaginae superne pilosulata. Spicae cylindricae saepe pollicares inter
dum 1-2. infra globose remota stipula infra terminalen, supra bract
foliolum lanceolatum attenuatum infra spicam ciliatum uti bract
tea. Capsula globose acuta longitudine calycis

rostygius hincis foliis setaceis depressifoliis, pedunculis geminis Verminalibus, glumis
solitariis subbifloris Lin. Spec. pl. rey. 467* P.V. p. 341.

Habitat in locis paludibus copiosis, sylvaticis profundis &

Culmi struthamoi. Folia lineari-subulata altitudine culmi, erecta
depressa, loria tria a ad radicem. β . in medio culmi & Culmum
instar struthamoi. Flosculi gemini sespites, gluma longiores.
Petala exteriora angustiora, acutiora, concava, exteriora purpurascen-
tia, interiora pallida. Germen majusculum. Stylus albus sty-
mata reflexa Lin.

capitatus Juncus foliis tereti setaceo capitulo laterali

Habitat in Sania Germania O

Gramen digitale. Stolonum unicum inferne. Capitulum 6 florum versus apicem involucrio subulato semineguiculare erectum capitulo dimidio longior

Juncus gracilis culmo filiformi simplicisimo, foliis filiformibus semicylindricis canaliculatis, capitulo terminali pentaphyllo Roth. fl. Germ. 1. p. 155.

^{capitatus}
Juncus Vogel. obj. p. 28. fig 5

mutabilis La Murex herb. Jusj. et La Murex

17. *brachyotum junceus* Culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus solitariis sessilibus Lin
S.V. p. 341

Holosteum Lobel. Ic. 100.

Gramen nemorosum, calyculis paleaceis Bauh. Pin. 7. Theatr. 100

Gramen nemorosum, calyculis paleaceis erectum Scheuchz. gram. 327.

β. *Gramen nemorosum*, calyculis paleaceis, repens Scheuchz. gram. 329.

γ. *Gramen nemorosum*, calyculis paleaceis, species altera procerior Scheuchz. gram.
328.

δ. *Gramen brachyotum* erectum angustifolium majus Banel. Ic. 264.

ε. *Gramen holosteum* alpidum minus Bauh. pin. 7. Theatr. 101.

Gramen junceoides minimum anglo britannicum Raij Angl. 3. p. 234.

Habitat in Europa ~~inundatis~~
~~loco~~ ~~inundatis~~

Gramen hithanum ~~colum~~ ^{colum} dichotome diviso. Folia Culmi plures. Folia
1. radiale 2. supra medium caule ^{altiore} 3. sub prima divisione culmi
pubulata. ^{plurimi} ~~et~~ ^{terminales} ~~et~~ ^{gemini} ~~et~~ ^{quorum}
albes cum ramulis exerescit. omnes lanceolati: semilunulares

26.

specimine perfectiore adhuc descript.

ulegnosus 7 foliis setaceis subarticulato nodos culmo repente
ad florum glomeros proliero Roth fl. germ.
pag. 155

Funicus supinus culmis cepitosis subdurotomis
foliis filiformibus canaliculatis capitulis triphyllis
Roth. fl. germ. 1. p. 156. Moench Has J. no 296. tab 5

Funicus subarticulatus culmo subdurotomo foliis setaceis
et subsetaceis floribus fasciculatis subarticulatis
Weyher agr. p. 330. t. 7. fig. 10

Habitat in Saxonia germania
an modo varietas 4: articulati valde suspicor

Flora Junica T. P. 17.

Funicus fluitans culmis longissimis filiformibus fluitans
fibris ad nodos proliens foliis capillanibus, glumis
bis trifloris La Mark Eno

16 bulbosus Tuncus foliis linearibus canaliculatis, Capsulis obtusis Lin. Spec. pl. pag. 466
S. V. p. 341. Flor. Dan. t. 431.

Tuncus parvus cum pene arvensis rotundis Bauh. hist. 2. p. 522.

Gramen punctum, puncti sparsa panicula Monf. h. 3. p. 227. J. D. t. 9. fig. 11.

Tuncus repens apocarpus minor Barr. Ic. 114.

Tuncus compressus; foliis linearibus canaliculato-concavis, capsulis ovatis
Culmo compresso. Faerq. Vind. 235

Habitat in Europa paucis sterilibus et ad raras

Radix repens densa. Culmi filiformes compressi semipedales. ^{inferne} Folia linea
in ^{culmo} ~~culmo~~ na, coriacea subtus convexa et striata & floralia duo unequalia altero
longioribus longior. Corymbis communis et parciales unequalis. Siliola calycina
externa acuta, interna latera, obtusa. Capsula longitudine calycis
aequalis oblonga obtusissima.

23 *Triglochin Funus* foliis planis, gluma triflora terminali Lin. l. V. p. 341. Fl. Dan. t. 132.

Funus exiguus montanus mucrone carens Bauh. prod. 22. Theat. 103. Pin

12.
Funus gluma triflora culmum terminante Fl. Lapp. 115. t. 10. fig. 5.

Habitat in Alpibus Norvegiis, Helvetiis
Funus filiformis ^{funeris nudus}
Palmus nalmans inferne foliis 1. 2. subulatum. vagina striata. Valvula ovata
concavo femineo. Longit aequalia longitudine florum

22 biglumis Kunzei folio subulato, gluma biflora terminali Lin. Am. acad. 2. p. 266.
ed. 2. p. 245
L. 3. fol. 3* Flor. Dan. t. 120.

Habitat in alpebus Norvegiis 4

Gramen digitale, folio unico in culmo, plura pauca ad radicem sesqui pollicaria
culmo breviora, glabra, valvula exterior magna ovata acuminata, nigro purpure
rasens, dorso vix carinata. interior duplo minor acuta undique atropurpure
reus. Calycis foliola valvulis concoloris exterioribus vix lineis vix in medio
lateris interioris

Capitatus Truncus

Habitat in Carolina herb. Trunc.

Culmus teres, erectus, foliis. Sola vertice, articulata Capitula magni
tudinē pisi, terni, intermedio sessile, saepe proliferi, involucrium subula-
tum, sesqui pollicare sub umbella. Flores acuti.

anceps Lincius

Habitat in Carolina herb. Guss.

Culmus articulatus, anceps. Sola culmo frutellima. Capitula terminalia,
globosa, umbellata, subprolifera. Flores acuti. Involucrum breve, rectum.

prope articulatum

melanocephalus Guntur

Habitat in America boreali Richard.

habes

rubens Linnæus

Habitat in monte vides Commerçon Leb. Thonini

Culmi nudi, inferne vaginis fuscis, teres, striatus, glaber, pedalis et ultra. Pedunculi
terminales, plures, semipollicares, subsessile. Spatha lanceolata, rigida, striata
longitudine foliorum. Bractea, uti calycis lanceolata. Pedunculi compressi

Secundus Genus

Habitat in America boreali herb. Venteniat

Culmi ascendentes, in nodos, erecti, simpliciales, verticillati, striati. Folia radicalia
linearia, angusta, plana. Pedunculi ex apice ramosi, inaequales, cum folio sub
lato longiora. Flores sessiles, secundi, alterni, distantes, lanceolati, acuti. Brai
tes lanceolata, sub calyce ovata.
prope huc bosum

polycephalus Funicus

Habitat in America boreali hest. Reeth.
Culmus sesquipedali

habes

reperi truncus

Habitat in America boreali hab. Mich.

habes

fluctans Yuncus

Habitat herb. Rich.

habes

melanocarpus Kunze

Habitat ad fretum Hudsoni Michaux Herb. Mus!

Culmus erectus, sesqui-pedalis, teres, glaber. Colica remota, glabra, bis 3-4 polli-
cana, lanceolata. Umbella terminalis, prolixa. Pedunculi 3-4 pollicares,
vel breviores: pedicelli ultimi terni, intermediis brevior, uniflori. Flores
parvi. Squama oblonga, acuta. Semen longitudine calycis, nigrum

magellanicus Funicus

Habitat ad pedum magellanicum Commespo herb Fusc.

Folia linearia, culmam inferne vaginantia eque altiora. Involucrum
monophyllum, subulatum, pollicare

Genus:

Habitat ad fretum Magellanicum Commerson herb. Gussf
Similis 4. specioso. Folia longa pilosa, superiora sublanata. Spica ter murales
oblonga, hispida, erecta, sempollitans. Folium sub spica patens

Tumor

Habitat in Borana Comeson herb. Mus.

habes 1.

Junco

Habitat in Bonano Communis herb. Musci
Culmifera pedales

habes

Fucus

Habitat in Bonana Comneson Leb-Muf.

Culmi saepe pedales

leb-Muf

1 acutus Functus culmo subnudo tereti mucronato, panicula terminali, involucrio di-
phylllo spinoso Lin. S. V. pag. 340

Functus acutus capitulis forghi Bauh. hist. 2. p. 520. Monf. h. 3. p. 232 f. 8
t. 10 fig. 15.

~~Functus acutus maritimus anglicus Ray hist. 1307. Monf. h. 3. p. 232 f. 14~~

~~Functus panicula universalis culmo longiore, secundariis laxis longe pedun-
culatis: media procipe Guett. Stamp. 2. 412.~~

Habitat in Anglia, Gallia, Italia, Barbano maritimo paludosis &

Culmus pedalis et ultra rigidus glaber subtilissime striatus ^{foliolis}

Panicula terminalis conglomerata ramo unico reliquis albis ^{involu-}

Cum ex extremum ^{subulatum teres} rigidum erectum in ^{panicula longior} penam desinent Internus

minus longi ^{subulatum} pedine paniculae basi ^{paniculae} lanceolato ^{subulatum}

planum striatum. Bractea subulata, cinnata glauculis longiores

semine globosa magnitudine seminis coriandri

Functus maritimus forghi panicula utriculata Borel. 72. 203. fig. 2.

2 maximum *Guncus ulmo Tereti*, panicula ^{Ceras} ramis inaequalibus ^{patentibus}, involucrio/pungo
feminibus lanceolatis

Guncus albus maximum anglicus Raij Synops. pag. 431. Monf. h. 3. p. 232
f. p. 10 fig. 14.

Guncus panicula universali Culmo longiore, secundariis laxis longe
pedunculatis: media proteriore Gualt. Stamp. 2. p. 412.

Habitat ad littora maris Angliae et mediterranei & ^{Spithamse}
Culmus sesquipedalis erectus rigidus basi subsilesus. Panicula supra
decemposita pedunculis inaequali unia reliquis semper major
solum sub singulo panicula parvati lanceolata attenuatum
longitudine panicula, canadum. Calycis foliola lanceolata
acuminata.

12

11

ab *Guncus*: acuto diversa

rubens 4. Culmo nudo basi vaginato, involucri spathaceo multifloro
terminati La Mark.
Habitat in monte vides

Cymopus Tunicus

Tunicus cymopus culmo nudo folus planis, panicula
terminali cymosa, involucri bivalvi La Mart. Enc

Habitat in Cap. b. frei

Solca radicalia, striata, culmo saepe altero

4 rigidus Kunzei Culmo tereti capitulis lateralibus umbellatis

Habitat Fabricius, Forster.

Culmum pedalis nudis Anvolucris monophyllo subulato rigido. Pedunculi
capitula lateralia versus apicem intermedio sessili. Folioleae corymbosae
rigidae subulatae

8- conglomeratus *Juncus* culmo nudo striato, capitulo laterali

Juncus Cam. epit. 700.

Juncus loris, panicula non sparsa Bauh. Pin. 12. Theatr. 103.

Juncus loris, panicula conglomerata Scheuch. gram. 343.

Habitat in Europa borealis uliginosis &

Culmus sesquipedalis striatus. Capitulum versus summitatem
magnitudine nuclei conyli. Involucrum subulatum capitulo
parum longior. Petala setacea

Siliiformis Funckii

affulatus Funus

2-13

6 effusus Tuncus culmo nudo striato panicula diffusa ^{nudante} laterali Lin. S. V. pag. 340

a Tuncoides alpinum, flospiliis panicis conglomeratis atro fusis Scheuch
gram. 323.

Tuncus culmo nudo acuminato ad basin squamato floribus sessilibus
Flor. Lopp. 16.

73. Tuncus lani Dod. pempt. 606.

Tuncus lani panicula sparsa major Bauh. Pin. 12. theat. 102. Scheuch
gram. 341.

Tuncus culmo nudo acuminato ad basin squamato, floribus pedunculatis
Flor. Capp. 117.

Habitat in Europa uliginosis, et in alpebus 4

Stilpus bi pedalis striatus. Panicula superne effusa. floribus subulatis
natis

3.

retenu despendenda

gracilis Funicus culmo nudo striato glauco basi stipulis fuscis, pani-
cula laterali prostrata Sibthoroph. Flora orten. pag. 113. Flor. Dan-
tab.

Funicus effusus B. Hud. fl. Ang. 149

Funicus acutus Raii Syn. p. 432.

Habitat in Anglia Holmstria &

Rarior Funicus effusus et flosculi attenuati longioris omnino
fusci

7 in flexu *Juncus* culmo nudo apice membranaceo incurvo panicula laterali
L. L. V. p. 340

Juncus *coris* Tab.

Juncus acumine reflexo major Bauh. Prodr. 184. Pin. 12. Monf. h. 3. p. 233.
f. o. t. 10 fig. 25. Barrel. Ic. 204.

β. *Juncus* acumine reflexo alter Bauh. prodr. 22. Pin. 12. Scheuchz. Gram.
345

γ. *Juncus* acutus Dod

Juncus acutus vulgaris Lobel. Ic.

Juncus acutus panicula prostrata Bauh. Pin.

Juncus panicula universalis laterali culmo longiore, secundariis
prostratis Quett. Stamp 412.

Habitat in Europa Australi & sub Arct.

Culmo plures basi fusci. Panicula lateralis diffusae

① *filiformis*
conglomerata Tuncus culmo nudo filiformi panicula laterali Lin. S. V. pag 340

Tuncus levis, panicula sparsa, minor Bauh. Pin. 12. Scenth. Theatr. 183.
Scheuchz. Gram. 347. t. 7. fig. 11

Habitat in Europa ~~pa~~ uliginosis paludosis turfosis Holstia Slesan
dia circa ^{graspan}
Radix repens Culmi basi squamis lineantibus striatis mucronatis vestiti,
fisthamosi teretes. Panicula in medio culmi pauciflora (6-8).
Cappula globosa capyce dimidio breviora

foliis filiformi ~~Caloglyphis~~ Congiure
Tenuis ~~foliis~~ ~~genuis~~ Culmo filiformi Capitulo laterali

9

Habitat in Bonana

Similis filiformi ad multo tenerior

Guncus capillatus La Mart

9

7.

10 trifidus *Juncus* culmo nudo, foliis floribus tribus Verminalibus Lin. S. V. pag. 340.
Flor. Dan. t. 107.

Juncus acuminato reflexo, minor et trifidus Bauh. Pin. Rador 22. t. 22. Pin.
12. Theatr. 185.

Juncoides alpinum trifidum Scheuchz. Gram. 325.

Habitat in Alpibus Laponicis, Helveticis, Pyrenæis &

Culmi plures aggregati squamis interspatiis, palmares inferne squamis
vaginatae. Folia tria in culmo subulata in squalia duo sub floribus
tertium inferius. Glumæ tres fastæ.

magellanicus 4. culms nudo unifloro folus planis sculis angustis
fimis culms longioribus, flore laterali La Marche

Enci:

Habitat ad fretum magellanicum.

P-4

non vidi

11 *Juncus tenuis* Culmi nudo, foliis setaceis, floribus ~~subcapitati~~ ^{et} floribus glomeratis
subcapitatis terminalibus.

gramen junceum maritimum Lob. 4c.

gramen junceum, foliis et spica junii Bauh. pin. 5.

gramen junceum, semine acuminato Loef. prof. 15. 8. 29.

Habitas in Europa boreali capitulo 4

Planta rigida. Culmi, capitulo, perithamidi sesiteraphylli. Folia radicalia
setacea supra ~~plata~~ unalveolata subtus convexa. Pedunculi termina-
les breves 3-4 bis triflori, floribus alti sepe libris altitudine aequalibus
basi squamis propriis binis membranaceis; lanceolatis, acutis fere
involucrum lanceolatum ad basin capituli

Sprengelii 1. 7

3) *subulatus* Tuncus Culmo ramoso foliis subulatis, floribus paniculatis
Tuncus subulatus; foliis subulatis; paniculis terminalibus; involucrio diphylo
 subulato Boiss. Desf. r. pag. 75
 Habitat in Aegypto Alexandria. ⁱⁿ
 Similis *T. maritimo* at involucrio non purpureo. Folia in culmo ⁱⁿ ~~sub~~ ⁱⁿ ~~sub~~
 ramificatione ~~est~~ 3. vel quatuor vaginantes. an varietur
 modo

repuntorius Kunze Culmo ~~nudo~~ tereti, folio tereti articulato multirornato, panicula conglo-
merata Lin. Suppl. p. 200. * S. V. p. 340

Habitat in C. bono spec. 4

Culmus bipedalis et ultra, teres levis crassitie penno columbino, fructus.

Folia radicalia nulla, sed membranae duo rudimenta foliorum. Folium
caulinum unicum culmo simile sed paulo longius, multirornatum pen-
geno, intus articulatum, basi in vaginam ditam bipollucarem desinens.

Panicula terminali conglomerata ~~in~~ e capitulis globosis inaequali-
ter pedunculatis magnitudine pisi. Involucrum diphyllum,
rigidum erectum panicula brevius. Semina oblonga nitida
affans⁹ articulata sed omnia robustiora.

in nodosus Panicis foliis nodoso-articulatis, petalis ^{acuminato subulatis} ~~mutatis~~ Lin. spec. pl. p. 466. &
L.V. pag. 340

gramen panicum virginianum, calyculis paleaceis, bicorne Mon. f. h. 3.
p. 220. f. O. T. 9. fig. 15

gramen panicum elatius, pericarpis oratis Pluk. alm. 179. & 92. fig. 9.

Panicis foliosus minor, pericarpis oratis, americanum Gron. vray 15.

Habitat in America septentrionali &

simillimus P. articulato, sed flores magis capitati: capitulis rari-
bus majoribus, et panicula rami simplicis, nec supra eam propti;
in primis d. frangitur petalis in acumen subulatum protractis lin.

Scirpoides Tenax foliis teretibus articulatis, capitulis globosis ehi-
natis panicula subsimplici La Martre Enc.
~~extrema~~ an Plukn. t. 417. fig. 3
Habitat in Carolina meridionali.

14-15

non vid.

pallefieri 4

Panicum pallefieri foliis subtetibus. Venibus articulatis pan-
cula strobila, calycibus acutis submembranaceis La-
Mark.

Gramen panicum elatum pericarpis ovatis America
nam Plukh. Alm. t. 92. fig. 9.

Gramen panicum virginianum, calycibus paleaceis brevior
ne Monf. hist. 3. p. 220. f. D. t. 9. fig. 15

Habitat in Virginia Bonaria

Comptes sur 7

acutiflorus 9

Sylvaticus culmo erecto foliis teretibus articulatis nodosis
pannicula terminali superdecemcosta Roth. fl.
German. p. 155

obtusiflorus Funicus

Hoffm. fl. Deuts. p. 125

14 ~~adventus~~ Juncus foliis nodoso articulatis, petalis acutis panicula supra. Daion

~~obtusiflorus~~ posita

Gramen juncum folio articulato, aquaticum Bauh. prodr. p. 12. Pin. 5.
Theatr. 76. Scheuch. gram. 331.

Juncus foliis articulatis, floribus umbellatis Tournef. J. R. H. 247. Flor
Lapp. 120.

β. gramen juncum folio articulato, cum utriculis Bauh. prodr. 12.
Scheuch. gram. 333.

✓ Juncus alpinus folio articulato, sylvaticum Bauh. pin. 5. Theatr.
75. Monf. h. 3 p. 227. f. o. t. 9 fig. 1. Scheuch. gram. 334.

α Junci foliosi; foliis per intervalla nodosis Michx. gen. 30 n. 1-13.

Juncus articulatus; foliis nodoso articulatis, petalis obtusis Lin.
L. N. p. 340

Sylva

Habitat in Europa aquis 4

Gramen semipedale Culmo unifolio. Folis per intervalla nodosis
culmo brevioribus. Vagina striata. Folis geminis sub corymbis
inæqualibus altero longitudine corymbi. Pedunculi inæuales
ramosi pedicellis bifloris floribus sessilibus oblongis acutis
a aquaticis foliis compressis

aquaticus 4. culmo decumbente foliis articulato nodosis subcom-
pressis terrecanibus panicula terminali composita
Leers flora Herb. t. 13. fig. 6.

~~3. Juncus virginicus Schreber. Gram. t. 1. p. 10~~

Habitat in Germania

Juncus mutabilis humilis caespitosus, culmi subfoliosi
foliis canaliculatis, floribus congestis sessilibus. Ca-
mark Eric.

alpinus 9. foliis subarticulatis, panicula terminali sem-
plici glumis anfractis capulis obtusis Vill. fl. d'alpe
2. p. 233. no 10. Hall. hist. no 1321.
Funcioides alpinum foliis articulato Schenck
gram. 333.
Habitat in alpebus Helvetia

18 ^{perplectus} ^{quincus}
Cubensis pedunculis bifidis, ^{calycibus} floribus lateralibus sessilibus capsulis longioribus

Habitat in Cap. b. sp. ^{angris}
Similis F. Vaillantii at folia setacea. Boliola calycina subulata calyce
duplo longiora

14 Vaillantii Junceus pedunculis aggregatis dichotomis, floribus cætera libris Vermenalebusque
solitariis sessilibus longitudine capsularum
Junceus annuus Vaill. Bot. Parf. t. 20. fig. 1.

Habitat in Gallia

Juncus tenuis Bufonii. Folia angusta plerumque radicealia; unicum sub pediculis
culmo breve. Culmi plures straminei. Pedunculi plures ex apice longita-
dine culmi plerumque bifidi interdum terni et quatuor bifidi. Flores sessi-
lis in dichotomia, 3-4. ad latus interius pedicelli versus medium remoti.
Foliola calycis lanceolata capsulam parum excedentes

tenaxia

Juncus tenaxia culmo dichotomo floribus sessilibus calycis
foliis ovato lanceolatis mucronatis capsulam
globosam æquantibus Lin. Suppl. Flor. Dan

21 *grandiflorus* *ficus* folio *tereti*, culmo unig/loro, flore erecto *Lin. Suppl. p. 209.*
S.V. pag. 341.

Habitat in Terra del fuoco 2,

*gramen pedale glaberrimum. Culmus teres, superne angulatus, basi vagini
i plura glaberrimi
teretis. Solum unicum teres, subulatum rectum, culmo parum
glaberrimo basi canaliculatum
longius. Flores culmum terminans, unicus magnus erectus. Valvula
calycinis erecto acuta, triquetra cinnato striata alterno bre
viorer pollicares. Stamina et Stylus valvulis breviora.*

Stylus unguiculari stymata tria stylo dimidio breviora subulata

Lin
*ficus grandiflorus folio tereti, flore solitario terminali subulato Torsten
Lan. Golt. 1789. p. 27. tab 5.*
gluma tria lanceolata ovata concava subaequalis

24 Jacquinii Fucus folio subulato capituli subquadrifloro Verminali Mart p. 63. +
S. V. pag. 341. Faicu. Vind. 237. t. 4. fig. 2. Fl. Austr. vol. 3. p. 1. 221.

~~Habitat in Schneeberg Austria 4~~

Culmo semipedali basi squamis variatus ter. stratus superne folio
subulato bipollucian. ^{caulge act. u. d. r. t. u. m} Capitulum Verminale inter gemini & flori
bus 3-7. ^{res. pellati} glumis communibus propriisque. Lufi is ea cepti; sextu
plo majori quam in *F. biglumi*. Setula ^{capiceolato} subulata, carinata fusi nit.

^{di} Fucus atratus culmo simpliciter unifolius flonibus glomerato
fusi ulati atro fusi is Verminalebus La Mart. Enc.

37 ferratus tuncus foliis ensiformibus planis ferratis, subtus canis, panicula vagi-
nis subulatis perfoliatis Lin. Suppl pag 200. & P.V 341.

Habitat in Cap. b. p. nei

Ca. l. mi foliosi, teretes, crassitie digiti minoris, saepe 6 pedales. Folia
alterna graminea duriora, lami subnervosa, longitudine vix
culmi. Panicula conglomerata minusque patula: glomeribus saepe
glomeratis. Affinitas *A. pilosi*, sed *tauto* longe major

33-74

~~76-44~~

non vidi

30 *Flanus tuncus* foliis planis glabris, panicula fastigata floribus capitatis
obtusis subcapitatis
tuncoides alpinum, lat. folium, glabrum, panicula subultra splendens
Scheuchz. gram. p. 314.

grasden aliud ex alpinis Rhodii Scheuchz. it. IV. p. 335

Tuncus planifolius, glaber, panicula nitente, floribus obtusis Hall.
hist. 1329

Habitat in alpinis helveticis

Gramen simpliciale. Colica radicalia plura, lanceolata linearia bipolli-
cania curvata diu remota breviora. Panicula terminalis foliolosa
subulata ad basin pedunculorum. pedunculi ^{gemini} capillares ut
gemularum interdum bifidi pollicis arcuati pedicelli alter
ni interdum bifidi floribus 3-4 sessilibus. Squama membran-
acea vaginante ad basin pedicellorum. flores
dignoscentur floribus flavescenti nitentibus

3) Splendens Funicus foliis planis pilosis capitulis subumbellatis

Funicus montanum nemorosum, vellosum latifolium elatius, capitulis
florum candidis et splendentibus Mich. gener. 42.

Funicus campestris D. Lin. Spec. pl. pag. 469.

Habitat in sylvis montosis Italiae

Gramen saepe sesquipedale foliis latis margine pilosis. pedunculi
terminaliter tres vel quatuor filiformibus triquetris simplicibus vel
trifidis. Oloa in capitulo congesti. basi bractei duobus ovatis. Colicula calycis
lanceolata duplo majora quam in F. rupeo

27 *Spadicicus* Juncus foliis planis glabris panicula laxa floribus pedicellatis
gracilis hirsutum nemorosum, alpinum, angustifolium, paniculis
obsistere respiciendis Scheuchz. & d. alp. 6. p. 458. gram. 312. t. 6.
Juncus foliis planis, culmo paniculato, floribus parvis Lin
Flor-Lappo p. 124.

Juncus pilosus V. Lin. Spec.

Habitat in alpebus Helvetiis Laponiis

9. pilosus densiore latior pedunculi ramosissimi, & minime distinctome
divisi, floribus minutis, capsulis globosis.

Juncus Hall. herb. no 1326-27

Juncus spadicicus All.

Juncus parviflorus Retzii

curvulenus: 9. foliis pilosis striatis, floribus rotundis solita
nis Vall. fl. Delph. 2. p. 235.

Gramen sylvaticum pilosum Tabern. ic. 227.

Genus foliis gramineis hirsutis floribus umbella
tis foliatis petiolatis aristatis

Genus pilosus g. l. n.

Habitat in alpebus sylvis Europaei

maximum *Funicus* foliis planis pilosis, panicula terminali
corymbosa, floribus fasciculatis Roth fl. german.

1. p. 157

Funicus nemorosus culmo geniculato pedunculis
corymbosis petalis mucronatis Moench Haesler 290
Funicus pilosus B. Lin.
Habitat in Germania Danica

Gramen curvum maximum Joh. Bauh. hist. 2.
p. 493.

B. angustifolius

~~*Funicus*~~ *pilosus* E. Lin.

montanus - *A. folio planis pilosis, corymbo paniculato floribus
congestis* Ca. Marti Eni.

Gramen hirsutum latifolium maximum. Juncea panicu-
la Mont. herb. 3. p. 225. f. 9. tab. 9. fig. 2.

Habitat in Alpibus

40-41

michi haec notis

lancoletus 4.

~~Luban flatus foliis planis ex vagina pilosis floribus mead-
ris corymbosis solitariis luban flatus all. fl. Pedem.
2083. Vall. fl. Delph. 2. p. 236.~~

~~Funicus foliis gramineis floribus umbellatis petalis
equalibus Hall. hist. no 1327.~~

~~Habitat in alpebus~~

non vidi

ped formis 9: foliis plano cernatis pilos, floribus oblongis
in spica lobata nutantibus Vill. fl. Delph. 2. pag 230.
Tab. 6

Juncioides quod junceus alpinus latifolius, panicula
racemosa nigrescente pendula Mich. piper. 91. H. gen.
42. no 7.

Habitat in alpebus

gracilis & culmo filiformi simplicissimo, foliis filiformibus semi
cylindricis canaliculatis, capitulo terminali involucri
pentaphyllo Roth. fl. germ. 1. p. 154.

~~B. Lunus canaliculatus capitulo basi proliifero Nees. obs. bot.
p. 20. p. 14. fig. 5.~~

~~Habitat in Germania O~~

mibi haud satis nota