

Juniperus

1. communis 4. foliis ternis patentibus mucronatis basi longioribus
 2. oxycedrus 4. foliis ternis patentibus subulatis basi brevioribus squamatis
 3. bermudiana 4. foliis inferioribus ternis superioribus binis decurrentibus subulatis patulis acutis
 4. virginiana 4. foliis ternis basi adnatis: junceis imbricatis, senis
nibus patulis
 5. chinensis 4. foliis decurrentibus imbricatis patentibus confertis:
caulinis ternis, ramis quaternis
 6. sabina 4. foliis oppositis erectis decurrentibus. oppositis
pyramidalibus.
 7. barbadensis 4. foliis omnibus quadrifariam imbricatis: junceis
ovatis, senibus acutis
 8. phoenicea 4. foliis ternis oblitteratis imbricatis obtusis
 9. lycia 4. foliis ternis undique imbricatis ovatis obtusis
 10. Thuus 4. foliis ramorum patentibus ternis subulatis, ramulo
rum quadrifariam imbricatis
- 4 unguis e gou dedit Jusper

F. lycia

Fumipennis lycia. foliis basi imbricatis decurrentibus confertis acutis fl. Ross: T. p. 2. t. 56
fig. 1. a. b. *

Javanica. C. frondibus tetragonis foliis inferioribus ovatis imbricatis terminalibus
subulatis petulis

Thuya javanica Burm. fl. ind. pag. 302. Tab. 62. fig. 3.

Et abit in Java.

Rami & foliis ovatis imbricatis, frondes filiformes tetragonis foliis
dorsis foliis etasati

non vid.

Juniperus barbadosis est

G. Phoenicea

G. unipennis phoenicea foliis ternis decurrentibus mucronatis Pl. Ross. 1. p. 2. p. 25. t. 57

S. Sabina

Juniperus sabina foliis binis confertissime imbricatis obtusifoliis *H. A. 1. p. 2. p. 23. V. 56*
Fig. 2. C. D.

Funi-penis

7. *Dauncea* foliis oppositis acutis imbricatis & decurrentibus, pappi parvuli subulatis Fl. ros. pt. 1. p. 2
pag. 19. Tab. 55

Funi-penis foliis inferne adnatis, oppositionibus concatenatis, bacis monopyrenis Gmel.
fl. sib. 1. p. 103 nos

γ3 variet. fig. a.

Habitat in altissimis montibus Lapponici et montibus Dauris

Trunci prostrati, crispis brachiis. Rami, testacei, juniores reliquis foliorum in squamas
acuminatas multatis imbricati, tandem decidui. Stipuli virides dichotomi & foliis
binis oppositis binis, glaucis viridibus imbricati. Bacis globose, nigro polline
albo conulescentes monopyrenis et dipyrenis: nuclei ovato globosi magni, costa obli-
qua marginati vel quadri sulcati, lutescentes

Juniperus

Cedrus ² *foliosissima* ¹ *orientalis*, arbor excelsa, seu *Sabina orientalis*

Habitat in Armenia herb. Tournef.

folia omnia ternata, ovata, acuta.

habeo

macrocarpus Juniperus.

Habitat in Syria herb. Desfont.

Rami crassitie pennis cyneis, glabri: ramuli sparsi, patentissimi. Folia Vera
patentia, lanceolata-subulata, semipollicaria, utrinque concolora, nigra,
nervosa, subtus carinata. Baccis magnitudine Pruni.

Tuniperis

Tuniperis ex Goa Hort. Leyd. bot. 346.

Habitat goa herb. Mus.

Rami sparsi, patentis, teretes; glabri: ramuli angulati. Folia opposita, subulata, parva, acuta, inferiora patentia, superiora imbricata, decurrentia.

Cerasifera Juniperus foliis ternatis subulatis patentissimis latissimis longioribus

Juniperus latifolia arborea Cerasifera fructu fructu Taur. ref. Cor.

Habitat in insula Mela herb. Fus. 5

Rami teretes: ramuli ^{teretes, glabri} frequentes, alterni. Folia semi-pellucida, ^{supra} glabra, subtus ^{infera} cinerata, ^{rigida} pungentia, supra glauca. ^{puberula connata} ^{supra} ^{ramum} ^{maiores} ^{folia} ^{brevia} ^{prope} ^{Oxydonem} collocatur.

Guni peris

Guni peris major bacca fuscescente

Habitat herb. Maj.

Simili *Cerapna*, flores minores.

habes

Juniperus

Juniperus folii fructus africanus Baub. prodv.

Habitat herb. mus.

Folia terna, subulata, patentia, vix pungentia, & esula, vix de^u mentia
utraque concolora, margine parum revoluta. Flores non adstant

5 thurifera G. foliis quadrifariam imbricatis acutis An L. V

Cedrus hispanica procerior, fructu maximo nigro Tournef G.

R. 4. 5 00. herb Vaucl.

Habitat in Hispania &

Rami veretes squamis ovatis acutis cinnatis adnatis verti ramuli
parvi, frondes juniores ligiformes alterius patentes ramulose
quadrifariam imbricatis & foliis parvis ovatis acutis, in adal
teribus folia patentia acuta pinnatifida Verni canna
sa supra plana subpungentia. Baccis oblongis Ceraso
dimidio minoris solitaria glabra subpedunculata pedunculo
lo squamoso

Rami cinnatis. Folia opposita, ovata, acuminata. Baccis glo
bose magnitudine Pruni pumosi

foliis ramorum patentibus Verni subulatis, ramulorum qua
drifariam imbricatis

→ barbadosi 4. foliis omnibus quadrifariam imbricatis: junioribus ovatis, senioribus acutis An. 1. V

Guinipenis barbadosi, cupressi foliis, ramulis quadratis Plukenet
alm. 201. 7. 197. fig. 4.

Habitat in America, dicit Plukenet

Rami ramuli et frondes uadique imbricati folia minuta
dorso folio exarata ramuli ultimi tetragoni apice parum
crasiores obtusissimi

6 Sabina 4 foliis oppositis exserti decurrentibus: oppositionibus pect. datis
Lin. l. v.

Sabina God. pempt 854.

Sabina folio cypressi Bauh. pin. 407.

B. Sabina folio tamarisci Dioscoridi Bauh. pin. 407.

Habitat in Lusitania, Italia, Olympo, Ararat, Oriente, Sabina 4
folia in ramulis ultimis imbricata in adultioribus patentibus opposi-
ta supra canaliculata femineaque sulcata

Oxycedrus Plus. hup. p. 102. herb. 4.

5- chinensis f. foliis decurrentibus imbricatis patentibus confertis: Caulibus
ternis, ramis quaternis Lin. Mant. 127. * L. V. Gray. 894
Habitat in China

non vidi descriptionem in li. Adenda

3 bermudiana 9 foliis inferioribus ternis. superioribus binis decurrentibus
subulatis patulis acutis len. l. v

Juniperus bermudiana Herm. Legdb. 345: t. 347.

Habitat in America 5

Rami angulati e basi e basi foliorum decurrentibus, vix
unguiculata exserto patentia subulata valde attenuata
in ramulis non em determinate imbricati ut in variis
aliis

cardiniana
4 virginiana 7. foliis ternis basi adnatis: junioribus imbricatis; senioribus
patulis Hort. Cliff. 4644 ^{puber} sub nomine royniana
Juniperus barbadensis, cypressifolio arbor ex celsa tetragonophyllor

Platan. alm. 2017. 197. fig. 4.

Juniperus maxima, cypressifolio minus, cortice extenore in
venae phelyras spirales ductili Noan. hist. jam. 2. p. 2. 157.
fig. 3.

Habitat in Virginia Carolina & dicit Richard

Crumi teretes & squamam andi squarosi ovati acuminati pahn
supremi angiores. fiores imbricati ovati acuta dorso non
pubescentia. batis magnitudine vix peperu

virginiana 4. folio Vernis omnibus patentibus du Roi Harb B. 1. pag 346

non vid.

1. Communis *J. foliis ternis patentibus mucronatis, bacca longioribus* Lin
S.V.

Juniperus vulgaris fruticosa Bauh. pin. 400

β. *Juniperus vulgaris arbor* Bauh. pin. 400

γ. *Juniperus minor montana, folio latiore, fructu longiore* Bauh. pin
409.

Habitat in Europa frigida in sylvis frequentis semper;

ramuli angulati articulati folia subtus cinnata supra
canaliculata glauca linearia supra terminata ~~vea~~ qui
culana amentis masculina folia breviora solitaria stri
cana

Oxyedrus 9. foliis ternis patentibus mucronatis, bacca brevioribus. L.
V. Mont. 499

Oxyedrus. Clus. bot. 1. p. 39.

Juniperis major bacca reflexa Bauh. pin. 409

Habitat in Hispania; G. Narbonensi &

Habitus Juniperi Communis ~~in Actovea Romana arborescens~~
Folii patentissimi pinnis pinnis subulata pungentia canna-
ta, supra cylindrica carinata. Bacca ~~globosa~~ ^{globosa} magnitudi-
ne Cerasti folio saepe brevi deoque ~~characte~~ ^{characte} un. haud
bono

① *phaenicea* 4. foliis ternis oblitteratis imbricatis obtusis Len. Spec. pl. naz
14714 f. v.

Juniperus major Clus. hist. 1. p. 30.

Cedrus folis cupressi major, fructu glaucescente Bauh. pin.
487.

Habitat in Europa australi, Oriente &
an a prou. diversa?
rami angulati

quomodo Bauh.

10 *Lycium*? *L. foliis ternis undique imbricatis ovatis obtusis* Lin. S. V

Cedrus phoenicea altera plenii et Theophrasti Lob. ic. 21.

Cedrus, foliis cypressi, media majoribus ballis Bauh. pin 407.

Habitata in Gallia, Sibiria & dedit Richard

Armi teretes. Bacis duplo majores quam in *L. communis*

~~mitte hanc folii cognita uti procedens~~

Thunbergii f. glandibus tinctibus imbricatis foliis ovatis obtusis inf
ramona patentibus acutis

Japonia

a virginiana forte non d. west