

Lachenalia

pusillata L.

Lachenalia pusillata Jacq. coll. 4. v. 2. fig. 5



1 onchioides Lachenalia corollis campanulatis: petalis tribus interioribus longiori-  
bus, floribus sessilibus; foliis lanceolatis scapo brevioribus Hort. Kew. 1.

Gay: u. rar p. 460  
Hort. 350

Hyacinthus onchioides africanus major bifolius, maculatus flore  
fulphureo obsoleto major Breyn: prodr. 3. p. 24. t. 11. fig. 1. 2.

Hyacinthus onchioides corollis expansis: petalis tribus exterioribus  
brevioribus Lin. Sp. pl. pag. 455\*

Phormium Hyacinthoides foliis radicalibus brevis basi maculatis  
scapo racemoso simpliciter, corollis campanulatis patentibus Lin.  
Suppl. p. 204.\* P.V. pag.

Phormium onchioides Thunb. nov. gen. 5. p. 95.

Habitat in Cap. b. p. 4

Folia radicalia, brevia, lanceolata, subtus versus basin ferrugineo-  
maculata. Scapus basi ferrugineo-maculatus. Racemus ter-  
minalis simplex brevis. Corolla viridis campanulata. Petala  
interiora spatulato-ovata. Stamina patentia recurva  
aque rotata Lin.

2 pallida *Cachenalia* corollis campanulatis: petalis inter floribus brevissime pedunculatis horizontalibus, foliis linearibus oblongis saepe longioribus. Hort. kew.  
l. p. 460\*

Habitat in *C. bono* <sup>in</sup> *penonibus* *Mexico*

Petala exteriora basi in tubum extus gibbum, corulepntem, coronata, et  
longa, obtusa alba, infra apicem gibbo vindi notata, interiora  
obovata, apice patentia, alba, canna versus apicem pallida vindi  
di Hort. kew. l. c.



herba Lach. corollis campanulatis pedunculatis, foliis lineariibus herba

Thunb prodr. p. 69.

Habitat in Cap. b. p. 1.

angustifolia L. foliis subulatis semiteretibus supra planiusculis, racemo digitati-  
formi corollae campanulatae Gaeze coll. 5. p. 4c. rar. tab 30.

non vid-



purpureo-rosea L. foliis geminis oblongo linearibus supra pustulatis, si apice erecto  
treci corollae campanulatae limbo patentissimo Gaiqu. coll. 5  
9 c. rar. 7380.

non ord.

hyacinthoides: L. foliis plurimis subulato linearibus: canaliculatis immixtu  
latis racemas oblongo, corollis campanulatis saepe: coll. 5.  
90 rar. tab 302.

non vidi.



violacea L. foliis geminis oblongis <sup>multilobatis</sup>, sic <sup>non</sup> adscendens, floribus <sup>Raf. n. luno</sup> racemosis pendulis  
petala interiora longiora

Lachenalia violacea Gaertn. coll. 4. p. 147. Ic. rar. tab 392

Habitat ad C. b. p. es

Tota glabra. Folio radicea duo oblonga, acuta, vasa lineata  
dorso maculis pallidis ferrugineis. Scapus sesquipedalis teres, malis  
lis oblongis fissis adpressis ascendens. Racemus semipedalis termina  
tus bracteis fimbriatis. Bractea parva acuta patula. Flores parvi  
carnui turgenti. Petala <sup>obliqua</sup> exteriora <sup>abique collo</sup> vix oblonga. interiora  
tanceiformia longiora violacea. Stigma simplex ferequ

patula L. foliis geminis linearibus lanceolatis canaliculatis pulposo carnosius ad  
medietatem erectis deorsum reflexis corollae campanulatae

*Lachenalia patula* Jacq. coll. 4. p. 149 t. var. tab. 304

Habitat in Cap. b. p. 2

Tota glabra. Folia radicalia duo, lineari-lanceolata acuta, canaliculata. Scapus <sup>spithameus</sup> pulposo carnosus flos brevior atroventra immaculata. Spatha Scapus <sup>spithameus</sup>, Versi; calame triplo angustior, maculis ferrugineis variegatus flos plures racemosi. Bractea <sup>minuta</sup> rotundata <sup>superne</sup> <sup>flos</sup> <sup>ferre</sup> <sup>ginea</sup>. Corolla Petala lanceolata apice <sup>callosi</sup> infra apicem <sup>lineolata</sup> <sup>exteri</sup> <sup>vidi</sup> <sup>inter</sup> <sup>rostra</sup>. interiora uniceformia. Jacq.

non vid.



orthopetala Lachenalia foliis plurimis subulato lineariibus canaliculatis  
maculatis, floribus cuneiformibus rectis erectis

Lachenalia orthopetala Gaëq. coll. 3. pag. 246. Fig. var. tab. 303

Habitat in cap. b. p. ei

tota glabra. Siliqua duo saepe pediculi interdum pollicis 2 lata al-  
tero multo angustiore cuspida planiuscula margine cartilagineo  
aspera intus lineolata maculisque fuscis punctibus. Scapus teres  
erectus, calamo duplo graciliori vel crassitie digiti minimum  
pallide viridi fuscis maculatus. foliis longioribus bracteis lanceo-  
latis acuminatis albis. ~~Floris~~ <sup>Floris</sup> ~~asplis~~ <sup>asplis</sup> ~~supremis~~ <sup>supremis</sup> in specia abor-  
tuentibus. Petala externa oblonga truncata apice callosa  
funicata viridibus. interna cuneiformia pallide flava  
filamenta longitudine petalorum Gaëq.

non vid.

liliiflori L. foliis geminis oblongo-lanceolatis supra pustulatis sicaps erecto  
tereti; corollae patenti reflexae, petalis lineamentis saepe. Coll. 5  
Sc. raritas 387.

non vidi



reflexa l. corollae ventrisque pubescentibus erectis, foliis eniformibus  
reflexis scapo longioribus Thunb. prodr. pag. 64  
Thormum vultivides? a  
Habitat in Cap. b. pei.

non vid.

glauca L. foliis geminis linearibus oblongis integerrimis saepeque tereti  
immaculatis floribus sessilibus patulis Rai qu. coll. 5  
9c. rar. tab. 391.

non vid.



mediana *Laehenalea* foliis geminis oblongo-lineantibus integerrimis ~~immaculatis~~  
legisque venis immaculatis, flombus breviter pedunculatis, patentissimis subglandosis  
*Laehenalea mediana* Jacq. coll. 3. pag. 242. Ic. rar. 7. 392  
Habitat in cap. b. / prei

Bulbus subrotundus depressulus. Colica 2, pedalea sulcata acuta  
inferne canaliculata superne plana, lineari-lanceolata, alte  
rum pollicem lata alterum multo angustius utraque imma  
culata lucida. Scapus teres nitidus, calamo gracilem imma  
culatus. Eschis erectis filis hinc arcuatis. Racemus erectus  
3 unciali cinctus 20 florus. Bractea adumnata alba. Petala  
alba 3. exterior oblonga obtusa apice calloso patentissima  
supra medium tota vixit interiora cuneiformia  
superne revoluta patentia supra medium lineola vixit  
a Laehen. pallida difert foliis latioribus planis ab orbicula  
marginae non scabris

non vidi

3 *Contaminata Lachenalea*: petalis tribus superioribus longioribus, floribus pedunculatis  
foliis linearifoliatis canaliculatis Hort. kew. 1. p. 460 \*

Habitat in Cap. b. Spei 4

Folia glabra, supra maculis obscure rubentibus adpersa, scapo longiora.  
Capus erectus semiteretis vix spithameus, maculis sordide rubris. Racemus  
multiflorus: pedunculi erecti filiformes, albi, sequilinares. Bractea  
ad basin singuli pedunculi, seclata basi ovata, acuminata, coriava, paten-  
tissima, albida, pedunculo brevior. Petala exteriora basi in tubum exten-  
sibilem connata, patentissima oblonga, obtusa, cam alba, superne  
rubentia, infra apicem gibbo retusa: supremum (Capo proximum tri linea-  
re; duo inferiora breviora. Petala interiora oblonga, minus obtusa,  
prope apicem carinata, canna rubra: duo superiora longitudine su-  
periorum exteriorum; inferum longitudine breviorum exteriorum Hort. kew  
L. t.



unicolor. L. foliis geminis lineari lanceolatis supra subque velatis scapo  
erecto tereti, corollis subglandosis, petalis interiora <sup>ibus</sup> apice  
patular, genitalibus declinatis Jacq. coll. 5.  
It. rar. tab. 309

non vidi

4 Tricolor Lachenalia collis cylindraceis, petalis tribus interioribus duplo longioribus  
emarginatis, floribus pedunculatis <sup>pendulis</sup> Hort. kew. pag. 1. p. 461

Phormium alodes foliis binis radicalibus, supra fusco maculatis, scapo  
nuciformi simpliciter, floribus nutantibus cylindricis - infundibuliformibus  
mutis Lin. suppl. pag. 205\* Thunb. nov. gen. 5. p. 94. L. V. pag. 336.

a foliis linear-lanceolatis, petalis interioribus apice rubris

Lachenalia tricolor Jacq. At. rar. t. 3. L. V. pag. 314

ps foliis oblongo-lanceolatis, corollis flavis basi rubentibus apice viridibus

Habitat in Q. bona pei &

Folia radicalia, tria, lanceolata, ciliis candidis, venis non carnosis,  
marginibus superioribus fusco-maculatis. Scapus teres, vix pedalis, fusco  
maculatus. Flores cylindrici versus summitatem alternis, pedo  
Caulis fere comosus est, pluribus bracteis subulatis enatis sub floribus  
supremo rudimentis ten.



punctata Lachenalia folio geminis linearibus canaliculatis in scapoque par-  
tibus erectis maculatis, floribus cylindricis pendulis <sup>in</sup> incurvis

Lachenalia punctata Jacq. Coll. 2. p. 323. Ic. rar. tab 3 97

Habitat in C. b. p. 4

Tota glabra. Folio radicalia 2. lanceolata, acutula canaliculata  
semipedalia utroque maculis basi fuscis adpressis, dorso fusco san-  
guinea, supra glaucis-ventri basi albedo cum punctis maculis  
que rubris. Scapus 10 pollicari, teres erectus, nitidus, calamus duplo  
gracilior, rubro pallidoque maculatus superne paucis floribus  
bracteis minuto albis ad basin pedicellorum. Flores nutantes  
pollicari albi <sup>in</sup> <sup>exteriori</sup> punctis rubris frequentissimis notata  
inveise cuneiformia: interiora longe cuneiformia, exterioribus pau-  
lo longiora superne punctata. filamenta longitudine fere equalia  
la 4 Jacq.

*pushtulata* Lachenalia foliis geminis lanceolato-linearibus: pistu' latis  
scapo trique tro reclinato filonibus subimpanulatis sublesplebus  
Lachenalia pushtulata Haenke coll. 3. pag. 244, 40. rar. tab. 386  
Habitat in C. b. p. r.

Bulbi subrotundus depressulus. Solca duo, lanceolato lineares  
glabra immaculata, acuta pedalia flatida basi canaliulata  
superne plana versus summitatem revoluta supra a medietate  
pustulis elevatis, rotundatis praesi. Scapus longitudine foliorum  
totus reclinatus, debilis, nitidus, triquetrus, triplicatus. Latere  
uno angustifimus. Spica terminali fasciculari densa multi-  
flora. Bractea basi lata acuminata pallida parva terminalis  
bracteis lanceolato-linearibus acuminata rosea longior.  
Petala alba externa ad apicem incrassata superne subtus vi-  
rentia. interna oblonga super late fientia superne fasciata utri-  
que angusta flavo virente. Stamina longitudine fere aequa.  
Haenke.



*Luteola* L. foliis geminis lanceolatis, siapo erecto corollis cylindricis pendulis

*Lactenalia luteola* Gaertn. coll. 4. p. 140 t. nr. Tab 395

Habitat in Cap. b. p. 4

Folia radicalia duo alterum superius alterum lineare opposita, acuta  
glabra, carnosula <sup>obovata</sup> unia latum alterum duplo angustius rarisime fuso  
maculata. Scapus erectus teris crispis calami, fuscescens. Flores  
racemosi. Flores puberuli clausi corollae deini lutei extus obsolete  
pungens. Petala extenora oblonga obtusa extenora spatulata  
lutea longiora. Stigma peltatum

rubida L. foliis geminis sublanicolatis supra maculatis planis, floribus  
cylindricis incurvatis punctatis pendulis Jacq. coll. 5.

Pom. rar. tab. 290.



5 pendula Lachenalia corollis cylindraceis, petalis tribus interioribus longiori-  
bus integris, floribus pedunculatis pendulis Hort. kew. 1. p. 462 \*

Habitat in Cap. b. p. rei

Folia oblongo-lanceolata, succulenta, tercia, spithamea. Scapus  
terres, crassitie penno anferio, foliis paulo longior, supra medium  
maculis nonnullis rubris adpressis. Racemus pauciflorus: floribus  
distantibus, cernuis. Pedunculi filiformes rubentes femunciales:  
intra deum ad basin singuli pedunculi, ovata, acuta brevissima  
Petala interiora basi in tubum trigibbum connata, rubra apice  
bus videntibus: infimi apex in crassatus, intus fornicatus,  
supra depressus. Petala interiora obtusissima, inferne flavicant  
tia, linea dorsali rubente; superne e purpureo rubicunda,  
margini et medio videntibus Hort. kew. 1. c.

Incus herbari vix non determinata

non vid.

6 viridis Lachenalia corollis cylindricis: petalis tribus exterioribus longioribus subulatis Hort. Kew. t. p. 462.

Hyacinthus viridis; corollarum exterioribus laciniis subulatis longioribus Lin. Spec. pl. p. 454 \* S. V. p. 335. Merr. in Pom. Gott. 1781. pag. 44. t. 5. Paeg. Miscell. 2. p. 331.

Habitat in Cap. bonapaei 7

Natura H. prostrati. folia subulata scapo breviora. Scapus sulcatus. Flores secundi virides. breves pedicellati. Bractea subulata longitudine florum. Corolla infundibuliformis petalis exterioribus subulatis interioribus duplo longioribus. Anteriora lineana obtusa

Thunb. in Romer Arch. d. bot. 2. p. pag 2. et sequentes genere distinguit quia  
<sup>petalis</sup>  
Castano 3. Corolla exteriori longioribus, setaice attenuato, sone reflexa. Character  
est parvi momenti. Si enim unum Phormii generis ingredi nequeat ut non  
Hyacinth. Mentis Luccagni de re botanica tam parva dicit ut ejus causa  
genera novum constitueretur



nupella L. folis plupulei oblongis planis infra terram aequat canaliculata  
racemo in pau foliorum flombus cylindricis aequ. coll. 5.  
Lc. var. 305

non vid.

quadricolor L. foliis geminis lineari-lanceolatis maculatis, pappo erecto  
corollis cylindricis pendulis limbo interno patulo saepe. Coll. 5  
F. v. rar. Tab. 396

non vid.



purpurea L. foliis geminis linearibus lanceolatis cartilagineis subtus renulatis; corollis  
cylindricis saepe profertis patentissimis Jacq. coll. 5. Hem var. V. 393

non vidi.

4-petala L. foliis geminis <sup>sub</sup> pappo pubescenti, floribus cylindricis erectis  
petalis longitudine aequalibus lacini coll. 5

Fr. rar. 8. 401

non vid.



*Tymna* L. foliis geminis basi convolutis lanceolatis patulis si a prope  
exito maculatis, floribus cylindricis punctatis pendulis laevibus. coll.  
S.      Si var. Tab. 399

non vid.

*Lonicera* L. foliis plumbis lanceolatis acuminatis maculatis, pappi  
axillaribus <sup>camo</sup> ~~ramis~~ prostratis, petalis parvatis bus 4aeq. coll. 5  
Hb. nr. 7402.

non vid.