

15
Lacistema

Gl. amentis squama. Cor. 4-fida. Filament. bifidum. Ballo. pedicellata.

Trigynia

14. Lacistema. Cal. amentis squama. Cor. 4-fida. Filam. 2-fidum.
Caps. baccata, latere dehiscens, 1-locularis. Sem. pedi-
cellata, pendula

mynioides. ~~Lausystema Sw. prod v. p. 12.~~

Piper aggregatum Berg. Act. Helv. 7. p. 131. Tab 16.

Habitat in Jamaica.

W. S. W.

myricoides 1. Lacistema Swartz. prodr. 12. Flor. ind. occid. 2. p. 1093.

Piper aggregatum Berg. in act. helv. 7. p. 131. t. 16

Nematospermum borigatum; foliis ovatis, glaberrimis, capsula ovali,
loci Act. Soc. hist. nat. par. 1. p. 105

Habitat in frutetis Jamaicae occidentalis Swartz, in Cayenna von Rohr
Richard, Surinami Rolander. 5

Rami teretes, apice compressiusculi, glabri, cortice inferne cinereo,
superne purpurascente. Folia petiolata, bi-quadripollicaria, lanceo-
lato-elliptica, acuminata, basi apiceque acuta, extrosum obsolete
serrota, inferne integerrima, utrinque glabra, venosa. Petiolus
unguicularis. Antherarum loculo disjuncto.

Una cum specimenibus plurimis, descriptionem in loco natali
adornatam, simul misit optimus v. Rohr, dum hec in nonnullis vocat
est ab amicissimo Swartzii recedit, non abs re fore mihi visum
est hanc addere.

Amenta axillaria, tria ad octo, axillaria, longitudine petioli,
teretia, obtusiuscula, undique imbricata squamis unifloris: squam-
la duo, minutissima, ad latera majoris. Corolla quadridentata,
serte.

basi affixa squama singuli amenti affixa. Nectarium membranata colorata, hinc inde
fissa, germen eiciens. Filamentum unicum, bifidum, squama amenti oppositum,
adscendens. Germen globosum. Stylus nullus. Stigmata tria, minima, divergentia.
Capsula carnosae, rubrae, apice obliqua, basi turbinata, obsolete triquetra, unilocu-
lari, latere longitudinaliter dehiscens. Semina plerumque duo, carne alba, pauca
fere, ovata, cum sulco, quo per filamentum receptaculo annexum dependent.
Quamvis semper semina duo invenim, receptaculo nichilo minus tria ad-
haerent, quod suspicionem ~~habet~~ ^{habet} ex illis manere

Celeb. Swartzii ^{quae ap. Richardii} dubitare videtur, namque nematospermaum Richardii dicitur
Congeneres ~~sum est a~~ ^{est} Calistemma # Quod Richardii et Rohrii planta non differunt
sunt. nullum dubium est cum in eodem loco lacta sunt, praeterea specimina in
herbario Rich. ne unquam a Rohrii discedunt. Bergius Piperem aggregatum
verosimile a Rotandro habuit, qui in ejus itinerario et herbario occurrit
sub nomine Piperis monandi et ex arte quadrat cum Nematosp. Richardii,
Spero denique nullum de crimen inter haec tres a specimine ab ipso
Swartzio missum indagare potui, hinc persuasus sum Nematosperrmaum
requidem specie multo minus genere a Calistemma differre.