

Lamium

1. ovale L. foliis cordatis inaequaliter argute serratis attenuatis, caulibus coloratis
2. gorganicum L. foliis cordatis pubescentibus, corollis tubo recto dente utraque gemino caulibusque glabris
3. longatum L. foliis cordatis rugosis glabris caulibusque calycibusque longitudine tubi corollae glabris, ~~caulis laevi~~
4. ~~molle~~ ^{rugosum} L. foliis cordatis acutis rugosis caulibusque glabris pilosis, verticillis multifloris laevibus dente unico setaceo.
5. molle L. foliis petiolatis subdentatis: inferioribus cordatis superioribus ovatis.
6. incisum L. foliis cordatis incis-serratis glabris attenuatis summis subnerviatis
7. maculatum L. foliis cordatis acuminatis serratis verticillis 1ofloris
8. album L. foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis, verticillis 2ofloris
9. purpureum L. foliis cordatis obtusis petiolatis

10. *carneifera* L. foliis cordatis serratis obtusis vel longis subcuneatis
11. *bifidum* L. foliis cordatis, corollam galea bifida, laciniis divaricatis
12. *amplexicaule* foliis floralibus oppositis amplexicaulis obtusis
13. *multifidum* L. foliis multipartitis

Sam. algenticum
an varietas *S. albi*. Tolia cordato-oblonga, villosula, obtuse serrata. Saccielli
approximati hepatici. Palyis laciniis lanceolata, parvis pungentior. Galea hepato-

Lamium

Lamium moldavica orientalis Ledeb. Verres et nis folio Tournef. Cor. 11.

Habitat in ~~Mold~~ oriente herb. Mus.

Cauli herbaceus, ramosus, glaber. Folia remotis, petiolata, cordata, obtusa, obtuse profunde serrata, glabra, pollicaria. Petioli folio triplo vel quadruplo longiores. Verticilli remoti 10-12 flori. Calycis acuti, glabri. Corolla purpurea; galea hispida, uti anthera.

barbatum Lamium

Habitat in Oriente herb. Desfont.

Caulis herbaceus, ramosus, villosus-subanescens. Folia inferiora petiolata: floralia
s. plicata, oblonga oblonga vel ovata, obtusa, pollicaria, basi attenuata, supra glabra
f. v. subtus subvillosa, pro verticilli post flori. Calycis villosi: laciniis lanceola
tis, inermes. Corollae labium superius hispido barbato, antheris croceis. Flores
unguiculares

Hesperidulum Lamium

Habitat in America boreali. Richard O

Caulis erectus, hispidulus, uti petioli et folia. Folia petiolata cordata, bipollicaria, obtuse profunde serrata, attenuata. Flores sessile
Flores sessile in axillis supremis et apice, solitarii, oppositi. Corolla glaberrima
vifida

integrifolium Lamium

Lamium Panetano facie Monf. Plukn Tab 41. fig.

Habitat herb. Desfont

Caulis herbaceus, simplex, superne villosus. Folia cordata, pollicina, basi nervosa venosa, utrinque villis raris adpressis, integerrima vel remote subserrata. Verticilli remoti, 8 flori. Calycis glabriusculi: laciniis setacea Galea villosa.

tomentosum lamium

Habitat ^{herbaceus} herb. Desfont.

Caulis villosus canescens, superne tomentosus, basi ramosus, vix perithamocut.
Dolia petiolata, unguiculata vel parum ultra, obtusa, obtuse serrata, villosa
incana. Verticilli remoti, 2-3 flori. Corolla et calycis villosa tomentosa
Calycis laciniis subulata

Lamium

Lamium orientale incanum flore albo cum labio superiore crenato Tournef. Cord. pag.
11.

Habitat in Oriente herb. Mus.

Caulis herbaceus, superne villosus, incanus. Folia petiolata, semipollicana, cordata, obtusa, obtuse serrata, villosa, incana, propositum superiora. Bractea subulata, calyce breviores. Calycis villosissimi, incani. Corolla calice hispida incana

multifidum L. foliis multipartiti Lin S. V.
Lamium orientale, foliis eleganter laciniatis Tournefort II.

Com. rar 267/26.

Habitat in oriente

herbaceus

Caulis erectus, pubescens, subramosus. Folia inferiora petiolata, oblonga, pollicaria, basi pariter decurrentia, obtuse serrata, vel serrata incisiva serraturis serratis, superiora sessilia, sesquipollicaria, incisiva. Florae tripartita. Corolla intus laciniolata remote dexte uno alterove notata, flore congrua, uti omnia glabra. Verticilli remoti 10-14 flori. Corolla hisp. usque herb. Mus.

Folia ovata glabra simpliciter venosa, vena major subtus reticulata
incisa: laciniis obtusa latera inferiora dentibus aliquot obtusis superiora
5, caudata. Bractea parva, ovata, mucronata. Calycis inani dentibus
subulatis

non vidi

ovata L. foliis cordatis inaequaliter acutisve serratis, corollis fauce inflata,
caulibus coloratis Lin. S. V.

Galeopsis maxima pannonica Clus. hist. 2. p. 33.

Lamium maximum Sylvaticum attenuum Bauh. pin. 231.

β. *Papua garganica*, foliis utriusque alternis et eleganter incisps, flore
purpureo Mich. gen. 20. T. 17.

Ovata garganica Spec. pl. pag. 807. +

Habitat in Pannonia, Italia β. in valle Garganica Apulia.

Caulis purpurascens ramiflorus glabrescens. Folia petiolata
cordata attenuata nervosa venosa, glabrescens attenuata
in profunde et inaequaliter serrata. Calycis ⁱⁿ ventriculo
quilo uniter 10 glabri. Corolla magna labium inferius
se dentatum superius quadridentatum.

β. Ovata garg.

Corydalis L. foliis cordatis rugosis, caule lani calycibus glabris longitudine
tubi corollae Lin. Spec. pl. 800.

Lamium purpureum non foetens, folio oblongo Bauh. pin. 231.

Galeopsis flor. purpurascente majori, folio non maculato
Bauh. hist. 3. p. 321.

Habebat in Libano, & Italia 2

Caules purpurascens. Folia serrata vix pubescentia. Verticilli
utroque 3 flor. Calycium dentes ventris suo duplo longiore
absque maculis ad basin. Corolla dentes laterales laterales can-
didati nec fetacii, antrosum porrecti: labio inferiore patente,
nec lobi reflecti paralleli Lin

negosum L. foliis cordatis acutis rugosis cauli busque pilosis, verticillis
multifloris, faucibus dentata unico setaceo Hort. kew 2. p. 296.
Lamium subrotundis rugosis foliis, flore rubro Bolæ mus. p. 35. t. 23.
Habitat in Italia 7

non vidi in herb. Schum.

molle L. foliis petiolatis subdentatis: inferioribus cordatis; superioribus
ovatis Hort. kew. 2. p. 297.

Lamium parietarie facie Monf. blaf.

Habitat

4

facile dignoscitur foliis subintegerrimis, nec serratis, nec crenatis.

Flores albi

non vidi

incisum L. foliis cordatis inciso serratis glabris attenuatis summis puber
colatis

Habitat in Italia

Caulis sequepedalis glaber folia tri vel quadripollucaria
nervosa venosa serraturis profundioribus quam in reliquis
verticilli remoti multiflori, corolla magnitudine lam. purpur
rei.

maculatum L. foliis cordatis acuminatis, verticillis decemfloris Lin. h. v. p. 374
Mey. fl. p. 8094

Lamium maculatum Bauh. pin. 231

Lamium alba linea notatum Bauh. pin. 231.

Lamium plinii montanum campoclarensum Colum. Euphr. 1.
p. 190. 199.

Habitat in Italia &

Caulis pubescenter ramosus ut pubescens. Folia petiolata
attenuata nervis venosa, profunde inaequaliter serrata
bis tri pollicaria verticilli 6-10 flori calycis glabri
affinis. albo. Divesim florum purpureis. foliis ana longitu
dinali alba, petioli non dilatati, florum utroque s
rei 10. galea carnis duabus ad osciput concurrentibus
lin

Lamium orientale nunc pro maculatum nunc perfectum magno flore
Tournef. Cor. huius forte pertinet secundum herb. Mus.

Cor. Euphr. 1908. 192

Papua ovala Michel. gen. 20. v. 17.

album L. foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis, verticillis viginti floris L. V

n.

Fl. Dan. t. 594.

ga leopis Cam. egypt. obs.

Lamium album non foetens, foliis oblongo Bauh. pin. 29.

Habitat in Europa cultis &

Caulis tetragonus villosus. Folia inaequaliter serrata.

Describendum ulterius

purpureum L. foliis cordatis obtusis petiolatis L. V. fl. Dan. 9. 23
urtica iners altera Rod. pempt. 157.
Lamium purpureum foetidum, folio subrotundo Bauh. pin 230
Habitat in Europa cultis O.
~~Lamium purpureum~~

describendum alterius.

canescens L. foliis cordatis serratis obtusis villosis canescentibus verticillis
6 floris
Ramum orientale, ineanum, flore purpurascente, cum lacinis su-
perioribus crenatis Tournef. bot. p. 11.

Habitat in Oriente

Habitus L. longati ad folia minora pollicaria obtuse inaequaliter
serrata villosissima canescenti virentibus. Dentes calycis ova-
to-lanceolatis latioribus quam in reliquis

6-7 bifidum Lamiium Lamiium foliis cordatis, corollam galea bifida: laciniis divan-
catis.

Lamiium parvum, flore albo, cum labio superiori bifido. Till. pup
herb. Pf. pag. 93.

Lamiium bifidum: foliis cordatis, acuminatis, corolla labio superiore
bifido laciniis divancatis Cyril

Legi Neapoli

Caules semipedales, decumbentes, glabri, basi ramosi.
Folia duo vel trium parium ^{inferne} in caule, in ^{parte} ^{apice} approximated,
densa ^{supreme} nulla nisi sub ^{verticillis} ~~floribus~~, inaequaliter profunde serrata,
attenuata, leviter villosa.

Verticilli approximati, 6. 8 flori.

Calycis villosi: laciniis subulatis anfractis.

Corolla magnitudine Lami purpurei: faucibus inflatis, extus
villosis; galea bifida: laciniis aequalibus, erectis, vix semunquam
culantibus

huc quoque pedicem videtur

Moldaviae ad rivum saxatilis Lamiifoliosae flore maximo Compos. cor.
at floris majores

amplexicaule h. foliis floralibus sessilibus amplexicaulis obtusis h. s.

v. p. fl. Dan. 8. 752.

mosui gallino, folio hederula, album Lobel. ic. 4 63.

Lamium folio caulem ambiante, minus Bauh. pin. 231

13. Lamium folio caulem ambiante, minus Bauh. pin. 231.

Habitat in Europa cultis O

Caulis basi ramosus. rami adscendentes tetragonis, striati. articuli elongati. folia ^{inferior} petiolata ^{remata} cordato subrotunda, venis utrinque 3. sublobata villosiuscula. floralium amplexicaulium veni ~~formia~~ profunde serrata superne confertim verticilli multiflori hispiti. Corolla tubi calyce triplo longior