

# Lathroea

1. clandestina L. caule ramofo subter<sup>re</sup>is, floribus erectis subsolitatis
2. Phelypaea L. corollis campanulato patentibus
3. anblatum L. caule simplicis spinis, corollis pendulis: labio inferiore trifido, calycibus hirsutis
4. squamaria L. corolla cum labio indiviso, (calycibus glabris)
5. atrofusca L. caule subramoso, corolla labio patente spinis trifidis

clandestina L. caule ramoso subterrestri; floribus erectis solitariis Lin. Spec.  
pl. parv. 843. 4

Planta clandestina f. Madrona Balch. hist. 960

Orobanche flore majore ex caule purpuriferae Bauh. pin. 31  
p. n. 04.

Orobanche f. dentaria aphylla ramulosa, caespite denso May  
hist. 3. p. 503. f. 12. t. 16. 4. 15.

13. clandestina, madrona, occulta Bonl. Cent. 1. obf. 30.

Habitat in umbroso gallica, Pyrenaeorum, Italiae &

Caules infra terram & inferne tuberculofus. superne aqua  
mosi corymbosus ut pedunculorum tantum supra terram  
eminent; solitarii pedumque in singulo pedunculo  
interdum terri floris ferè bipollicares

Atrorhiza lathraea caule subramoso, corolla latius patentissima

in pedis

Habitat ad latera montium Coromandelica minus frequens

hominis

Caules <sup>exter</sup> angulati, <sup>totius</sup> atrorhizae, <sup>rare</sup> pilosus, <sup>inferne</sup> ramo <sup>uno</sup> vel <sup>altero</sup>

Squamae subulatae, breves, inferni oppositi superiores alterni.

Flores suboppositi.

Capitula oblonga, calycis parum longior, mucronata, vix

semiquadrantari

*Phelypsea* L. corollis campanulato-patentibus Lin. l. V

*Phelypsea* *Leptanica*, flore luteo Tournes. Pl. II. cor. 47.

*Orobanchae elegantissima verna*, flore luteo Mon. bot. 3. p. 502+

β. *Phelypsea orientalis*, flore coriacea Tournes. corol. 47.

Habitat in hystano umbrosi &

flore superiore opposit. in speciem digesta, magni tubo  
calycis longioris superne ampliatus: bracteo ovato  
attenuata

Husf. videt esse <sup>varietatem β</sup> eadem ac *Orobanchae* *Ogneti*  
Lin. et genere diversa

anblatum L caule simplicifloro, corollis pendulis: labio inferiore trifido L. S. S.

~~fl. Dan. Dub. 1796~~

Anblatum orientale, flore purpurascente Tournef. corol. 4 10.

Habitat in Oriente 2

planta Neapoli lecta flor. facie convenit cum Syriamaria et flores  
remotiores penduli. Calycis hispiti labium tridentatum

planta herb. mei Dubito num lin.

quingueda L. caule simpliciter, spica undique imbricata, calycis corollaque  
quingueda Tost. fl. Ar. pag III

michi haud nota

grandis *G. foliis lato canaliculatis longispinis denticulatis superne hirtis infra  
glabris pedunculis terminalibus, caule arborescente Sw. prodr. p. 89.  
Habitat in Jamaica.*

*Genena ampla* ~~argutalis~~ foliis tomentosis Plum. w. 134

non vidi

*Squamaria* L. corollarum lobis indivisi fl. Soc. 5504 fl. Dan tab. 136

*Orobanchae radice dentata major* Bauh. pin. 88.

*Orobanchae radice dentata altius radicata, foliis et floribus  
albo purpureis* Monf. hu. 3. p. 503. f. 12. 8. 16. fig. 4.

Habitat in Europa frigidioribus umbratissimis &  
infra terram ramis squamis embriatis ovatis supra terram  
simplicissimis eribus teres carnosus squamis remotissimis  
quae ante florescentiam apice nudaant. flores approximati  
secundi dorso squamis embriatis.

ultenus describenda