

Lathyrus

x pedunculis unifloris

1. aphaca L. cinctis aphyllis, stipulis sagittato-cordatis
2. nosolia L. foliis simplicibus, stipulis setaceis
3. amphicarpos L. pedunculis calyce longioribus, cinctis diphyllis simplicibus
4. cicera L. cinctis diphyllis, leguminibus ovato-compressis dorso canaliculatis
5. sativus L. cinctis diphyllis tetraphyllois, leguminibus ovatis compressis dorso bmarginatis
6. fetifolius L. cinctis diphyllis, foliis setaceo-linearibus
7. inconspicuus L. pedunculis cinctis diphyllis simplicibus, foliis lanceolatis, pedunculis calyce brevioribus

8. angulatus L. cinctis diphyllis simplicibus, foliis linearibus, pedunculis aristatis
9. articulatus L. cinctis polyphyllis, foliis linearibus, stipulis inferioribus lanceolatis, pedunculis ^{semisuffrago}

xx pedunculis bifloris

10. odoratus L. cinctis diphyllis, foliis ovato-oblongis, pedicellis leguminibusque hispidis
11. annuus L. cinctis diphyllis, foliolis ensiformibus, leguminibus glabris, stipulis bipartitis
12. truncatus L. cinctis diphyllis, foliolis aeternis lanceolatis glabris, stipulis curvatis, leguminibus linearilanceolatis glabris tumidis

14. *Clymenum* L. *Cirsii polyphyllis*, internodiis membranaceis, stipulis sublinearibus
subtus

+ 77 pedunculis multifloris

14. *Hieracium* L. pedunculis *Cirsii diphyllis*, folioli lanceolatis, Leguminibus hispiti, pinnis
fiabris, pedunculis subtrifloris

15. *Tuberose* L. *Cirsii diphyllis*: folioli ovales, internodiis nudis

16. *pratense* L. *Cirsii diphyllis simplicifloris*: folioli lanceolatis, stipulis semipinnatis

17. *fulvotris* L. *Cirsii diphyllis*: folioli lanceolatis internodiis membranaceis, stipulis
subulatis

18. *latifolium* L. *Cirsii diphyllis* folioli lanceolato-oblongis, internodiis membranaceis, stipulis
ovato hastatis

19. *heterophyllum* L. *Cirsii diphyllis tetraphyllumque*: folioli lanceolatis, internodiis mem
branaceis, stipulis lanceolato-semipinnatis

20. *palustre* L. *Cirsii polyphyllis*, folioli oblongis, stipulis lanceolatis

21. *perfoliatum* L. *Cirsii polyphyllis*, stipulis ovatis folioli latioribus

tennifolius herb. Fus. forte a Commes. inter Commes. in arbutus
~~inter~~ specimen folia lanceolatae laule basi absque membrana
Stipula ovata acuta e monte vides

Lathyrus fruticosus caule fruticoso: pedunculis bifloris: foliis pennatis tomentosis
Fosq. Cavan: ic: 1. pag 50. Tab. 94
Habitat in Pens

in *Lathyrus* species an *Robinia* vel *Aphynomene*
^{potius}

Venuifolius - *Lathyrus* *cinis* *polyphylli*, *Legumina* *pedunculis* *bifloris*, *Leguminibus*
oblongis *glabris*

Habitat in *Bonaria* *herb. mus*

Caulis *filiformis*, *angulatus*, *striatus*, *glaber*, *uti* *totam* *plantam*. *Folia*
linearia *angustissima* 4-5-6. *opposita* *vel* *alterna*, *vix* *pollicaria*,
utrimque *acuta*. *Cinis* *simplices*. *Stipulae* *parvae*, *lanceolatae*
sagittatae. *Pedunculi* *petiolo* *breviores*, *semipollicares*. *Legumina*
semipollicaria, *glabra*, *lata*, *compressa*, 5-6 *perma*

Filicaulis lathyrus ^{petiolis di-} *caulis tetraphyllis cirrhosnullis, pedunculis unifloris*

Habitat ex herb. musci

Caulis filiformis. Folia petiolata. Solida duo vel quatuor, angustissima
semipollicaria, acuta, glabra subopposita. Stipulae filulatae, hastatae,
pedunculis foliis parum brevioribus, aristis brevis superne. Legumina li-
nearia, semipollicaria glabra.

Cinifolius Lathyrus cirrhos diphyllis, folioli stipulesque lanceolatis, pedunculis subqua
trifloris, Calycibus tomentosis

Habitat in monte video Commeson herb. Fusioi

Planta humilis, prostrata, basi ramosa: Rami simplices, inferne villosi,
superne subtomentosi: Efoliola pollicaria, angusta, uti stipula villosa,
Stipula hastato-ensiformis ² ^{centimetro} semipollicares. Cirrhus brevis. Pedunculi
elongati, tri-quadri-flori. Flores ad apicem pedunculi ^{sed villosi} ~~triflori~~ ^{triflori} ~~triflori~~ ^{triflori}
Calycer tomentosi: lacinis subulatis. Legumina pollicaria.

an varietas & eni ei
cum hujus varietas

axillans Lathyrus

Lathyrus axillans Lamour.

Habitat herb. La Mark.

Pischi diphylli. Foliole lineari-lanceolatae. Legumini axillari, solitari
brevis pedunculata, bipollicaria, acuminata, venosa

mi fallor Allionius habet

Vergidus Lathyrus

Lathyrus Vergidus Lamark

Habitat herb. Lamark

Caulis angulatus; glaber. Racemi 2-4 phylli. Stipula oblonga, dentata
in apice. Foliola opposita, oblonga, utrinque acuta, subpollinaria, glabra.
Legumina axillaria, solitaria, ^{sub}sessilia, ^{sub}pollinaria, vergida, glabra.

nervosus Lathyrus Cirrhæi diphylli oblongo ovati glabri, stipulis ovato sagittatis,
pedunculis multifloris, leguminibus glabri venosis

Habitat in monte vides Commeson Herb. Fus

Lathyrus nervosus la Marti.

Caulis angulatus, flexuosus, uti tota planta glaber. Foliola duo sessilia
ad basin petioli fere, bipollicaria nervosa, venosa, nervi venisque exstantibus
micronata. Stipula pollicares, lata ovata, sagittata. Cirrhæi tripedalis, elon-
gatus. Pedunculus petiolo ^{superiore} crassior, angulatus, subanceps, sub quinqueflori. Flores
distantes, magni. Calycis laciniis linearis-lanceolata. Legumina
tripollicaria, linearis-ensiformia, recta, apice acumine incurvo

Lathyrus

Lathyrus arao similis planta ex hispania musca Bodeia Stapel in Theophr.
pag. 39.

Habitat. ex herb. musci.

Culmi diphylli. Soliola lineari-lanceolata. Stipula sagittata. Pedunculi
uniflori, brevissimi. Legumina subrotunda-oblonga venosa reticulata, dorso
breviter nata. Culmus simplex
an Cicera Lin.?

axillaris Lathyrus cinski diphyllis, foliis linear-lanceolatis, floribus axilla-
ribus sessilibus

Habitat. Hort. Paris. ex herb. Desfont.

Caulis angulatus, glaber, spithameus, tenuis, erectus. Folia breviter petio-
lata: filiola sessilia, sesquipollicaria, utrinque acuta, angusta. Stipu-
la parva, semisagittata, lanceolata. Loco cinski spinula innocua.
Flores axillares, solitarii, parvi nutantes, suppedunculati. Anther-
pedunculi setacea, longa. Legumen rectum, lineare, bipollicare pube-
scens.

orobordes Lathyrus cinctus diphyllus, foliis lanceolatis, stipulis ovatis, pedunculis uni
floris.

Habitat in America Pommes: herb. Mus.

Caulis herbaceus, sicut pithamosus, striatus; superne membrana angusta decurrente.
Petiolo unguiculari. Foliola opposita, lineari-lanceolata, utrinque acuta.
Cinctus trifidus. Stipula folio latior, sagittata, longitudine fere petioli, pedun-
culis folio parum longioribus. Flores nudi, arista brevi versus apicem.
Petalis laciniis lineari-lanceolatis.

confer cum Lathyrus subflorus

sub biflorus ^{glaber} Lathyrus foliis conjugatis: folioli lineari, stipulis lanceolatis sagittatis, pedunculis subunifloris multiv.

Habitat in monte vides Comerson. herb. Guss.

Totus glaber. Siliola 2 esqui polliciana, sinata. Stipula ovata vel lanceolata, sagittata, integerrima. Pedunculi longitudine foliorum 1-2 flori. Flores magnitudine Orbis tuberosi. Legumina bubi polliciana, glabra. Calycis lacinae lanceolatae.

Subterraneus Lathyrus

Habitat in Europa australi

Caulis filiformis, basi ramosus; tami diffusi, palmares vel ultra.

Ignoramus Maud pind. in amphicarpe: Cradus honorii Plus. exot. 87. 49
D. à Linnæo ad Lathyr. amphicarpum velotum huius pertinet sive proterea
Magn. bot. Monip.

variat foliis angustifolii acuti et lineari emarginati cum denticulo
descriptis ulterius huiusmodi specimen a Desfont. Donatum petenda

Licia amphicarpos leguminibus subterraneis ovatis inflatis submonopetalis
caulibus foliis teretibus polyspermis, foliis imis obcordatis acutis, caulibus
pennis linearibus Jorua herbosif. Monspel. pag 40

Senecio Luthymus ^{foliis} villosus-tomentosus, pedunculis subquadri-flori, ^{foliis conjugatis} foliolis linearibus.

Habitat in montibus sive Comma ex herb. Tusci

infima ungui breviter petiolata, mucronata, & nata, pollicaria, Petioli caespitose
Culana
Caulis uti tota planta ~~tomentosus~~ villosus-subtomentosus, & ter rugosus. Folia
absque cinctis, intermedio simpliciter cincto, superioribus trifido, petio-
lo longiore. Stipulae semi-pollicares, inter agerinae. Pedunculis longis,
caule fere crassior, angulatus. Flores tres vel quatuor, magni.
Calycis lacinia lanceolata. Legumen bipollicare, villis densis
nitidis tectum.

~~B. an huius vel limph~~ variat major vel minor villosus, foliis polli-
cibus et bipollicaribus, cinctis ^{omnibus} nullis loco eorum sicut. foliolis ob-

^{trifidis, unguibus vel acutis, pedunculis 3 vel 4 flori.}
B. an huius varietas foliolis unguicularibus, tomentosioribus; foliis
numerosis, caule alternatim determinate ramosus, petioli brevis
simis. Flores non aderant

V. absque floribus, foliis superioribus cincto simpliciter recurvo, folio-
lis parvis majoribus quam in B. stipulis superioribus lanceolatis,
petioli squandibus

nigrescent lathyris cernuis distichis ensiformibus, stipulis lanceolatis sagittatis,
pedunculis multifloris.

Habitat in Peruvia ex herb. Fusf.

Totus glaber Caulis angulatus. Foliola bi-tripollicaria. Stipulae
pollicares, petiolo longiores.

neges ~~Lathyrus~~ ~~Certhia~~ ~~Daphyllis~~ ~~erisporonides~~, & ~~peulis~~ Cunicolatus pagittatus, fr.

magellanicus ^{canerolabo-} Lathyrus cirrhosus diphylli oblongus, stipulis ovatis foliolis latioribus pedunculis multifloris

Habitat ad fretum magellanicum Commes. est herb. 4 usq.

Totus glaber. Caulis laxis, subperthamidi. Folia remota, inferiora absque cirrho, superiora cirrho composito. Soliola pollicaria, vel parum ultra, interdum angustiora, interdum parum latiora multinervi. Stipula semipollicares nervosi, cordatae. Pedunculi 4s. purpureo coenulescens. Calycis laciniis subulatis.

magellanicus Lathyrus pedunculatus var.

angustifolius Lathyrus

Habitat herb. frutesc.

Caules tenues angulati. Foliola angusta, striata serpi pollicaria. Stipulae subt
lat^o sagittata auriculo angustiore. Pedunculi filiformes. Flores parvi. Seta pedun
culari flosa longiore. Legumina bipollicaria, compressiuscula glabra, suberiformia

Subquedoniflorus Lathyrus

Habitat in America meridionali Commes. herb. Mus.

Centri Diphylly: foliola linearia, acuta. Centri fm in petiolis superioribus
simplicibus, vix pollicares. Stipula lineari lanceolata hastata. Petio
lo longiores. Pedunculi 2-3-4 flori. flores purpurascens

Descript. ulterior a praesentia.

pubescens Lathyrus villosus, Cirsium diphyllum, foliolo oblongo, stipulis ovatis hastatis.

Habitat in Bonaria Commerson Herb. Fus.

Totus villosus. Caulis tetragonus, crassitie pennis anserinis, striatus, flexuosus, ^{in calatibus} Colea prope basin petioli, pollicaria, ^{lata} multineura, mucronata. Petioli spithamei, validi, triquetri. Cirsium quinato pinnatum. Pedunculi striati, petiolo crassiores et breviores, angulati, creiter viginti flori. Calyx tomentosus: lacinis subulatis.

1 Aphaca ²⁵ Cirrhii aphyllis; Stipulis sagittatis cordatis Len Spici pl. pag. 10294

Aphaca Lobel. ii. 2. p. 70.

Vicia lutea, foliis convolvuli minoris Bauh. pin. 345.

Habitat in Italia, Gallia, Anglia, Helvetia inter segetes ☉

(cultura)

Caulis angulatus absque membranacea ^{ulla} deumate glaber striatus
ab altero latere
Cirrhii inter stipulas simplicissimus. Stipula lata pollicares
pedunculata ^{stipula longa} cirrho brevior
basi inferne interdum denticulo uno alterove nervosa
pedunculus cirrho brevior superne geniculatus flores fla-
vescentes. Calyx longitudine fere corollae. Ramulus interdum
ex axillis foliosus interdum folia duo conjugata ^{va lanceolata} ad rarisime ten

Lathyrus ex stipulatus Gmel. St 3. 11. 307. 433. fig. 2

2. *neofolia* L. ^{setaceis} foliis simplicibus, stipulis subulatis. Lin. S. V

neofolia parva flore purpureo Buxb. cent. 3. p. 04. 4. 45. fig. 1.

Lathyrus sylvestris minor Bauh. pin. 344.

Lathyrus angustifolius erectus, foliis singulatis, sine capiteolis, *neofolia* Magnol. hort. 112. t. 112.

Habitat in Gallia Anglia Hispania &

(Frout)

Caulis squipedalis striatus glaber angulatus, membrana nulla decurrens. Folia remota sessilia lancea linearis lanceolata attenuata nervosa quadripollicaria internodiis longiora. Stipulae duae nudae sine pediculis. Pinnis nullis. Pedunculis foliis parvis brevior ap. versus apicem aristatus. Flores parvi. Legumen ut in *Lath.* inconspicuum linearis lanceolatum nervosum surgidum bipollicare.

3. amphicarpos L. pedunculis calycis longioribus; Erbii diphyllis simplicissimis
An. f. v.
radice similes supra et infra Terram flegreas gerens Bauh. pin. 345
Lathyrus amphicarpos f. supra in fraque Terram flegreas gerens Monf
hist. 2. p. 51. f. 2. t. 23. fig. 1.

Arachnida f. Arachoides honorii Belli Bauh. hist. 2. p. 323.

Lathyrus pedunculis uni flori, Erbii diphyllis radicibus etiam sub
Terra fructificantibus Hort. Cliff. 3. 674

Habitat in Syria ☉

Radix filiformis hinc inde tuberculis ovatis sessilibus instructa
Caulis plures in formi accipites. foliola ^{expansis} canaliculata. Stipula
ovata acuta basi in denticulo producta. caules alii, foliis nudis
vase stipuli sub terra repentes, floris et fructibus ferunt, absolute
perfectos et caulium similes, sed minoris cum expandi nequeant
in Legumina oblonga semipollucana

7. incenspicuus L. pedunculis calycis brevioribus, cinctis diphyllis simplicibus;
foliis lanceolatis Lin. Sp. p. 1030 ^{7aequ.} hort. 86.

Lathyrus orientalis, flore vix conspicuo Boeth. huyd b. 2. p. 42.
~~Habitat in oriente C.~~

Lathyrus coccineus All. fl. Pedem. n. 1221.

Habitat in Italia et oriente

Planta pedalis glabra. Caulis triquetri sub inferne ramo uno vel altero
folia breviter petiolata, nervosa foliola angusto lanceolata nervosa
in quinque attenuata subtripollicaria. Petioli inferiores ^{inquinati} terminati
seta, superiores in circulum filiformem indivisum foliis brevioribus
et longatis. Stipula subulata ~~sum~~ basi in dente pedicis ~~est~~ longitudine ipsius
stipula subdivanata. pedunculus vix ullus. Corolla calycis vix
longior pallida vel purpurea legume longitudine fere foliolosum
veriuscūtum apice subulato exiformi linceis elevatis subvires
sum ^{interius turgidum} fructum. semina globosa.

all. non differet fide speciminis a Bellardi communicata

mont.

6. *setifolius* L. *carthusi* *diphyllis*, foliis setosis lineari-bus Len. N. p. 662 x

Lathyrus angustifolius f. *capillare* folio Bauh prod. 140.

Lathyrus sylvestris major, *angustifolius* folio Bauh pin. 344.

Lathyrus folio venosus, floribus rubris Bauh hist. 2. p. 300.

Habitat *Montpelii* *Paldo* *Italia*

^{plures basi interdum carnosae, sesquipedales}
Caulis *venosus* *triqueter* glaber simplicissimus. Petiolis foliolis multoties
^{folioli longior}
brevior, *carthusi* *trifidus*. *Ripula* *subulata* latitudine fere foliorum
positivè *dente* *setosis*. *Foliola* fere *tri* *pollicata* *sub* *filiformia*
Pedunculis *foliis* *dionidis* *brevior* *superne* *geniculatus*. *Legumen*
oblongum *altero* *latere* *convexo* *altero* *recto* *apice* *hamoso*
basi *acuto*, *tri* *sperrum* *glabrum* *compressum*.

pedunculis *calycis* *longioribus*

S. angulatus L. pedunculis aristatis cinctis dyphyllis simplicissimis, foliis
linearibus. An. h. v. p. 662 x

Lathyrus angustifolius Leptolobus, semine hexaedris, flore 2 onules
Monf. bot. 279.

Lathyrus folio tenuiore, floribus rubris Buxb. Cent. 3. p. 23.
Tab. 42. fig. 2.

Habitat in Gallia, Hispania, Oriente ☉

Caulis filiformis, angulatus, sesqui pedales. Folia conjugata linea-
ria. Stipula linearis subulata, sagittata. Pedunculi longitudine
folii, anthe setacei. Legumen sesquipollicare, glabrum, lineare
a set folio differ leguminibus linearibus nec oblongis hab. mus

seminibus hexaedris

non vidi

Sphoricus L. cinho diphyllo simplicissimis, foliolo ensiformibus
pedunculis anfractis seminibus globosis Petz. - obs. 3. p
pag 39.

Habitat.

non vidi

4 Cicera L. Erihis diphyllis, leguminibus ovato compressis: dorso canaliculatis
Linn. fruct. pl. pag. 1030x
Arauc. f. Cicera Dod. pempt. 523.
Lathynis fabris flore purpureo Bauh. pin. 344.
Habitat in Hispania ☉

cum specimen hujus uti et in sequentes in herbar. sine fructu ad sua descriptionem
~~in alio~~ in ~~herbar.~~ non adhibeo usque dum meliora ad dantur

5 Lathyrus L. Cirrhos Diphyllois Tetraphyllique, Leguminibus ovatis compressis
Dorso bimariginatis lin. l. v

Lathyrus annuus, flore coeruleo, octavi filiqua Herm Lugd.

³⁵⁷
β Lathyrus / cirrhosula Dod. prompt. 522.

Lathyrus sativus² flore fructuque albo Bauh. pin 343.

Habitat in Hispania, Gallia &

hab
mus (Lathyrus luteus latifolius Bot. Monsp.
Lathyrus boottianus flore futes Parkin. qui gaudet et folio angustis
a n varietas fectus

9. articulatus L. pedunculis subunifloris, crinis polyphyllis, folioli ^{cineanibus} alternis
Stipulis inferioribus ^{concoloratis}
407. Upf. 217. * Flor. pl. pag 1032. *

Lathyrus angustifolius folio, americanus variegatus Bauh. pin.

^{344.} Clymenium hispanicum, flore varis, siliqua articulata Tournef.

f. R. H. 396. Mell. Dict. t. 96.

13. Lathyrus angustifolius humilior Bauh. pin. 344.

Habitat in Boetia, Mospeliu Batana O

Caules sesquipedales ^{scapus} teretri glabri inferne saepe flexuosi sim-
plices s. fimi. Petioli inferiores canaliculati nervosi acuminati
aphylli pollicares, insequentes foliosi crinis simplicis ^{capiti} superioris
trifidi vel subpinnati. Foliola quatuor vel sex alterni
linea mucronati, in culta par latioris in spontanea fere ut in
setifolio ad duplo breviores. Stipulae inferne nullo superiore
canaliculata. Pedunculus folio longior uniflorus superne
geniculatus aristatus arista sub setacea semunquiculari.
* Flore magnitudine Lathyrus sativi legumen canaliculatum
compressum s. s. spermium glabrum

Mont an stipula integerrima

10 odoratus L. Cirrhus diphyllis, foliolois ovato-oblongis, ^{pedicelli} leguminibus $\frac{2}{3}$ hirsutis.

Lin. S. V

Scutell. a. Lathyrus distoplatyphyllos hirsutus mollis, magno et peramono flore

Dodon. Commel. hort. 2. p. 219. t. 80.

Zeylanicus β . Lathyrus zeylanicus; odorato flore amono ex albo et nigro vario

Burm. Zeyl. 130.

Habitata in Siccis β . in Zeylona \odot

Cultra Zeyl. Caulis uti petioli, membranaceo a lati. Folia elliptica mucronata ^{plenumque oppo}
Petioliis per juvenem pubescentes, adultiori pilis raris adpersi sca ^{lita}
briusculi. Cirrhii trifidi: stipulo lanceolato subhastato an
tato. Pedunculi ^{ut β Zeyl. α} triplori. Pedicelli pubescentes flores
magni in \odot orati.

d Lathyrus disto. platyphyllos hirsutus mollis magno et peramono flore

Hort. Cath.

herb. 4usj

11. annuus L. Cirsium diphyllum, folioli ensiformibus, leguminibus glabris, stipulis
bipartitis L. 1. V

Lathyrus praecox Lutea Bauh. hist. 2. p. 304.

Habitat in Hispania, Montpelie C

Stipula subulata pedunculi subinflori floris fl. lutea

12 Unguiculus L. Corchis diphyllis: folioli alternis lanceolatis glabris, stipulis linearibus
Len. l. v. Jacq. hort. 4. 46.

Lathyrus trigintanus, filiquis orobi; flore amplo suberrimo Morif.
hist. 2. p. 55. f. 2. 4. 3. fig. 1.

Habitat in Mauritania O

Caulis ramosis utroque margine tenuifoliaceis decurrente. Petioli
angulati. foliola subtus nervosa brevissime petiolata, interdum
opposita. Corchis simplex, bis trifidus. Stipula lanceolata
basi producta. Peduncululi interdum uni flori vel biflori in
eadem planta. Corolla magna inodora. Legumen ^{angustius} subcompressum
subtorulosum 6 vel 7 sperma. Semina vix angulata at fusca
atroque varia

in potius Corch.
latis glabris turgidis

Leguminibus linearibus lanceis

hesperus L.

13 *Clymenum* L. *Cirrhio polyphyllis stipulis dentatis*. Len. L.V
<sup>internodius membranacei
publunatis</sup>

Clymenum hispanicum flore vario filiqua plana Tournef. G.R. 4.
p. 396.

Cathynis sicoides, sexillo rubro, labialibus petalis rostrum ambi-
entibus conulis Monf. bot. 2. p. 46. Plukh. f. 114. fig. 6.

Habitat in Mauritania oriente ☉

(Cultor)

Caulis membranaceo alatus glaber. Foliola brevissima petiolata alterna
distancia, ^{peru} bipollicaria lanceolata nervosa venosa, saepe crasi-
fera. Petiolus membrana decurrente alatus. Cirrhio decem-
fido. Pedunculis foliis longior saepe trifloris. Flores distantes
magnitudine *Cathyni* fatis. Stipulae in mea non dentata potius
semiovato publunatis

~~in quibusdam~~ ulterius num specimen meum potius articulat. albis multo
vix. Tamen credo

^{herpeticus}
~~herpeticus~~ L. pedunculis subtrifloris, cirsii di phyllis, foliis lanceolatis, legu-
 minibus herpeticis, seminibus scabri Lin. l. V. pag. 663 *

Lathyrus angustifolius, flegua herpeticus Bauh. pin. 344.

Lathyrus flegua herpeticus Bauh. her. 2. p. 305.

Habetur inter Anglos et gallos segetes O

culta

Caulis e membrana tereti decurrente angulatus glaber. Foliola
 lineari lanceolata, basi parum angustiora apice obtusiusculo
 mucronata bipollicaria obtusa nervosa cirsii decomplicata,
 petio breviss. Stipula lanceolata postica setacea. pedunculi
 foliis longiores 1. 2. 3. flori bractea minuta setacea ad basin sin-
 guli. Legumina lanceolata compressa utrinque acuta,
 juniora sericeo nitida. pedicelli glabri

15 *Tuberopus* h. *Cirsii* *diphyllis*: folioli ovalibus intermediis nudis. Len. L. V

Apicis Eueh. h. 131.

Lathyrus arvensis repens *Tuberopus* Bauh. pin. 344.

Habitat inter Belgii, Geneva, Tataria, Syctes 4.

(culta)

Caulis triquetus glaber. foliola polliciana glabra venosa, minus
nata petiolus semi anguiculans triquetus *Cirsium* *trifidus* *Sti*
pula lanceolato-subcuneatis angustatis. flores 3 ad 5 in singulis
pedunculo Pedunculus foliis multo longior. Bractea setacea
ad basin singuli pedicelli. Legumina

16 pratensis L. Cirsii diphylli simplicis formis: foliolo lanceolatis Len. Spici pag 1033.
Fl. Dan. Tab. 527.

Lathyrus sylvestris luteus, foliis viciae Bauh. pin. 344.

Lathyrus luteus sylvestris dumetorum Bauh. hist. 2. p. 304. t. 304.

Habitat in Europa pratis &

Caulis absque internodiis membranaceis debilis. Cirsium plerumque
indursum interdum trifidum. Stipula lanceolata sagittata.

Pedunculus elongatus uniter sex florus. Calyx pubescens flori-
flavi

17 Sylvestris L. ^{lanceolatis} crotchi diphylli: foliis ensiformibus, internodiis membranaceis

Len. f. V. fl. Dan. t. 525.

Lathyrus Sylvestris Clus. hist. 2. p. 129. Dod. pempt. 523.

Lathyrus Sylvestris major. Bauh. pin. 433.

Habitat in Europa praevalens montosi & crotchi trifidi

(Sprock.) Caulis alatus. Folio ^{la} tripollicana nervosa venosa oppropta
mucronata. Stipula subulata angusta parva. Peduncululi 3
quadriflori longitudine foliorum. Legumina

— Stipula subulata

10 *Cat. foliosus* L. *Cynhis* *diphyllis*: foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis
Lem. p. 5

Lathyrus cat. foliosus Bauh. pin 344. Gand. 271. & 271.

Lathyrus major cat. foliosus, flore purpureo speciosior Bauh. hist. 2. p 303.

Habitat in Europa septentr. &

(Culta) *cruchi* *pinnati*: Petiolus valde dilata membranaceo dilatatus
folia longi foliolo triplo brevior. foliola ex nervosa venosa.
Peduncululi septemflori. bractea petalica. Stipula ovata
hastata legumen.

— Stipulis oblongo sagittatis

~~Differentia melioris requiritur inter hanc et Sylvest.~~

14 heterophyllus L. Cirsii diphyllis Tetraphylloque: foliis lanceolatis, internodiis membranaceis L. 1. V

Lathyrus major Narbonensi angustifolius Bauh. hist. 2. p. 304.

Habitat ad radices montium Europae &

(Cuesta) ^{sub} Caulis uti petioli membranaceo alatus. Folia opposita sessilia
lae utraque acuta nervosa venosa, mucronata bipollicia
na et ultra. Stipula lanceolata ^{antrata} semipinnata unguiculari-
cirsii compositus. Pedunculus petiolo duplo longior floribus
circiter decem fl. bractea pinnata parva ad basin singuli
legumen
foliola etiam lineana

stipula lanceolata sagittata

20 palustris L. ^{folioli oblongis} cinis polyphylla, stipuli lanceolatis L. S. V. fl. Dan. V. 399

Lathyrus peregrinus foliis vicia, flore subinde pallidore purpureo
fiante flore Bauh. pin. 344.

Vicia lathyroides f. lathyrus vicia formis Pluken. alm. 307.
V. 71. fig. 2. at folia lanceolata

Lathyrus palustris, flore orobi nemorosus sereni Rupp. gen.
p. 260. t. 1. *

Habitatio Europa borealis paucis paludosis ^{et Am. boreali} ^{hab. Thunb.}

Sci. spec: cultum Caulis triquetris glaber. Foliola fere oblonga, ^{alternis} ^{di. Kantia}
mucronata brevissime petiolata ^{noctujani} ^{nervosa venosa} glabra. Stipula parva lanceola
to semisagittata postice producta integerrima. Corhus trifidus.
Pedunculis cinister & flori longitudine foliorum.
Foliola fere orobi tuberosi

~~caesp. ad h. lath. pap. formis~~

21 pififormis L. cirrhis polyphyllis, stipulis ovatis foliolo latioribus Lin. Dec.
39. 4. 20. Ind. pl. rar. 1034 +

Cathynis pedunculis multifloris, cirrhis heterophyllis, stipulis maximis
Gmel. fl. sib. u. p. 741.

Vicia pedunculis multifloris, foliis ovatis, stipulis maximis
Hall. Gött 295.

Habitat in Siberia v

Habitus Pisi: Caules ex alis tribus angustis decurrentibus acute angulati
tota glabra. Foliola 6. vel 8. alterna brevissime petiolata, oblonga
pollicaria extrosum mucronata, per ^{superior} penna approximata

Siphago an potius
lanceolata cordata
occidendo
Cirrhus pennatus. Stipula folio mucronata basi dentato-an-
gulata (saltem in culta) inferiora vix postica pennifragitata
Pedunculi longitudine foliorum flores cuncti novem vertillo
et alii albidis venis purpureis. Foliola convoluta ut in Pisi
Stylus supra longitudinaliter barbatus. Legumen.

Spec. cult

14. Lerman P

Lathyrus pilosus Retz.