

Laujena

1. *Laujena* L. foliis oblongis obtusis integris membranaceis nitidis, racemis dichotomis,
fructibus bicellularibus
2. *Laujena* L. foliis lanceolatis utrinque attenuatis acutis nitidis racemis
fructibus bifidis pedunculatis
3. *Tomentosa* L. foliis ovatis acutis integris subtilis tomentosis, racemis dichotomis
fructibus bicellularibus
4. *odorata* L. foliis subrotatis acutis glabris, caule subspinoso, racemi panicu-
tatis, fructibus quinquelocularibus.

coriacea

opaca

Paganica f. et gen. Arch. Distinctum genus
Laujena à Genesia quæ illa videtur Richard

Dependens - Laugeria

Laugeria dependens foliis ovatis acutis, spicis brevibus paucifloris dependentibus, bracteis numerosis, fruitibus trigonis. Flor. Bonn. 2. pag. 23.
Tab 145. fig. b.

Habitat in Pennis nemori bus. 5

Arbor sextoryzalis. Truncus erectus, ramos is Benuo. Ram. ad ultiores, globosimi cinerari, fascies nigrescentib; maculati, subteretes: per ramos foliosi, obsoleti tetragoni, pilosae cetera, ferruginea. Tola approximata decussata, ovata, acuta, integerrima, bulbis pubescens, ferruginea, venosa et rima, supra non desculpa, per venas pubescens. Petiolae arcuatis semiteretes. Stipula petoli dimidiato brevior, ~~cordata~~ laniolata, acutis folia oblonga, ex rorsum conduplicata, adpresso, purpureo cetera, decidue, pubescentes. Pedunculi supra ocellati, soldati bi fidi, longitudine ferre petiolorum. Spicis conjugata, breves novemflora, patentissimo, tan dem dependentes, recte. Flores secundi: Bracteis numerosis primo cadu co. Calyx 5 quoddentatus. Corolla tubus purpurascens. Limbus albus lumbriacus. Dimplo oblongo velutie coronata. Nutr. trigona, trilobulans runcis, bilobulans, sive quadrilobulans

hirsuta Langiana

Langiana hirsuta foliis oblongis acutis, specie longis multifloris vero
latis, bracteis magnis, fructibus pedagonis &c. Penn. 2. pag. 22. tab 145.

fig. a

Habitat in Penuria nemoribus.

Arbor 30 ulnans. Ramæ seniores subteretes; glabri; cinereo-fusci. Venae
tetragonono-compressæ; foliosæ; hirsutæ; lutescentes. Folia petiolata, oblonga
acuta, integrifolia, subtiliter pubescens, venosissima rugosa, supra
folia elliptica per venas hirsuta Petoli Veretorum, besqui pollucaro, pubescentes. Ite
coronata pulpa magna, purpurascens, ovata - lanciolata acuta, erecta,
attenuata marginibus retroflexa. Pedunculi supra axillares, solitarii, bifidi
de hotomique, longitudine ferre petiolorum. Specie genere multifloris
revolutis, longo - & loco secundi. Bractea ovata, longitudo calyx
subpurpurea, persistenter. Calyx purpureo - et super dentatus. Corolla
alba - Dnige magnitudine nisi hirsuta, Neat 5que locularis, penta
zona fl. Per.

Pedunculi bifidi breves - lumbis corollo fimbriatus

lucida Laugeria foliis oblongis obtusis integris membranaceis nitidis; racemis
duodecimis, & rupis nucib[us] bilocularibus Sw. prodr. pag. 40. Tab. no[n]
Ex Grisea H. Pnici missis Dr. Von Rehrt et West.

Rami teretes, glabri contice cencio, superne e capa foliorum cicuticato.
Folia serp[er]t apices ramulorum, ^{confusa,} coria, petiolata, opposita, bis tripliearia
glaberrima, nervosa-venosa, integriforme

Pedunculi ex ax

Racemi ex axillis ultimus foliorum terminalium, foliatis, oppositi,
longitudine foliorum, bifidi, apice reflexi; feruntur in Tourefortis
Flore breviter pedicellati, diffaderunt, secundi, in latere anteriori
pedunculorum.

Calyx parvi, glabi, quinquefidi

Corolla glabra.

LVII

(Figurem addo Tab. est speciminiis in punctu vini aservatae

marginata Languza foliis oblongis glabris submarginaliter spicis axillaribus
bifida divaricata.

Tournefortia bifida La Mart. T. Enc.

Habitat in ^{pple de} France et
Rami glabri Terete ciliati supero apice ope lato pube-
scentes folia versus apices ramorum opposita petiolata ante
gerrima margine venae glaucoante cincta oblique venosa subtus.
pallida parum acuminata, usque polliciana Venella ope lato
pubescens. Spica axillaris opposita folio brevioris bifida
pedunculus capite compresus oculo armato ac calyces pubescentes
flores pauci parvi. Calyx superus subquadratus
fructum quidem non vidi totius autem habet Languza

~~nicotiana Malva~~

~~malva nicensis caule piloso decumbente herbario, foliis pub-odatis sparsis
lobis lobis acutis, pedunculis erectis All. fl. pedem. no 1416. Baran.~~

~~Duf. pag 79 tab. 25 fig. 1.~~

~~Habitat in Europa australi &c. ①~~

Langeria resinosa, foliis lato-lanceolatis glabris & subtili glaucis, spiculis axillaribus bifidi, ramis apice resinosis

Habitat in altis montibus insulo Montserrat Ryan.

Arbor octopetalis. Rami inferne teretei glabri, coccinei cinerei, superne angustati, & superne granulo-pulverulentati, angulati, & stipulis persistentibus infra folia annulati, apice valde retinosis.

Folia versus apicem ramorum, petiolata, conferta, opposita, lanceolata, bi-serrata Tripolitana, petiolam lata, interdum quamquam angustiora, acuminata, basi apieque acuta, integerrima, utrinque glabra, simpliciter subtilis & sine venosa, supra nitida, subtus glauca: supra maxime viscosa glutinosa.

Petioles brevissimi. Stipulae margo membranaceus, subinquisitus, subciliatus, ramum cingens

Pedunculi axillares, solitarii, longitudine pere foliorum, compresi, sursum versus sensim parum latiores, strobili, purpurascentes, bifidi: rami divaricati, vix petiolares, subtili convexus tuli. Flores sessiles in latere superiori ramorum pedunculi, conferti, basi resinosi.

Calyx margo crenatus, integerrimus, oculo armato ciliatus.

Corolla hypocrateriformis, unguicularis, glaber, glutinosus. Tubus superne vix amplior. Limbii Locinio oblongo, planumque quinque, ransimone quadrator.

Stamina - Filamenta fere nulla. Anthers superne in tubo, plenumque quinque, raro sive
quatuor, lineares, tubo inclusi non longiores capaces.

Germen sub rotundum, glabrum. Stylus longitudine tubi carolla. Stigma capitatum,
ovulo armato subtuncinatione

Drupe oblonga, umbilicata, magnitudine pisi. Nucleus Pudamen osseum, oblongum
quadricoculare: loculis monospermis.

Variant species laugenae numeris locularum loculamentorum pudamineis,
sope maturitate unum vel alterum quoque evanescit. Genus a genet
tardiori panem diversum et forte non absolum fort. Cum eo conjugere.
Paganam Aubletii genere a laugenae non differre contendit Ryan

Lauigeria

Lauigeria coniacea foliis elliptico-ovalis subconicae utrinque glabris obtusisca
lis; spicis bisbifidae, floribus tetrandis

Habitat ad summatales montium in insula Montserrat Ryan

Arbor humilis. Rami superne compresso tetragoni, glabri, contum cinea
sciente, punctatae.

Folia petiolata, opposita, bipinnata et ultra, subconiacea, elliptico-
ovata, integerrima, obtusiuscula, utrinque glaberrima, aenea,
obsoleta nervosa, subtus pallidiora.

Petiolis unguiculatis, supra canaliculatus, subtus caninatus.

Spica et aliis superioribus, opposita, plenimque bisbifida, rami bifidae cum
spica simplici inferiore, pedunculata. Pedunculus communis erectus,
bipinnatus, purpurascens, glaberrimus, compressus, subtriangularis :
particularis tripinnatus patentissimi. ~~Florae~~ in latera superiora, sessiles
secundi, sessiles, frequentes, alterni, distantes, sequentes.

Polyx margo superius, brevis, inqualiter subdentatus subquadridentatus.

Corolla monopetala, virga semiunguiculata, tubulosa, glabra, excepto superne vallis ali-
quot rariori bus oculo armato videtur. Laciniis lenti, tres quatuor, breves, rotundatae

Filamenta viri alla. Antero quatuor, in medio tubi, lene ares.
Germen inferum, minutum. Stylus longitudine fere tubi corolle. Stigma subcapitatum
obtusum.
Dripa oblonga, unguiculata, acumine obtuso terminata. Racemos quadrangularia.

guanensis Pagamea Aubl. fl. gu: pag. 112. tab. 44

Habitat in Guiana.

Frutex octopetalus, ramosus rami terete post capum ^{superlatim} expalatum
annulati; articulis brevissimi. Cilia petiolata, opposita, can-
colata, utrinque attenuata, glaberrima venosa, integer
riona pubes pallidiora triplicata. Stipula intra folia
cea tubulosa truncata brevis tamum ambientem marginem tenet
membranaceo pubescentia. Pedunculi axillares, et termina-
les foliarii Flores late spicati

opaca L. folia lanceolata lacinolato - elliptica opaca glabres-
cens terminalibus lati

4. 2 gyna Flores multi cyano: character different. spec: haud optima

Homentosa L. foliis ovatis acutis integris subtus tomentosis, racemis dichotomis,
Drupe nucce bilobulani. Sw. prudr. pag 40
Habitat in Jamaica

non vidi

odorata L. foliis subovatis acutis glabris, paniculis subfusco; racemi paniculatis,
racemi paniculatis, ramosi racemis quinquefoliis cibinis sur. p. 33 v. nov 44
Languida odorata Lin. s. V. p. — S. V. p. 234 Taegu Amer. tab. 177 t. 2.

Edechia Loefl. d. 306, 271. 259

Habitat in America

Trudet erectus 10 pedales ramosus. foliis bipinnatis, opposita petio
late subovato, acuta integerrima glabra. Raceme axillaris
paniculati, latti flores triflori floribus nubentes, noctu ^{ramulos} per
majorum molles attemoni, variat spinis et absque.

non vidi

Specie quettadae f. und. Ruth non que Corulans

refinosa Laugeria? foliis lanceolatis ut nique attenuatis, ^{netioides} raceme bifidus

habitat in Paniboi

Rami Verdei glabi superne angustos apice una cum foliis refinosa

Talia petiolata, ^{petiolata} opposta, lanceolata, acuminata, integriflora, glaberrima, loricaria, bipinnaria.

Petiolis brevissimis

Stipula intra foliacea, tubulosa margine submargine branacea

Pedunculus articulans longitudine folii erectus; foliatus; glaber versus apicem compresus dilatatus; bifidus. Divisi pollicianibus patentibus
floris sessiles secundum erecti, refinosi

Bracted nullæ

Calyx margo integer superus

Corolla tubulosa calyx' multo longior

filamenta virilla in fundo tubi. Anthers lineares longitudine tubi

Stylus simpliciter lineans longitudine tubi. Stigma simplex caputatum acutum.

Hipule ut in Crithali et corolla tubulosa. Stigma non lineans id eoque al Hamellia diversa

Primum Corolla supera supera sti. Calyx, ad divisi. flor: monop: superis transversa

Luedia Lang. foliis oblongis obtuso integris membranaceis nitidis, racemos
dehiscens, drupis nucibus bilocularibus Sw. prod. p. 40. Coefl. t. 270.
n. 15⁴
Habita in India occidentali, jamaica

se ad

an genus Languis cum Quellardo conjugend antem planum in
terre different ut sit separantur. si as sociantes nomen potius
ent Mathiolo, antiquo genere nomen ant quem debet tribuend