

Laurus

Laurus nil aliud est quam Laurus foliis ovato lanceolatis Yucca
nisi breviter longiusque herb. Thunbergii et Guss.

7 77

glauca Launus foliis oblongo-lanceolatis, panicula laterali rami dichotomi divari-
cati, floribus glabris

Habitat ad St. Martham A. v. Rohr. 7

Rami glabri, laeves, teretes, apice compressi.

Folia petiolata, alterna, quadripollicaria, oblongo lanceolata, integerrima,
utrinque glabra, plana, supra glauca viridia, nervosa venosa, subtus
fere concolora, tenuissime reticulato-venosa.

Petioles unguiculares.

Pedunculi laterales, filiformes, foliis breviores, super ne floriferi: rami
parthales oppositi, dichotomi patenti, dichotomi, ramis divaricatis
semper unguicularibus. Flores omnes pedicellati.

Calix glaber.

Malpighia

158177. montserrat affinis mitda cui stylis t.

rufescens
~~folia~~ laurus foliis oblongo-ovatis acute acuminatis subtus minutis
sive pube rufescente quasi sericeis nervis rarioribus sublongitudi-
nalibus paniculis axillaribus et terminalibus pedunculatis
act. f. h. n. Par. 1. pag. 100 (L. D.icolor)
Habitat in Am. merid.

nov. 1820

Launus

Cusuba Aubl. ~~tab.~~ Guianensis Aubl. fl. Guian. p. 126

Habitat in Guiana herb. Rich. 5

Arbustula 6-15 pedalis, cortice viridi, crassitie pennis cygnis. Rami densis
glabri, supri. Folia petiolata, alterna, spithamea et alba, ovato lanceola-
ta, subpendula, utroque glabra, supra nitida, avenia, subtus venosa, in acumine
obtusiusculo attenuata, subcordata, perennantia. Flores in panicula. Inu-
lus paucior. Calyx fructiferae pyriformis, ore irregulari. Balisca obovata
Semi pollicaris, uni loculari, sperma, punctata, aromatica

nobilis L. foliis lanceolatis venosis perennantibus, floribus quadrifidis
Lin.

Launus Camer. epit. 60.

Launus vulgaris Bauh. pin. 460

Habitatio Italia, Graecia 5

glauca L. foliis nervosis lanceolatis perennantibus, ramulis tuberculatis
lati floribus solitariis Thunb. fl. jap. P. V. p. 303.
Habitat in Japonia &

involuta Laurus

Schifera glutinosa Laurus fl. Cochinch. 2. pag 637.

Habitat in India orientali Ceylona, China Cochinchina

Involucrum tetraphyllum foliis subrotundis concavis, subtus pubescentibus.
femurquiculare.

♂ Flores *Carites* pedicellata: pedicello brevi villosa. Corolla petala 3. exteriora
in lineam. Stamina filamenta 12. 13. villosa petali longiora
glandula novem vel ^{anthera oblonga} 10. ^{superiora} inter stamina brevia.
Receptaculum villosum. Pistilli nulli

♀ Involucrum ut in mare
Flores ut in mare. Stamina tot ut in mare anthera ^{steriles}
germen superum. glandula ^{inter} stylum unius filamentis longior

Cortex duplex extenor ~~fusca~~ ~~gr.~~ mollior ~~cr.~~ ~~hor~~ interior membranacea castella
generis marginibus inflexis tenuibus

Diospyroides Lanius

Habitat in Carolina Herb. Richardi

Rami teretes, glabri, superne incani. Folia petiolata, oblongo lanceolata, v. f.
tripollicaria, integerrima, villosa, venosa, decidua. Pedunculi plerumque
gregati, breves, tomentosi. Flores involucriati, antequam folia

Carolinensis Laurus

Habitat in Carolina Herb. Rich.

Rami glabri. Folia cuneata vel oblonga, 2-3 pollicaria, supra glabra, subtus
vellosa, abate nuda, venis pime venosa, costa utrinque vellosa. Pedunculi in
fra foliis, pollicares, uniaxi. Capitula pefo duplo majora, hermaphroditi pedun-
culi uniflori. Germen oblongum, uniaxum. Stamina plura

genuculatus Launio

Waltz

Habitat in Carolina. Richard

Rami teretes, glabri, flexuosi, decurcati. Folia petiolata, venosa, glabra, pollicaria, acuta, enervia. Pedunculi axillares, triflori. Involucrum triphyllum

Carolinensis Linnæus

Habitat in Carolina herb. Desfont.

Rami purpurei, glabri. Folia petiolata, bipollicaria, elliptica lanceolata, utrinque acuta, tenuis fere venosa, enervata, subtus glaucescentia, membranacea. Petioli unguiculares. Pedunculi longitudine petioli, bifidi: pedicelli triflori: flaves pedicellati: ex his villosi ut: pedicelli

Lauro

Habitat in Guiana herb. Desfont. 1. 5

Rami teretes, glabri. Folio petiolata, 14-15 pollicum, lanceolata-elliptica,
acuminata, obtusa, membranacea, tenuiter venosa, utrinque glabra, arena
Pedunculi axillares, fere pedales. Flores in panicula lassa, ramis dichoto
mis, divaricatis, remotis. Flores tomentosi, incani

Lauro

Habitat in Puerto Rico herb. Desfont.
Rami alterni, cortex cinereo

Laphne

Habitat in St. Domingo herb. Desfont

Rami alterni, glabri, teretes. Folia versus apicem.

Carolinensis Laurus

Habitat in Carolina herb. Ruch.

Pedunculi axillares, bis bifidi, singuli triflori. Calyx parvus, planus. Discus
tus globosus, magnitudine Pisi

tenuifolia Chabrea

Habitat in udis Carolinae herb. Auth.

Caulis erectus, simplicispinus, glaber, teres, laevis, pedalis et ultra. Folia angusta, lineari, vaginantha, spithamea spatha superiore, approximata, lanceolata, subulata acuminata, semi-pollicaris, alterni. Pedunculis e spatha eiusque longitudine Petala 6, persistencia, lanceolata. Calyx nullus. Germin superum. Stamina 9. Stili 3. Capsula 3-valvis polysperma.

Madagascariensis Launus

Habitat in Madagascar Commes herb. Guss.

Rami superius angulati, glabri. Folio petiolata, bipollicaria et ultra, venosa, glabra, utraque obtusa pinnula. Petioli unguiculares. Racemi axillares, petiolo parum breves, solitarii, simplicissimi: pedicelli bi- / triflori

Cepulani Laurus

Habitat in insula Francisco Com mesf. herb. fr. f.

Rami veretes, glabri. Folia petiolata, bipollucaria, coriacea, oblonga, acumina-
ta, obtusa, utriusque glabra, nitida, venosa. Petiolus unguiculatus. Calycis
cupulares, semi pollicares, fructus cupula dimidio longior

13 folus longioribus, lanceolato-ellipticis, utriusque a cutis, fructu angustiore

V folus ovatis, latis, pyramoidis. Drupa cupula duplo longior

Nifala Laurus

Habitat in Aemencia meridionali herb. Linnæi apud Guss.
Rami Verdes et tomento venosissimo nifo, canescentes. Folia petiolata, al-
terna, ovato-oblonga, attenuata, coriacea, quinque nervia, nervi duo su-
per basi altiores, supra nitida, venis immersis, glabra, subtus venis reti-
culatis fenicis, venis expositibus, quinque pelticatis. Flores non visi.

Quercus Laevis

Habitat in Penn. herb. fusc.

Rami angulati. Folia petiolata, subtetramora, elliptico-lanceolata, attenuata,
venis pme venosa, glabra.

crassifolia Launus

Habitat in Guana Richardi herb. Lusf.

Rami dichotomi, teretes, glabri. Folia petiolata, bipollicaria, ovato-oblonga
glaberrima, nitida, valde coriacea, subtus subrenosa. Petioli unguiculares.

Pedunculi terminales, solitarii, pediculi parum ramosi.

Leucantha Laevis

Catesby Carolina 2. p. 20 Tab. 20

Habitat in Carolina Herb. Mus.

Rami teretes, folia petiolata, alterna, elliptica basi cordata, bipollicana,
venosa, glabra nima, supra nitida. Racemi laterales. Peduncululi triflori. Petala
5 que lineantur

Habeo ni fallor ex infula St Crucis floribus tomentosis

virifescens Laurus

Habitat in Artilli Richard herb. Mus. 5

Rami canescentes. Folia alterna, 2-4 pollicaria, elliptica, conatca, veno-
so-subreticulata, supra glabra, subtus e Tomento vix conspicuo sericeo, costata,
costa parva, alterna. Pedunculi laterales, quatuor pollicares remoti, pariter
in fenestris oppositi, superiores alterni: secundarii 3 ni, et inflores. Flores incani.

globosa Saeni

Habitat heret la Mantui
Eolia subter glauco rufescenta

Heret la Mant

martiniensis L. foliis oblongis acuminatis venis planis, racemis
paniculatis Jacq. coll. 2. p. 109. t. 5. fig. 2.
Habitat in Martinego 5

non vid.

Senecio L. foliis oblongis coriaceis acuminatis supra avenis, raris
mis axillaribus compositis.

Habitat in India occidentali.

ramis teretibus superne canis ut petiolis foliorum pum
nem gemma pedunculi pedicelli et calycis. folia
alterna petiolata subpithmosa oblique multinervi
loria acuminata subtus subvenosa glaucopentia
racemi folio brevior. Calyx persistens magnus. Dime
tro pollicari et longus

caupia L. - foliis ovatis rugosi perennantibus; corollis
quadrisidis Molen-hist. Nat. Ch. p. 151.
Habitat Chili

non vidi

pendula L. foliis oblongis venosis membranaceis perennantibus, racemis laxis
fructibus pendulis, calycibus deciduis Sw-prodr p. 65.

Laurus J. Brown. Jam. 214.

Habitat in Jamaica 5

umbellata L. foliis ovatis serratis, ramulis umbellatis floribus racemosis Theunb
fl. jap. L.V. pag. 304

Habitat in Japonia

Rami glabri, inferne teretes, cicatricati, superne angulati.
Folii petiolata opposita, interdum ternata, consistentia basi versus
interea, nunc glabra supra nitida obsoleta serrata, obtusa basi
acuta

Lucida l. foliis oblongis serratis, ramulis ternis, floribus axillaribus solita
nis subsessilibus Thunb. fl. jap.

Habitat in Japonia

~~Solanum petiolata~~ Ramis glabris inferne teretes cicatricati super
ne angulati. Solia petiolata opposita per terza forma
basin versus integerrima supra lutea obsolete venosa
obtusa basi acuta bypollitana

~~non videtur~~

non videtur

affinis L. foliis venosis oblongis acuminatis annuis subtus rugosis, ra-
mis supraaxillaribus

Cornus foliis salicis laevibus acuminatis, floribus albis, fructu suspensar-

Cast. Car. 2. p. 20. t. 20?

Habitat in Virginia ad ripas fluminum.

non vidi.

membranacea L. foliis oblongis acuminatis venosis convexis coriaceo membrana
Cero, ramis racemisque erectis, foliis brevioribus Sw. prodr. p. 65.
Habitat in Jamaica Hispaniola &

foetens L. foliis venosis ellipticis acutis perennantibus: aetulis venarum sub-
tus villosis, racemis elongatis compositis paniculatoformibus Hort.

New. 2. p. 39

Habitat in Canariis §

Leucoxylon L. foliis oblongo-lanceolatis planis perennantibus, racemis foliis brevibus; calycibus imbricatis verrucosis Sw. prodr. pag. 65.

Laurel 2. Brown. Jan. 214.

~~Habitat in Jamaica~~

an *Protonia* fructu globoso nigro radiis rubente Plum. 2. herb. Surinam

descripta inter *Myrsini*

Anandra L. foliis lato lanceolatis perennantibus planis, floribus. *Anandra*
fructu calycis tubo Sw-prodr. pag. 65.

Habitat in *Gamaia*
affinis exaltato. et folia non nitida et flos sit villosi
rami fusco purpurascens. glabri folia vix acuminata
ut utraque acuta glabra, 3-4 polliciana rami axilla
res folio breviores.

negulosa Launi folus elliptico lanceolatis submembranaceis ad costam
negulosa subtus glauca viximi axillares pedunculis De hotom
ramis glabris

Habitat in India occidentali

Rami glabri e cicatrisibus tuberculati angulati super
fientes uti petioli et pedunculi folia sparsa tri
4 pollicaria basi parum, acuminata subtilissime
venoso reticulata utraque ad costam rugulosa. Racemi
folio brevioris. Pedicelli clavati calyx persistens

Nobilis ^{perennantibus} L. foliis ~~ellipticis~~ lanceolatis ellipticis, ^{venosis} axillis nervorum subtus glandulosis
si nocens axillaribus brevissimis

Launus Camer. epit. 60

Bauh. pin. 460.

Launus nobilis foliis venosis lanceolatis perennantibus, floribus quibus
Driedo Novis Lin Syst Veg.

Habitat in Italia Graecia

Rami teretes glabri superne compresso angulati. Solia petiolata
alterna frequentia venosissime venosa acuta integerrime
bi-4 follicularia. petio. lvs unguicularis. Pedunculis petio
lobis

floibunda L. foliis ovato-lanceolatis, planis membranaceis, floribus racemosis
paniculatis laxis terminalibus Sw. prodr. pag. 65.
Habitat in Jamaica }

non id e

Salicina L. foliis lato lanceolatis venosis ^{non} ~~venosis~~ perentrantibus, 12 Jun
sulci axillariibus hinc ^{non} ~~hinc~~ pueriflexi ramis glabris

Habitat in Insula Franca

Rami laxis superne angulata folia 4 5que pollicaria ^{habent} ~~habent~~ ^{reticulata} ~~reticulata~~
venis ^{reticulata} ~~venis~~ ^{reticulata} ~~reticulata~~ ^{reticulata} ~~reticulata~~ ^{reticulata} ~~reticulata~~
venis longioribus glabris ^{reticulata} ~~reticulata~~ ^{reticulata} ~~reticulata~~ ^{reticulata} ~~reticulata~~
venis dilatatum fructus oblongus laxis glabris.

Genuculata. L. foliis lanicolatis utraque Corbis, caule dichotomo
gemmi pedicellatis triflori Walt fl. Car. p. 133
Habitat in Carolina

~~non vid.~~

indica L. foliis lanceolatis perennantibus planis, ramulis tuberculatis et
corticibus, foliis floribus racemosis L. V

Caunis indica Planch. alm. 210. T. 304. fig. 1.

Caunis latifolia indica Barr. xi. T. 277.

Habitat in Virginia 5

Rami et corticibus frequentibus tuberculatis superne a tomento tenuis
fimo incani; folia versus apicem approximata tenuissim
venoso reticulata utrinque acuta lato lanceolata
petioli sex pollicares parum decurrentes. Racemi axillares
folia breviores flores puberuli racemi elongati

venoso ramulis tuberculatis apice laniscentibus

Borbonia L. foliis lanceolatis perennantibus, ~~calycibus~~^{lobis} fructus baccatis
Lin. L. V. p. 3034

Borbonia fructu oblongo nigro, calice coracneo Plum. gen. 24. n. 60.
Lauro carolinensi, foliis acuminatis, baccis conulis, pedicellis longis
nubri insidentibus Rostk. car. 1. p. 63. 7. 63.

Habitat in Carolina virginia &
variat foliis ovatis vel ovato renatis &

Specimen herbar. Dubium

angustifolia L. folius lanceolatis venosis coriaceis perennantibus racemis brevibus calycibus glabris ramisque tomentosis

abita in India occidentali et
ramis teretibus. Folia petiolata alterna, attenuata 3-4 pollicibus
nervi tenuissime venoso reticulata glabra petiolus vix
unguiculares. Pediculi soli petiolo duplo longiores flores
pauci pedicelli fructiferi foris unguiculares incompressi
calyx persistens capsulari fructus globosus magnitudine
supra calyce parum longior.
affinis L. coriaceo

cubeba Laurus foliis lanceolatis acerviis arenis, floribus pedun-
culatis congestis Lour. fl. Cochinchinensi pag. 252.

Habitata Cochinchina &

arbor medicinis. Folia integerrima, plana nitida 2 pollicaria
alterna petiolata. Pedunculi uniflori. Calyx communis
4phyllus: folioli subrotundi concavi colorati, decidui
5 flones. Cal. profusus. Petala 6 subrotunda inaequalia. Nectar.
glandula 6. Stamina 7. Bacca nigra minima pedunculata

non vidi

Orótea *Laurei* foliis sesquibus linearibus - caniscolatis subtus argenteo sericeis
Aubl. f. n. P. 1. pag. 108
Orótea Guianensis Aubl.
Habitat in Amer. merid.

Sassafras L. foliis trilobis integris que.

Sassafras arbor ex florida, sic ulneo folio Bauh. pin 431.

Cornus mas odorata, folio trifido: margine plano Sassafras dicta

Plukn. alm. 120. t. 222. fig. 6. Cat. herb. carol. 1. p. 55. 7. 55.

β. Cornus mas Sassafras laurinis foliis indivisi Plukn. amalt.
66.

Habitat in Virginia, Carolina, Florida &

Rami pubescenti. Folia petiolata aut juniora lanella in apice ramo
num plura oblonga utrinque villosa subtus incana ad alteram
alternam supra glabra subtus subpubescentia, tripliciter
subtus venosa ovata autrinque acuta vel triloba lobis
lobis obtusi intermediis longiore obovato lateralibus
oblongis. Racemi inter folia juniora 5-7 flori pedunculati
pubescenti bractea linearis pedicelli longitudine caduci
fructus calyculo infidens pedunculi fructiferi glabri sur-
sum incrassati.

martiniensis L. foliis oblongis acuminatis venosis planis, racemis
paniculatis 4ciq. coll. 2. p. 109. Tab. 6. fig. 2.
Habitat in ~~montibus~~ 5

non vidi