

Lavandula

1. *spica* L. foliis oppositis lanceolato-linearibus margine revolutis, spica inter
nupta nuda
2. *stoechas* L. foliis oppositis linearibus incanis margine revolutis subtus nigros
integerrimis, spica coarctata comosa bracteis sublobis.
3. *viridis* L. foliis oppositis linearibus nigros villosi margine revolutis, spica
comosa, bracteis indivisi
4. *dentata* L. foliis oppositis linearibus pectinato-pinnatis, spica coarctata
comosa
5. *pinnata* L. foliis petiolatis pinnatis: folioli cuneiformibus incanis,
spica imbricata
6. *multifida* L. foliis petiolatis decussate pinnatis glaucis pinnatifidis
spica solitaria quadrangulari bracteis late ovalis villosi
7. *elegans* L. foliis petiolatis decussate pinnatis: pinnis pinnatifidis
spicis pedunculatis plumbis, bracteis lanceolatis glabris
8. *carnosa* L. foliis petiolatis ovato-cordatis serratis carnosis, spica tetra-
gonis, calycibus recurvatis

Lavandula ascata hispida folus vltimi viscosi dedit Guss

carnosa h. foliis petiolatis ovato-cordatis serratis carnosissimis speciosa Vetrugona
calycibus recurvatis Lin. D. sf. n. 6. t. 2. l. V. p. 531.

Lavandula carnosa foliis cordatis crenatis glaberrimis carnosissimis Lin. Suppl.

p. 273
Natu. Burka Rheed. Mal. 10. p. 179. tab. 40.

Habitat in rupibus Indiae

Lavandula

Habita in Lusitania herb. Desfont. 5

Caes. Lavand. ~~Stoecha~~ di Caulis fruticosus, ramosus, villosus pubescenter. Folia
semipollicana, lineana, resoluta, villosa pubescenter, integerrima. Spica terminalis,
sempollicana, villosa. Vexilli contigui. Bractea subrotunda, venosa, an-
do. Calyx nervosus fimbriatus. Dentes acuti in pule

Spica L. foliis oppositis lanceolato-linearibus margine revolutis, spica interrupta
La nuda Lin. Desf. de Lavand. n. 1.

a Lavandula al. Vera Jacq. pempt 273.

Lavandula angustifolia Bauh. pin. 216.

β. Lavandula latifolia Bauh. pin. 216. Mont. hist. 3. 1. 1. fig. 1. 2.

Habitat in Europa australi &

frutex ramosis pedalis. Eslea angusta obtusa integerrima
fistis villosis vix venosis, ramulorum incana. Ramuli
ex omnibus axillis. Pedunculus terminalis elongatus
verticilli inferiores remotiores. bractea ovata acuminata
calyce brevior

Stoechas L. foliis sesquipedibus linearibus margine revolutis, spica corymbata comosa
Lec. Disj. n: 2.

Stoechas brevioribus ligulis Clus. hist. 1. p. 344.

Stoechas purpurea Bauh. pin. 216

Stoechas longioribus ligulis Clus. hist. 1. p. 344.

Stoechas cauleculis non foliatis Bauh. hist. pin. 216. Monf. hist. 3

Tab. 1. f. 2.

Habitat in Europa australi et Barbana &

Crux sesquipedali inferne ramifera. Rami obscure tetragoni
tenuis fine villosi superne conespenti simpliciter erecti.

Folia pollicaria basi attenuata ad altera latera subtus
venoso nervosa. ramuli ex omnibus axillis pedunculati terminati
pollicari pedunculati oblongi raris pedunculati sesqui-

pollicari bracteis ovato acuminato longitudine florum
coni tomentosi coma violacea bracteis major tenuior obtusa

bracteis subulobis

integerrimo.

vidi L. foliis sessilibus lanceatis rugosis villosis margine revolutis, pinnis
comosa bracteis indivisis Hort. Kew. 2. p. 280.
Habitat in Madaga

non vidi

~~Habitat in proech compendis~~

Dentata L. foliis sessilibus lineari-bus pectinato-pinnatis, spica corymbata remota

Lin. Disj. n. 3.

Stoechas in pro folio Clusius. 1. p. 345.

Stoechas folio serrato Bauh. pin. 216.

Habitat in Hispania et Oriente &

Interius ramosis. Sola sessilis frequentissima, dentibus obtusi-
supra oblique lineata glabra subtus incana margine revoluta
pallidiana. ramuli ex omnibus axillis. bractea ovata
acuminata colorato venoso fere ferruginea spica oblonga
umbriata pallidiana pedunculata apice ramorum
pythamou

pinnata L. foliis petiolatis pinnatis: foliolis cuneiformibus, spica imbricata.
Lindb. 4. 1.

Lavandula pinnata Jacq. muf. 2. p. 310. Ic. rar. V. 9.

Lavandula canariensis maxima, spica multiplici coenoclea
Pleb. alm. 209. t. 303. fig. 5.

Habitat in Canariis

Rami iniani. Folia pinnata, iniana quadripartita
petiolata. Inna decurrentis inaspicula cuneata
avenia margine parum revoluta integerrime
vix unguiculares infimo minores. P. unguiculata
menalis pedalis. Spica plures versus apicem pedicella
da opposita bipollicares angusta. Bractea oblonga
acuta iniano calyce parum longiore

multifida L. foliis petiolatis pinnatis: foliolis decussive pinnatifidis, spica
quadrangulari: angulis spiculis Lin. des. n. 5.

Lavandula multifida folio Clus. her. 1. p. 345.

Lavandula folio dissecto Bauh. pin. 216

13 Lavandula folio longiore tenuiori et elegantiori dissecto Com.
var. 27. d. 27.

Habitat in regione boetica & alio

Caulis basi lignosus pedalis ramosus, acule tetragonus
incanus suppelis longis et stantibus adpressis. Rami sive
ramosi. Folia petiolata pinnata glabra sicula pinnis
pinnis decurrentibus pinnatifidis obtusi. Peduncululi
terminaliter elongati. Spica terminali oblonga, imbri-
cata bracteis late ovatis mucronato membranaceo
longitudine calycis Calyx apice tomentosus
Folia interdum glabra spica splittana

spica splittana bracteis late ovatis.

elegans L. foliis pinnis deorsum pennatis pinnis pinnatifidis
specis pedunculatis pluribus bracteis ovato lanceolatis atten-
nuatis.

Habitat

similis L. multifida Differt caule glabro, specis non
solitariis sed plures quinque uniter oppositis angustioribus
attenuato bracteis et calycibus glabris.

carnosa L. foliis petiolatis ovato-cordatis serratis carnosissimis
tetragonis, calycibus recurvatis in Desf. n. 6. t. 2.

Natu. historia Rheed. Mal. 10. p. 179. t. 90.

Habitat in rupibus prope Sadrasam.

Obliquè tetragonis subvelloso basi ramoso Pedunculati
elongati. pedicelli superne bif. tripolliciares oppositi
Inca globosa demum ovato

Orientalis f. foliis tomentosis ovato-lanceolatis: floralibus verticillis breviori-
bus. R. H. Spreng.

Stachys orientalis altissima foetidissima Tournef. Coroll. 12.

Habitat in oriente