

Lavatera

Lavateram Thunbergianam distinguit genere Medicus ab orbiculum seminis
degenera et ad hunc spectans inter semina ut in Olbia Egi
hi quoque Lavat. verticem et arboream ab huius genere distinguit an
Jure.

Squamosa Verberna

Habitat in St Domingo herb. Desfon.

Villosa. Caulis herbaceus, erectus; scabrispiculus; crassitie penno asperna. Solia
petiolata, tri-pollicaria, oblonga ovata, basi in petiolum attenuata, acuta,
aequaliter grosse serrata, supra secundum nervos et venas lineata, subtis
conescentia. Spica terminalis, semipedalis, cystis denticata villosa. Bractea
lanceolata, attenuata in anastom. patentem ciliatam. Corolla longita
dne bractea

corper cum haecq. et mea anstata

Cratica Lavatera

Sub nomine Lavatera Sylvatica misit Luth Lavater. a cratica
vix diversa nisi floribus quae Triplo majoribus. Caulis scabro
foliis ellipt. pedunculo petiolis calycibusque villosis, foliis infanibus
substantia obsolete quinque lobis superioribus profand. acutis. St. nuc
vati, ut lacrimo calycis et stam. Capita lavo

Jamaicensis

Veronica foliis oblongo-ovatis dentato-serratis glabris, ramis ^{subnigrosi} ~~pub~~
^{hirs} pilosis, bracteis calyce brevioribus

Valerianoides Boeh. Lugdb. 2. p. 270.

Verberna folio subrotundo serrato, flora caeruleo Moan. hist. 171.
t. 107.

Verberna india Mell. Dict. 4. p. 594.

Verberna foliis obtuse ovalibus, spica ^{hirs} carnosa nuda Lin. bot. Cliff. 10

Verberna jamaicensis, Dianora, spicis longis pimis carnosis nudis
foliis spatulato-ovatis serratis caule ^{hirs} piloso. Lin. bot. Cliff.

Syst. Veg. 66. Faug. obs. 4. p. t. 85.

Habitat in Caribaeis t.

Caulis suffruticosus, ^{rami sparsi} ramosus, cultura pilosa vel pubylabi

^{anilis} costa raris pilis
sa hirta

Folia bipollicaria, grosse aculeaque serrata, basi integerrima, obtus
sa interdum ^{saepe} acuta, # rudimenta ramulorum in axillis. Spica semi
pedalis, penna columbina crassior. Bracteis lanceolata.

Cultura glabrior saepe glabra

Lavatera biennis herbarica, foliis inferioribus cordatis crenatis subrotundis lobatis,
summis oblongis trilobis, lobo medio maximo, pedunculis elongatis solitariis, peta-
li truncatis Mart. in Schrad. Journ. q. 2. 6. 1. 6 pag 463.
Habitat in parvis grammosis et ad agrum versus Cavias. *T*

arborescens foliis septemangulatis tomentosi plicatis, pedunculis
confertis unifloris axillaribus Len. l. V. Cavan. p. id. et 106
et ^{W. H. T. 139, 140, 141}
Malva arborescens Dod. pempt. 653.

Malva arborescens veneta dicta, parvo flore Bauh. pin. 315.

Habitat inter Pifas et Liburnum

ramuli villosi.

~~Caules octopedalis crassius tractu ramosi. Ramis venete glabr~~

~~perenne villosi. Folia petiolata subseptemloba lobis ovatis~~

~~obovatis subcordata subrotunda 7 nervis pubescentibus lobis~~

~~ovatis inaequaliter crepatis. Petioli longitudine fere~~

~~foliorum pubescentes ^{pub in} cani. Sepala lanceolata ^{reversis} randa~~

~~evanescentes pedunculi axillares solitarii cum ramulis~~

~~interiori latius ovatis obtusi uti interior villosus~~

ramuli axillares
floriferi perenni
perenne ramul

pubescentibus, pedunculis confertis

calycis exterioris interioris longiore

micar L. caule arboreo, foliis septemangulatis acutis crenatis
plicatis tomentosis, racemis terminalibus L. 1. 1.

Malva hispanica Monf. prol. 205.

Malva foliis mollibus undulatis: in margine superius micis
sulphureis ad solem splendens Donati Monf. hist. 1. p. 523.
p. 5. t. 17. fig. 9.

Habitat in Hispania, Lusitania

Cuscutaria L. foliis septem angularibus tomentosis plicatis, racemis
terminalibus L.V

Althaea frutescens Lusitania, folio ampliore minus in aro

Fournes J. R. 46 97.

Habitat in Lusitania et Cap. 6. p. 5

non erdi

afriana. *L. tomentosa incana* foliis filotando 5 lobis crenatis floribus
geminatis cernuis calycibus ~~24~~ 24 tenonibus 3 partibus
Laxa tera afriana caule fruticoso, foliis canescentibus squalo
bati crenatis; floribus cernuis geminis Cavandus. pag. 282
Tab. 139. fig. 11.

Habitat in Hispania Barbaria

Caulis fruticosus ramosus 4 pedales Rami teretes tomentosi
prope hanc superne uti tota planta. Folia petiolis obovata
mollia juncea plicata obtusa. Stipula angusta
pedunculata pollicari; flori Calyx exterior profunde
trifidus laciniis ovato-lanceolatis obtusi Corolla
albida vel flavescens unguibus purpureis
capsula 12. saepe affinis manibus an modo
sanctar

alba L. foliis quinquelobo hastatis, pedunculis solitariis Lin. Sp. pl.
p. 492 + Fairm. hort. 4. 73

Althaea arborea alba in galloprovincia Lobel. u. 693.

Althaea frutescens, folio acuto parvo flore Bauh. pin. 316.

Althaea frutescens, folio acuto viride molli, flore specioso

Plukin. 4. 0. fig. 1.

Habitat in Albia Inf. Gall. provincie ^{terrestri} ramis inferne glabri superne

caulis sive pedalis ramifus ramis inferne glabri superne
tomentosi. folia petiolata mollia sive nervi ^{subtus majori}

mollissimi crenati
inferioribus sive
lobis superioribus
lanicollatis he
stati

inveniantur basi cordatis sive lobo lobis ^{inmediis} ^{inacqualiter serratis} ^{crenatis acutis}
intermediis longioris supremis floralibus lanceolatis hastatis
stipula lanceolata. floris axillaribus solitariis sive

nervi subfereati micemosi pedunculi brevis calycis
inveniuntur ~~estruis~~ ^{lati} laciniis ovatis acuminatis interioribus
parvis longioribus capsulis circa 20.

var. alba foliis dentatis inferioribus sive lobatis superioribus
trilobatis acutis lobo medio duplo longiore - floribus
solitariis Ravan. dist. p. 06 tab. 32. fig. 2

Alnoba L. caule fruticoso, foliis subcordatis subtrilobis rotun-
datis crenatis, stipulis cordatis, pedunculis aggregatis uniflo-
ris Lin. Sp. pl. p. 922. t. 4. qu. hort. 874.

Althaea frutescens, foliis rotundior incano Bauh. pin. 316.

Althaea frutescens Hispanica, aeni monspulani incanis foliis;
grandiflora Saxoniæ purpur Plum. alm. 24. Tab. Opf. 9.

Habitat in Hispania

^{mollis}
Tota planta villosa-tomentosa subincana erecta. Folia petioli
breviora cordata rotunda obscure lobata bipollicaria
inaequaliter ~~crenata~~ ^{crenata} dentata, squenaria pedunculi axilla-
res pollicari ^{vel} brevior 1. 2. 3 raro quatuor lacinis calycis
interiori & exteriori ovato acuta exterior brevior
Capsula sub 5 decim

Latam *Alnoba* foliis subcordatis obsolete trilobis in Franqu
cum plicatis crenatis stipulis cordatis, pedunculis
aggregatis 1 flori Caran. Desf. p. 87. Tab 31. fig. 1.

mandima ^{Tomentosa incana} ^{crenato-} ^{subsolitaria}
foliis cordato subrotundis pedunculis axillaribus unis
is, stipulis subulatis

acthea frutescens foliis rotundioribus Bauh. pin 316.

Lavatera mandima caule fruticoso lanato, foliis
cordato orbiculatis 5que lobis obtusis crenatis pedun-
culus unifloris, stipulis fetaceis deciduis Gouan.
Illustr. pag 46. f. 25. fig. 2.

Lavatera mandima foliis cordatis subrotundis lobatis
crenatis tomentosissimis: floribus solitariis Ravun. des.
pag 88 tab. 32 fig. 2

Habitat in Gallia meridionali Hispania, Barbana 5
caulis fruticosus: caespitibus superne tomentosissimis
subfarnaceis bipedatis ramulis frequentibus
foliis incana subpleiata 5que nervia unguiculata
vel sesquipedaliana mollissima obtuse lobata
pedunculis axillaribus 1-2. decernatis petiolo pan-
niculatis. Corolla alba Capsula 12.
varietas? floribus flavis

Thunbergia L. caule herbaeo, fructibus denticatis, calycibus incis
L.V. Faig. fl. austr. 4. 7. 311.

Althaea Thunbergia Cam. hort. 12. 7. 6.

Althaea flore majore Bauh. pin. 316.

Althaea Thunbergia grandiflora Dill. Elth. 9. 7. 8. 8.

Habitat in Pannonia, Thunbergia, Tataria, Svecia ad Alpes &

Tota planta villosa subtomentosa pubescentia. Cauli
ramosus folia petioli ^{vix subtordata} parum longiora s' nerva una
qualiter crenata inferna 5loba s' obtusa supero-
tri lobata. pedunculi axillares solitarii uniflori
folio longioribus. Stipula lanceolata attenuata
Calycis lacina ovata acuta. Capsula 14.

Caractera Thunbergia foliis infernibus cordatis
crenatis subrotundo lobatis, summis hastatis
pedunculis longis solitariis unifloris Cavan
Desf. pag 99. tab 31 fig. 3

villosa subtomentosa
foliis infernibus 5lobis superis trilobis
pedunculis axillaribus folio longioribus

Cretica l. caule erecto, ramis inferioribus diffusis, pedunculis confertis
unisporis, foliis lobatis: superioribus acutis *Hort. Ups. 2024. Ficus qu. Hort.*
T. 41.

Malva cretica annua altissima, flore parvo ad alas umbellato
Tournef. corr. 2.

Malva annua hirsuta, foliis hederis imbricatis angulosis *Monf. Hist.*
2. p. 521. f. 5. 7. 7. fig. 5.

Habitat in Creta C. pedali

Caulis erectus teres villosus si ab eo. folia petioli brevioribus
basi vix cordata pubescentia ad aliam glabra 5-7
nerviis lobata vel 7 angula inaequaliter crenata
petioli villosi stipula linearis lanceolata. Pedun-
culi axillares saepe 5 que cum ramulo florifero pollicis
vel brevioribus villosi uti calycis calycis laciniis ora-
to acutis ^{interior} profunde 3 pedis longitudine fere interiori
flore parvi. Caps. uniter 10.

— si ab eo —
axillaribus.
folius 5-7 angulato
sublobatis —

Lavatera cretica caule erecto si ab eo, foliis cordatis septem
angulatis superioribus acutis, floribus confertis axilla-
ribus, pedunculis erectis unisporis *Cavan. Div. p. 89*
Tab. 32. fig. 1.

Trimestris L. caule scabro herbaico, foliis lanceolatis pedunculis unifloris
fructibus orbiculo testis L. V. Gaique hort. 4. 72.

Malva folio vario Bauh. prodr. 137. t. 137. p. 315.

β. Lavatera foliis subcordatis obtusis angulatis serratis caule herbaico
Roxen. leg. 355.

Habitat in Syria, Hispania q. Narbonensi. C

Caulis ^{scilicet pubescens} teris, erectus pedalis et ultra ramosus. Rami inferi
seu fere hori horizontales. Folia basi cordata inferiora

nata subrotunda superiora subquadrata, suprema triloba

lobi ovati intermedio longiore glabra. Petioli longi

stipulo parvo lanceolata releso. Pedunculi axilla

— foliis glabris solitarii petiolo longiore. Flores magni. Calycis
inferioribus etc. laciniis ovatis inferioribus brevior latior ~~floribus~~
ut in Baran. magis

Lavatera trimestris caule scabro foliis inferioribus subro-
tundi medio quadratis acuti summi lobo
medio longiore fructibus orbiculo testis Baran
us. pag. 90. tab. 31. fig. 2

punctata L. caule villosa scabripilo superombr
foliis ^{mollibus} angulato subleptatis pedunculis axillaribus
solitariis orbiculo nullo

Lavatera punctata caule herbaceo foliis subrotundis
quinqueangulatis deinde hastatis pedunculis uniflo-
ris axillaribus corollis campanulatis All. Aen-
tuar. pag 26

Habitat in agro misisensi. O

Caulis erectus ramus pedalis folia infima orbicu-
lata sequentia stoba suprema hastata, mollia
villosa vix stipula lancea lanicolata
Corolla malva mauntrans calycis aequales
interius lobis externis orato magno