

Leicythia

1. ollanad. foliis seopilibus cordato-ovatis subintegerrimis
2. minor L. foliis petiolatis lanceolatis serratis
longata L.
purpurea L.

ad monadelphiam spectat

Compositi hinc pertinent sicut Richard sed nomen vernaculum
falsum est enim Couliman incolamus

parviflora Ceythia

Habitat Capens herb. La Marthii

Rami prostrati, interdum terni, glabri, cortice cinereo. Folia breviter petiolata,
lanceolata-elliptica, acuminata, acuta, integerrima, venosa, glabra, tripollu-
ria, alterna, plana. Racemi terminalis, compositi: pedicelli alterni, uniflori
Calyx parvus, glaber

pedicellata *Leicythia*

Habitat in Cayenna herb. Richardi

Stem 6-9 pedalis. Rami teretes, grisei, punctati elevati adpressi. Folia petiolo
la, 4-5 pollicaria vel semipedalia, elliptica, basi rotundata, acuminata, au-
ta, integerrima, venosa, rigida. Racemus terminalis, basi ramo uno vel
altero. Calycis lacinae ovatae - lanceolatae. Pedicelli pollicares. Flores
purpurei, inodori

Leucythis

Habitat in insula francica Commerçon herb. Fus.
Rami teretes, cortice fusco, glabri. Folia petiolata, alterna, remota, tripolli-
cara, ovato-oblonga, membranacea, per petiolum parum decurrentia, tenuis-
sime venosa reticulata, nitida, acuminata, serrata, acumine integerrimo. Racis-
mi axillares, multiflori; foliis longioris. Flores distantes, nutantes. Padielli
superum incrassati, uti ca lycas in anu

No 10 Lechyti Lecythis

Calyx Perianthium deciduum hexaphyllum foliolis parvis ovatis concavis.

Corolla 6. petalata petalis subovatis pollicantibus tribus minoribus concavis margine
parum reflexis

Stamen folium oblongum petalis dimidio longiore ascendens basi filamentis tenibus
bracteis semilunariis testis apice globosis (an anthera) superne ext~~ro~~sum laci
matis intus testum lacinis antheris lanceolatis compressis acutis vix usquicu
lambis capitulo magnitudine nuclei juglandis collecti copiosissimi

Pistillum

Panicarpium

Cal. Ryan. n. 46.

an grandiflora

purpurea Lezythi foliis oblongo. canicollatis integerrimis glabri, racemi latera
libri brachio. Basenna
Habitat in America meridionali. A. v. Pehr 3.

Rami teretes, glabri.

Folia petiolata, alterna, saepe subsessilifera, membranacea, oblonga, acuta
minuta, integerrima, utrinque glabra, venosa.

Petiolus semiunguiculatus, glaber, subtus convexus, supra canaliculatus.

Racemi laterales et ex apice ramulorum lateraliū, 4-6 flori. Podunculus
peltatus, flexuosus, angulatus, cicatricatus. Pedicelli longitudo in fere
podunculi, crassiores, uni flori.

Calycis foliola canicollata, obtusifolia

Corymba Lezythos foliis ovato-oblongis subserratis acuminatis, racemis terminalibus compositis

Habitat in insula Trinitatis In Ryan 3

Rami teretes, glabri

Folia petiolata, alterna, quadripollicaria, coriacea, acuta, utraque glaberrima; supra levissima, costa elevata, nervoso-venosa, subtus pallescens, tenuissime reticulata, margine subreflexa, obscure serrata serraturis mucronis cuscis terminatis, basin versus integerrima.

Petiolus unguiculatus, supra canaliculatus, subtus convexus rugulosis

Racemus terminalis, ^{erectus, strictus} compositus, ramis alternis paucis. Pedicelli alterni, ^{illi pedunculi communis} angulati, glabri, semiunguiculares, versus florem sensim inaequaliter, glaberrimi, uniflori

Calyx hexaphyllus; folioli ovatis subcoriaceis, obtusis, unius reliquis parum minore

Corolla petala 6. ovato-subrotunda, duo exteriora parum majora

Neetanium

Stamina

Stylus

1875-

Cat. In Ryan n. 46

affinis L. parviflora vel amara Aubletii

grandiflora L. foliis ovatis undulatis petiolatis pedunculis crassis
spicatis Aubl. fl. Gu. p. 712. t. 203
Habitat in Guiana

Sub hoc nomine plantam in herb. Thourin. vid. ad d. v. s. p. f. d. h.
Rami conspici penno & ygnos, glabri - folia sesquialtera, spina lanceolata
elliptica, spithomosa et ultra, basin versus attenuata, obtusa, utraque
glabra, tenuissima venosa. Pedunculi axillares solitarii

non vid.

pedicellata Ledyther ramis proeminulis punctatis, foliis oblongo-
ovatis cymis lateralibus et terminalibus sessilibus pedicellis
Congruisulis Act. p. h. n. Par. 1. pag. 111.
Habitat. in Amer. merid.

non vidi

amara L. foliis ovatis canaliculatis integerrimis petiolatis, flombus spicatis
Auth. fl. Gu. p. 716. t. 206.
Habitat in Guana

non vid.

Tabacaço L. foliis lanceolatis - oblongis integerrimis petiolatis, racemis terminalibus, seminibus dulcibus Aubl. fl. Gu. p. 719. V.

204. 205. 200

Habitat in Guiana

non vidi

parviflora. L. foliis ovato lanceolatis integerrimis petiolatis, paniculis
spicatis terminalibus, fructibus bilocularibus Aubl. Pl. Gu.

707-t-287

Habitat in Guana

non vidi

lutea L. foliis lanceolatis integerrimis petiolatis Aubl. fl. gu. 2. p 721
Habitat in Guiana

non v. d.

Dactyloctenium L. foliis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis petiolatis,
floribus spicatis, fructibus quadrilocularibus Aub fl. Gu.

721-t 289.

Habitat in Guana

non vidi

1. *ollanā* Loe. foliis sessilibus cordato-ovatis subintegerrimis Loeft. 109 &
Taiā pucaya Morzgr. bot. 128. P. J. Bot. 135.

Habitat in America meridionali

Arbor vasta. Folia ad apices ramorum, alterna, cordato
ovata, glabra subintegerrima, subundulata, fusco
viridia. Flores spicati, terminales alterni, subnatis
pedicelli horizontales. bractea ovata, concava decidua
Loefe

non vidi

2. minor l. foliis petiolatis lanicolatis serratis l. v. ^{herb} Jacq. am. 160. t. 109.

Habitat in America meridionali;

Arbor ex celsa. Folia petiolata alterna, acuminata, glabra
semipedale. Racemi terminales simplices interdum
basi racemo uno alterove aucti. Flores magni Jacq.

non vid.