

Leersia

onyroides L. panicula effusa, spiculis triandris, glumam carinis ciliatis  
Sw. prod. pag. 24  
gramen palustre, panicula spicifera Brach. in prod. v. 7. p. 3.  
gramen miliaicum palustre prostratum, paniculis ex locustis compressis  
si compressis Mont. prod. 51. Sequi veron. 1. p. 357  
Homalocenthrus Hall. in Act. helv. 4. p. 307. Fust. Styr. p. 1411  
Phalanis onyroides panicula effusa glumam carinis ciliatis  
Linn. S. V. pag. 104. Schreb. gram. 5. t. 12.

Habitat in Europa.

Perenni strati glabri, ut folia basi folii extus otulo atrato villosa.  
panicula spithamea, et in nostris regionibus semper clandestina, pedunculi  
inferni ternati reliqui bina, flexuosi sub simplicibus, basi nodosi  
glomeruli solitarii pedicellati. Valvula navicularis oblonga acuta margi-  
ne et dorso ciliata.

— folius planus

virginica. Lempi panicula effusa, spiculis subternandis ad presens, glumis  
mis carina ciliatis Willd. sp. pl. pag. 325.  
Oryza glumis carina hirsutis Gronov. voy. 153.  
Habitat in America boreali. y

et oryzoide non distincte secundum Richard.

na vid.

Nionigi L. panicula effusa, spiculis glumis tuberculatis margine ciliatis  
foliis convolutis.

Habitat in India orientali Nionig

Similis onycode an eadem. Differt panicula minor foliis convolu-  
tis

*Centiulani* *Leersia*

Habitat in paludosis Illinoisi herb. Reut.

habes

monarda laevis panicula effusa, fructis remotis laevis, fructis secundis subrotun-  
dis monardae, glumis corvibus Lu. prod. pag. 21.  
Habitat in Jamaica

Hexandra L. panicula effusa, spiculis alternis hexandris, glumis sublongioribus.

Habitat in Jamaica

geniculi velati

Culmi adscendentes bipedales tenues glabri folia 5-6 polliciana  
terniunguem lata glabra. Panicula <sup>subsimplex</sup> tenuis, valvula oblonga  
ramis acuminata

*Digitaria leepii* species linearibus quaternis subdigitatis glumis compla-  
natis mutuis ad latem fimbriatis La Mart. Tabl. Eni: pag 167  
Habitat in amenia meridionali

non vidi