

Leontice

altissima Leontide

Hab. Sol. in Siberia Herb. Lu. Mantini

Caulis herbaceus, stramineus, simplex, glaber. Folia superne ternata
4a, basi digitata: foliola pollicaria, lateralibus semper minoribus, lan-
ceolata, obtusa, mucronata, basi acuta, nervia glauca viridia, gla-
bra. Stipulae duae, oblongae. Racemus terminalis, pollicaris: pedicelli
mutantes, uniflori. Bractea subrotunda. Radix bulbosa

Leontopetalum ~~*Leontopetalum*~~ ^{re} foliis decompositis, petalo communi trifido Lin. L. V. p. 332

Leontopetalon Camerac. epit. 968. Bauh. Pin. 324. Monf. bot. 2 p. 205 f. 3.
t. 15. fig. 6

Leontopetalon foliis cotta ramis inasciculis Tournef. Coroll. 49

Habitat in Apulia, Hebrunia, Peta?

Caulis erectus ~~herbaceus~~ striatus, glaber, sesquipedalis. *Petalopetala*

~~sa. Siliola lateralia pennata, truncata, intermedium tri-~~
~~fidum profunde trilobum, pinnas folia petiolata. Petalus pinn-~~
tus trifidus quorum laterales foliis pennatis, intermedium folio profun-

de trilobo lobis rotundatis, foliola lateralia petiolorum lateralium
bilobis terminale trilobum, omnia glaberrima ut gemma sub
venosa facie aquilegia. Panícula terminalis erecta. Pedicelli
rari mox frangi. Bractea inter oblonga, venosa, subbiloba.

Pedicelli sili formis patentes bipollicares. Petala oblonga.

~~Petalamentis~~
Ramus teretica, acuta. gemma oblongum.

act. cur. L. folus Vernis qui natis: rod. u. alibus Ternis quonati raiemo lato
Jesuli Pall. act. petr. 1779. 2. p. 257. tab. 9. fig. 1. 3.
Habitat

non vidi

q Leontopetaloides Leontice foliis simplicibus tripartito-multifidis corollis monopetalis
calyculatis Lin. S. V. p. 332.

Leontopetalum Lam. epit. 565. Bauh. Pin. 440. Mon. hist. 2. p. 208. f. 3.
t. 15. fig. 6. Raii hist. 1326.

Leontopetalon foliis octo ramis innascentibus Tournef. cor. 49.

Habitat in Apulia, Aetna, creta. 4 herb. Gr. f.

Vita glabra. Eolia Vernata: foliola pinnata, bipartita: pinna laterales
inferiores geminatae, oblongo subrotunda, pollicares, venosa, emarginata
racemus apithamens. Bracteae cordatae, semunquiculatae. Pennulae
radicales bipollicares, uniflorae

vesicular L. radice tuberosa foliis ternatis: foliis lobatis, capsulis inflatis
Pall. d. 3. p. 726. tab. 5. fig. 3. Act. petr. 1779. 2. tab. 9. fig. 4.
Habitat.

non vid.

3 Thalictroides Leontice folio caulino triternato, florali biternato ^{Cur} Len. Spec. pl. p. 44 8 +
L. V. p. 332

Leontice foliis supra decompositis Gron. Virg. 151. *

Habitat in Virginia & herb. h. s.

Modus crescendi Eumedii. Caulis nudus, terminatus foliis imbricatis, patentibus, petiolo

latis: petiolo singulis trifidis, donatis novem foliolis, quorum lateralia
duo sessilia, biloba; intermedium petiolatum, trilobum; infra divisuram
primam caulis exsertit e latere folium petiolo tres: singulis simplicibus
triphylis, infra quos Racemus simplex cum duobus lateralibus ten.

Folia terna, ternata: foliola petiolata, bipolliciana, ovato-oblonga
arenaria, subnervosa glabra, terminale 3-^{interme}spidum: laciniis ovatis, ac
cutis, & utroque tenuissimis venosis: lateralia subtrepida, interdum gemina
ta. Racemi subcompiti.

Caulis teres striatus, glaber. foliolum intermedium bipolliciar: 3 fi.
dum lobo medio saepe tridentate. lateralia minus, latere cetero
opacem versus dante, notata, saepe integra: Omnia petiolata. Racemi
simplices pedicelli bifidi, cum floribus breviter pedicellatis indivisum
~~non videri~~ habemus.