

Lepidium

1. perfoliatum L. foliis radicalibus inferisque bipennatis, intermediis penna
fida, supremis ramisque cordatis amplexicaulis integris
2. sepiarium L. caulium geniculis inflatis
3. procumbens L. foliis pennatifidis, scapo pedunculis capsiformibus
caulibus basi procumbentibus
4. nudicaule L. foliis pennatifidis, scapo nudo simpliciter pino, floribus te
tradonit foliiculis subrotundis.
5. alpinum L. foliis pennatis integerrimis scapo subrotundato, foliiculis laniceo
latis mucronatis.
6. petraeum L. caule glabro, foliis pennatis integerrimis, petalis emarginatis
calyce mucronatis foliiculis oblongis.
7. cadaverum L. foliis radicalibus pennatis caulibus latis superionibus
basi dentatis, summis oblongis indivis
8. spinosum L. foliis pennatis foliolis latis extenonibus elongatis
ramis mucronatis

9. *Satureia* foliis inferioribus pennatis: foliis oblongis lanceolatis se multifi-
 dis, ciliis integerrimis, superioribus trifidis
10. *Dioskalis* l. foliis radicalibus pennatis: pennis incisis, cauleni pennatis fidis,
 summis incurvis, fructibus subdidymis
11. *Cynodon* l. foliis lyratis incisis
12. *Latifolium* l. foliis ovato-lanceolatis serratis, floralibus integerrimis
13. *Subulatum* l. foliis subulatis indivisis fraxis, caule suffruticoso
14. *Gramen folium* l. foliis linearibus: inferioribus serratis: superioribus inte-
 gerimis, caule paniculato virgato, floribus hexandris
15. *Suffruticosum* l. foliis lanceolato-linearibus tenuibus integerrimis, caulebus
 suffruticosis
16. *Oleraceum* l. ~~foliis~~ foliis lanceolatis, oblongis basi attenuatis inferioribus
 subserratis, superioribus integerrimis, floribus tetrandris
17. *Didymum* l. foliis pennatis, floribus diandris, fructibus didymis
18. *Tetralobum* l. foliis linear-lanceolatis incurvis, fructibus didymis
19. *Negosum* l. foliis cuneatis extus serratis, fructibus aggregatis seplectis
 negosi
20. *Divaniatum* l. foliis pennatis fidis, caule ramo simplici, foliis ovatis
 subemarginatis

21. ruderale L. foliis radicalibus dentato-pinnatis, ramiferis lineariibus integerrimis, floribus diandris apetalis
- 22. virginicum L. foliis radicalibus pinnatis, caulinis lanceolatis serratis, summis integerrimis, floribus subtetrandris
23. 4bens L. foliis inferioribus lanceolatis serratis, superioribus lineariibus integerrimis, floribus diandris
24. bonariense foliis ^{petiolis} pinnatis pinnis calicis, summis in d. corpis floribus diandris
25. chalapense foliis sagittatis sessilibus dentatis

Nasturtium minus superum vernum 1701. monsp.

Divesum videtur a radice caule et pro umbra herb. mui.

virginicum Stamina et plerumque 2 raro 4. Richard & Lequoune ne quidem rudimentum

Forskhalai lepidium foliis radicalibus pennatis, pinnis incis, caulini in
diversi pennatifidis, summi indivisi, fructibus subdidymis

Lepidium sativum Forskhal. Catal. fl. Arab. pag. 116

Caulis erectus, pedalis ramosus, glaber. Racemuli laxi, ramulosi ramu-
muli floriferi

Folia radicalia palmata, petiolata, pennata. pinnis oblon-
go, opposita vel alternis, decurrentes, antica incis, postica
integerrima, raris dente unico versus apicem, basi acuta.
Caulina inferiora et ramorum pennatifida. Calenii linea-
ritus integerrimis, interdum incisura una alterave, Suprema
lanceata, semiu quiculata.

Racemuli ex apice ramulorum, breves, pelosi.

Siliicula via magnitudine seminis sinapis, altero cavo
altero convexo, ut emarginata

ocymoides *Q.* foliis ^{incaeni} pediculis ^{trineuris} ovaratis apice petalo ^{utraque} subreflexis ^{utraque}
incaeni calycibus pedunculis calycibusque lobis glaberrimis
Cistus folio Samplicii *Clus. hist. 1. pag. 72.*

Habitat in Hispania

Caulis erectus ramosus ^{ramulorum} spithamou inferne purpurascens
rami uti folia ^{rami} canis, inferne pilis longis adpressi. Folia petala
4a opposita, semiconjuvulata juniora conduplicata, arenia
enervea, rudimenta ramulorum in art. illis radice ex apice
ramulorum pedicelli oppositi. Petala alba basi macula
purpurea

Descriptio e speci-
mine perfectiori

Folia rami juniora incaeni angulata, punctis ferrugineis adpressi
si oculo armato videndis, inferne raris pilis. Folia cal-
ramorum et inferiora ramulorum planta florentis, utraque
vicia ^{superiora} ^{inferiora} ^{subina} ^{obovata} ^{trineuris} ^{suprema}
vicia ^{subina} pilosissima axillaribus uti habet descriptio
ramulorum et ramulis axillaribus caule et rami
superior. Pedunculi laterales oppositi caule et rami
altioribus subspithamou, glabri. Fere inferne foliorum
duum panem fructa ramorum. Flores racemosi
pedicelli oppositi, bi pollicares remoti glabri, biflori
florebus pedicellatis pedicello altero genuculato semi-
unquiculares calycovatus acuminatus glaberrimus
lobis 4a triphyllis.

Sternium lepidum

Totter

Habitat herb. Musf.

Caules erectus, glaber. Folia sessilia, lanceolata, basi attenuata, extropium serrata, inferne
versus integerrima, glabra, crassiuscula. Racemi bi pollicares. Silicula oblonga, mu-
cronata, parva, glabra.

glastifolium Lepidium

Salicis - Caulis herbaceus, erectus, simplex, ^{inferne} superne ramosis, pubescenti: ramis simplicibus subfastigiatis. Folia radicalia et inferna oblonga, petiolata, obtusa. caulina sagittata, semper amplexicaulia, pollicaria, acuta, omnia integerrima glabra. Racemi ex apice ramorum 3-4 pollicares. Silicula subrotunda, proemarginata, stylo terminata, margine membranacea.

Lepidium

Lepidium orientale fruticosum scammonei Mespalianse filio Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb Musf.

Caulis fruticosus, ramosus, spithameus, et: tota planta glaber. Folia unguicularia, cordata, sessilia, acuta, crassa, avenia, margine pallidiora. Flores etiam plerumque bicoloratione magnitudinis, lactei. Siliqua oblonga, stylo longo terminata.

Lepidium?

Lepidium orientale caryophylli folio Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. mus.

Planta cespitosa. Caulis basi tecti squamis aridis brevibus membranaceis, striatis palmatis, simplicissimis, superne ramulo florifero. Folia semipolliciana, linearia, pili reversi adpressi, uti caules, integerrima, crassa. Silicula subrotunda

punctatum Lepidium

Lepidium perfoliatum orientale glaucis folio Tournef.

Habitat in oriente herb. Rusf.

Rami superne, patentissimi, flos usque inferiora
Caule erecto, pedalis, superne flexuosus, teres, glaber, lani. Solent 3-3 pulli
carni, semiamplexicaulia, integerrima, arenosa, cuneata, quinque nervia,
utroque adpressu punctis frequentibus albi, inferiora cuneata, superiora oblon-
ga, acuta. Porymbi compositi

Cynatum Lepidium

Habitat herb. Fusf.

Caulis erectus, ramosis, paniculatus, teres, glaber, striatus. Folia ^{glabra} radiata
petiolata, ^{glabra} spithamea, lyrata: laciniis subobovatis; terminalis bipollicaris,
remota, oblonga, intus obtuse dentata: caulina linearia, semipollicaria,
angusta, basi attenuata, integerrima. Flores minuti. Silicula
minuta, oblonga, acuta.

^{ves}
vespicanum L. cauleum geniculis inflatis Lin. l. V.
Lepidium orientale, nasturtii folio, caule vespicano Tournef. cor.
15. Barb. cent. 1. p. 17. t. 26.

Habitat in Iberia, Medio ordo O

Caulis dichotome ramosus, nit. duo loris. Folia petiolatopel
licana, subpinnata: pinnis linearibus, angustis. Siliculae fere
ut in Lepedio turcico

non vidi

est in herb. Sibum

perfoliatum L. foliis caulinis pennato-multifidis, ramiferis cordatis
amplexicaulis integris Lin. l. v. Faug. fl. austr. 4. t. 346.
Thlaspi alexandrinum Bauh. prod. 108. 50. pin. 108. hist. 2.
p. 933.

Thlaspi verum droficoidis l. Zan. hist. 193. Tab. 129.

Nasturtium fricatum persicum perfoliatum maximum
Mont. hist. 2. p. 294. f. 3. v. 25. fig. 17.

Habitat in Persia, Syria &

Caulis erecti pedalis, superne ramosus, striatus, uti tota planta, glaber
et infima reticulata palmata
Folia radicalia bipennata: penni lanceolatis bifidis
sequenta amplexicaulia frondefida ^{bipennata} lanceo-lanceis
latius supra et ramosa cordato ovata acuta integerrima
pelticaria avena. glaucis viridia. Racemi fructuum bif.
tripollicari bute

foliis radicalibus infimisque bipennatis, inter medias pelta
pinnatifidis, supremis ramosisque cordatis amplexicaulis
integerrimis

1710
~~1710~~ umbrosol. foliis pinnatis-extremo majore, capsulis
prostratis racemiferis L. Scept. p. 89 & Mant. 424.
Nasturtium pumilum supinum verum Magn. Monsp. 185. V. 1824
Habitat Montpellier O

Caules plures basi procumbentes demum erecti. Ligniformes ramosi.
Digitales vel palmares, foliosi. Est caecus. Folia parva
radicalia petiolata pollicaria caulina vix unguiculata
omnia pinnatifida caecis oblongis utraque acuti medio sub
oppositis 4. vel 6. Racemi erecti caule dimidio breviores.
pedicelli caeci pleuro oblongo

~~pinnatifida~~ ~~caecis~~ ~~oblongo~~

petrosum L. foliis pennatis integerrimis, petalis emarginatis calycis minoribus L. S. V. pag.

Facq. fl. austr. 2. t. 131.

Nasturtium pumilum vernum Bauh. pin. 105:

Cardamine pupilla saxatilis montana discoides. Col. Euphr. 1. p. 272
t. 273.

Habitat in Lapidosi Oelandia, Anglia O

Planta digitalis glabra facie lapidi procumbentis glaber
superne rana o uno vel altero. folia petiolata unguicula
nei folioli utroque o parvi oblongis, acuti extremis parum
majoribus. siliula oblonga

Cardamine L. foliis radicalibus pennatis, caulinis lyratis. Loef. d. 374
An. acad. 4. p. 2704 Act. holm. 1755. p. 273. v. p. 9.

Lepidium foliis inferioribus alterno-pennatis carnosis glaucis,
superioribus sessilibus dentatis apice ovatis Ard. spec. 1. p. 19. v. p.

Habitat in Hispania argillosis ♂

Caulis ^{plures} erectus teretes palmari vel pithamocii pulverulento
vellosi canescentes ramis ~~rami~~ simplicibus erectis. Folia
radicalia pennata: ^{interdum interrupte pennata} pinnis ovatis subrotundis petiolatis obtuse
angulatis utriusque sensim minoris interdum interrupte
pinnata, foliolum terminale parvisyllae: superiora
caulina lyrata superiora oblonga basi ^{laevigata} lobato-hastatis
suprema oblonga indivisa racemi ex apice ramorum

superioribus basi dentatis
summis oblongis

indivisi

Tophæa Lepidum

Cynodon f. foliis *Cynati* crispis Lin. l. v
Lepidium orientale, nasturtii crispi foliis Tournef. Cor.
15. An 339. t. 339.
Habitat in oriente.

non vido

Divaniatum L. foliis pennatifidis, caule ramosissimo, filiculis ovatis
submarginatis Hort. Kew. 2. p. 375.
Habitat ad Cap. b. p. 17

non vidi

latifolium L. foliis ovato-lanceolatis integris serratis L.V. fl. Dan
t. 557.

Lepidium plinii Dod. pempt. 716.

Lepidium latifolium Bauh. pin. 97.

Habitat in Gallia, Anglia &ania succulentis umbrosi monti
ni 4

Caules erecti teretes sesquipedales superne ramosi glabri.
Folia utraque attenuata glaberrima medio serrata
apice & basi integerrima. Racemi ex apice ramorum
compositi, folium ad basin ^{parvum lanceolatus} singuli racemuli.

floralibus integerrimis

Danica Q foliis hastato-angulatis: omnibus deltoidibus
manus. fl. Dan. 1. 100.

Draba *C. foliis lanceolatis amplexu aulibus dentatis* Lin. *L. V. p. 580**

Paigu. fl. austr. 4. t. 315

Draba l. vulgaris Clus. *hist. 2. p. 124.*

Draba umbellata f. major, capitulis donata Bauh. *pin 109*
mon. f. hist. 2. p. 313. f. 3. t. 21. fig. 1.

Habitata in Austria, Gallia, & Italia ad vesperas 2

Caulis ramosus erectus pedalis uti folia velle minutis adpressa
folia basi attenuata simpliciter venosa inaequaliter
dentata super floralia saepe subintegerrima. Silicula ovata
trijulo longitudine silicula terminata

Subulatum L. foliis subulatis indivisis parvis, caule suffruticoso.

Lin. Spec. pl. p. 899 *

Lepidium, capillare folio, fruticosum Hispanicum Tournef.

Fr. R. H. p. 216.

Habitat in Hispania & t

Caule lignosi ramosi rami parvi, prostrati vel tenuis
conspicente. folia parva, coriacea, supra plana subtus semi
teretia fasciculi foliorum ex omnibus articulis inferioribus
nulli in supremo versus racemum. Racemi terminalis silicula
Lepidii nudae talis

Suffruticosa L. foliis lanceolato-linearibus tenuibus integerrimis, in
libris *suffruticosa* L. Lin. Man. 96. t. V. p. 516.

Habitat in Hispania &

Caules erecti teretibus luxuriantibus. Filiformes viventes. Folia
angusta lanceolata, integerrima, coriacea, tenuia nec carnosy, vix
divi patentia ad gemmas saepe plures. Corymbi parvi albi. Petala
calycis vix longiora. Stamina sex fructus nasturtii

Chaleperse L. foliis sagittatis sessilibus dentatis Lin Am acad 4

p. 3214

Draba chalenensis repens humilior, foliis minus cinereis et
quasi virentibus Monf. hist. 2. p. 314.

Habitat in oriente.

8 aeri Thlaspeos campestris et vix nisi filiculis distinguatur
sur Lin.

non vidi

Gramineifolium L. foliis linearibus: ^{inferioribus serratis} superioribus integerrimis, caule
paniculato virgato, floribus hexandris Lin. t. V. p. 586. Spec.
pl. p. 900x

Thlaspi leptaneum umbellatum, gramineo folio, flore
albo Tournef. F. R. 4. 213.

Habitat in Europa australi &

Statura *Lepidiifolii*: Caulibus paniculatis virgatis, ^{teretibus}
corbui. Folia radicalia prima pennato-lyrata, caulina
inferiora serrata, superiora linearia integerrima. Flores tetan-
dri parvi albi calyce purpurascente

alpinum L. foliis pinnatis integerrimis, scapo subradicante, filiculis lan-
ceolatis mucronatis Am. ar. ad. 4. p. 3214 Jacq. fl. austr. 2. 7. 1777

Thlaspi montanum minimum Galich. hist. 1180

Cardamine alpina D. minima Claf. hist. 2. p. 120.

Raffanum alpinum Venerupine *diversum* Bauh. pin. 105. hist
2. p. 910.

Habitat in Helvetiis, Baldo.

Radix superne diversis. Oculis inferne aggregata nulla superne
ret. colata six pollicaria, crispifoluglabra, pinnatif.
Da laciniis utraque tres vel quatuor oblongas obtusis appo-
rimatis interonibus parum minoribus. Scapus erectus
Digitalis glaber. floris ratione planta majori.

oleraceum L. foliis elliptico oblongis acutis serratis; floribus Tetrandris
Sext. pl. exal. p. 69. fl. austr. p. 46.

Lepidium bidentatum

montanum nov. act. acad. ^{nat.} Linn. 6. p. 324. Tab. 5. a.

Habitat in nova Zelandia C.

Caulis erectus basi erectus ramosus teres, glaber uti tota plan-
ta. Folia basi in petiolum attenuata crassiuscula pila
rancia sesqui pollicaria inferiora parte serrata, superio-
ra integerrima. Racemi ter miniales ramorum

floribus Tetrandis, foliis ^{lanceolato} elliptico oblongis basi attenuatis
inferioribus serratis superioribus integerrimis

Nidivale L. floribus dianthi apetalis, foliis radicalibus dentato pinnatis,
ramiferis linearibus integerrimis in L.V. fl. Dan 1. 184

Nasturtium angustifolium Tuck. herb. 307.

Nasturtium sylvestre, oxyridis folio Bauh. pin. 105.

Habitat in Europa nideratis et ad vias C

Caulis ramif. rigidus ^{angustus} vix glaber rami patentes
rami superne puberuli. Dolia inferora dentato pinnatifida superiora
vulento villosi linearia, racemi et apice ramulorum flores minuti

Theris L. flombr di ead in tetrapetali, foliis inferioribus lanceolatis
superioribus serratis; sic peronibus lineariibus integerrimis
S. V. mant. 425.

Theris God. pempt. 714.

Theris latiore folio Bauh. pin 97.

Habitat in Germania Italia, Gallia, Sicilia sic ut vras C
superne ramorum.

Similis Vry. Caulis erectus pedali ferebus glaber tenuis. Folia versus apicem
serrata.