

Leptospermun

Cal. 5 fidus Lemnifera. Pet. 5 que unguiculata, staminibus
congrua. Stigma capitatum. Caps. 4-5 loculari semina
angulosa

prophyllum leptospermum

Habitat herb. La Revellere Le Paux

Rami virgati, angulati, glabri, cinerei. Folia linearia, subtus punctata
obtusae. Flores laterales ramulorum

habes

Juniperum leptospermum

Habitat

herb. La Riv. le Paux 5

Rami fructi, teretes, glabri. ramuli frequentissimi, patentes, pollicares, villosi.
Folia frequentia, subulata, subimbricata, Flores laterales ramulorum
lesiles

herb.

stellatum leptospermum

Habitat.

herb. La Pucelle - La Pucelle

Rami teretes, glabri, rugati, folia frequentia, sparsa in ramulis oblonga,
mucronata, c. c. c. terminales, sessile, solitarii.

habes

Juniperifolium leptospermum Caran.

an Phlœdalphus aromaticus

Habitat herb. Guss.

Rami frequentes, sparsi, teretes, apici e villosis-tomentosi, inani. Folia sesplia,
unguiculata, lanceolata, rigida, acuta, subpungentia, arenia, enervia pubes
nuncata, glabra, suprema, imbricata. Flores laterales, sesplia.

Salicifolium Leptospermum Lamark

Habitat herb. Gusf.

Rami glabri, inferne teretes, superne angulati. Folia breviter petiolata, sesqui polli-
cana, lato-lanceolata, utrinque ciliata, integerrima, alterna, avenae,
enervi. Corymbi axillares, folio multo brevioribus, trifidi: pedicelli 3-4 flori

Calceolum leptospermum

Habitat herb. musci

Rami teretes, superne incani - Folia alterna, oblonga, sex pollicaria,
petiolata, coriacea, pallida, utraque glabra, obtusa, subtus venis fine
venosa - Racemi terminales, breves

Collinum leptospermum

Habitat herb. Musci

Thami Veretes, superne incano-tomentosi. Folia opposita, usque pollicaria,
oblongo-subrotunda, glabra, venosa, integerrima. Petioli et costa inferne
incani, stete glabri. Flores in racemo brevi, terminali

tenuifolium leptospermum

Habitat herb. mus.

Rami alterni, teretes, glabri. Folia petiolata, alterna, pollicaria, lanice
lata, integerrima, acuta, utrinque glabra, avenea. Peduncululi axillares,
2-3, ~~flori~~ folio duplo breviores, uni flori.

Scandens *Leptospermum*

Habitat herb. Mucosi

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, pollicaria, opposita, oblonga, obtusiuscula, venosa, integerrima, utraque glabra, subcoriacea. Petioli vix semiunguiculares. Pedunculi axillares et terminales, triflori: flores subsessiles. Germen triloculare, glabrum: lacina calycis rotundata. Petala oblonga. Stamina longissima.

Salsola esculenta L.

Myrtus angustifolia Burm.

Habitat in cap. b. p. n. 5

periparifolium *Leptopresmum* foliis sublineari-anguste acuminatis,
ramulis villosis, calycis glabri laciniis persistentibus. Cavan. 4.
vol. 4. pag. 10. tab. 331. fig. 2.
Habitat in nova Hollandia 5

Leptopresmum Smith

multiflorum *Leptospermum* foliis ovatis acuminatis uninerviis alternis
floribus axillaribus deciduis laciniis calycinis deciduis Cavan.

45: vol. 4. pag. 1. tab. 331. fig. 1.

an *Leptospermum squarrosum* Godmer

Habitat in nova Hollandia 5

Leonurus

stellatum *Leptospermum* foliis ovatis oblongis trinerviis alternis pinnati-
fatis floribus solitariis pubescentibus; calyce integro persistenti
Cavan. Ic: vol. 4. pag. 16. tab. 330. fig. 1.
Habitat in nova Hollandia &c

porophyllum *Leptopisium* foliis ovato oblongis obtusis basi angustioribus
dense punctatis, floribus solitariis terminalibus, laciniis calycinis
Deciduis Cavon. & Con. vol. 4. pag. 77. tab. 330 fig. 2.
Habitat in nova Hollandia 5

an eadem ac flavescens.

~~Philadelphus~~
Scoparius ~~Melaleuca~~ foliis lanceolatis integerrimis rigidis trinerviis, floribus
omnibus quinquefidis, laciniis calycinis coloratis deciduis Hort. Kew. 2. p. 156
a. ~~myrtifolius~~ foliis lanceolatis

Melaleuca Scoparia: foliis alternis ovatis acutis trinerviis punctatis flori-
bus terminalibus solitariis Lin. Suppl. p. 343 * S. V.

Leptoppermum Scoparium Forst. nov. gen. 36. 6.

Melaleuca Scoparia foliis alternis ovatis acutis subtrinerviis: floribus
terminalibus solitariis sespibus. Forst. pl. ex: 53. prod. 37.

β. myrtifolius foliis ovato ellipticis

Habitat in nova zelandia & glaber

Frutex ramosissimus rigidus ramuli tenelliferrici. Folia sespilia & parva
ac utrimque subpungentia rigida glaberrima, arena pagina inferiore
punctis resinosis tecta, patentissima. Flores in quavis ramulo solitarii
maiores, albi, sespiles Lin.

Scoparium Leptosp. foliis ovatis mucronatis obsolete trinerviis, calyci-
bus glabris; dentibus membranaceis coloratis Smith. L. Trans. 3. p.

262.
Leptoppermum Squarrosum Gortn. tab 35

Philadelphus Scoparius H. Kew

non vid.

flavescent L. foliis linear lanceolatis obtusis enerviis, calycibus
glabris: dentibus membranaceis coloratis nudis Smith L. Trans.
3. p. 262.
Habitat -

Sionanã M. foliis alternis ovatis acutis trinerviis punctatis, floribus terminalibus
solitariis. Suppl. pag. 43. * l. v. p. 699.
Leptogermium sionanum Hoff.

Hook. et. vol. 2. p. 100. cum figura
Habitat in Nova Zelandia t

attenuatum L. folus lanceolatis-lineambus acutis triser
ris, calycibus fereis, allopis dentibus membranaceis
coloratis nudis pilis Smith L. Transact. 3. p. 262
habita

Canis Philadelphiae foliis oblongis acutis integerrimis, floribus ~~maestis~~
quosque pubescentibus, calycibus lanatis Hort. kew. 2. p. 176

~ canescens foliis ovalibus villis canescentibus

B. pulcher foliis lanceolato-oblongis pilosi subobliqui apice reflexi
Habitat in nova Wallia australi

Canigoinum L. foliis obovato lanceolatis trinerviis, calycibus sericeis
villoso: dentibus foliaceis persepentibus Smith. her.
transact. 3. p. 263.

Leptospermum Trinerve White's Voyag. 229 tab.
Myrtus amboinensis montana Ruemph. amb. 2. t. 10^o?

parvifolium L. [†] foliis obovatis enervi, ramulis calycibusque
pilosis: dentibus membranaceis coloratis Smith & Hen
transact. 3. p. 263

Habitat

non vidi

~~Smith & Hen~~

~~Squamula Squamula m~~
~~laevicollis~~

Mitros. ~~Squamula~~ Squamula
Capsula subglobosa calycis edentulo: margine
inquali repando gestu.

non vidi.

~~arachnoideis M.~~

metrop. arachnoideis capsulis globosis: calycis tenuissimis lanato,
quinque-dentato Godefr. de sem.

arachnoideum. Tent. foliis subulatis pungentibus ramulis hirsutis
calycibus dentibusque villosis Smith. Len. transact. 3.
pag 263
Habitat.

6.

non vid.

Tunicpernium l. foliis lineari-lanceolatis pungentibus,
ramulis fructu, calycibus glabris: dentibus membra-
naceis coloratis ^{nudis} Meth l. Trans: 3. p. 263.

Habitat

non vid.

~~embriata~~ M.

~~fungo embriata~~ Gaster. tab. 35. fig. 5

non vid.

baucatum L. foliis lineari-lanceolatis pungentibus; ramulis
hirsutis; calycibus glabris: dentibus membranaceis coloratis
pubescentibus; capsula baucata Smith her. trans. 3. p. 264
Habitat

0

non vidi

ambiguum L. foliis lineariibus apice recurvis calycibus
glabrisiulis dentibus foliaceis lanceolatis nudis
staminibus corolla longioribus Smith L. Trans 3.
pag 264.

Habitat

non vidi