

Leysera

1. gnaphaloides L. foliis pinnatis flombus pedunculatis
2. calliornis L. foliis ternatis, flombus sessilibus
3. ~~fasticulata L. foliis fasciculatis, flombus sessilibus~~

Leysia

Habitat in Cap. b. per herb. Royenii 5

Caulis semipedalis, statim a basi ramosus: rami pauci, apice interdum emittens
ramuloi 3-4. brevibus, erectis, fruticosis. Rami inferne glabri, superne villosi;
folia frequentissima, linearia, angustissima, semipollicaria, integerrima,
subtus incana, glandulosa, acuta, patentia. Calyx magnitudine *Leys. graphi-*
lodi, obovatus; squamis lanceolatis, acutis, junctibus subtomentosis, stilate glabri-
lucis, scanosis. Pappus plumosus
a *Leys. graphi* differt praecipue squamis calycinis lanceolatis acutis nec oblongis
obtusis.

Calyx oblongus imbricatus squamis inferioribus ovatis superioribus
linearibus oblongis ^{omnes} apice apice margineque membranaceo integro
in medio dorso linea viridi

Corolla radicata. Regulato tubo filiformi lamina lanceolata apice
obscure bidentata.

Stylus longitudine tubi stigmata duo filiformia

Corollula disci quinque-dentata

Pappus pilosus sessilis

Receptaculum planum nudum (palea adactur ad dorsum radio)

Leysia gnaphalodes

2 *Callicornia ceysera* foliis trifloris floribus sub sessilibus Mant. 206.

Calicornia gnaphalodes Burm. prodrum. 24. Plank. phys. 350. fig 4.

Habitat in cap. b. frei

non vid.

^{Leaf}
Caroliniana foliis radicalibus rotundatis subseriatis hirsutis caulibus
oppositis Wal. fl. Car. pag 211
Habitat in Carolina

non vidi