

Light foodia



Leptocarpus serrata

Serrata Lightfootia foliis ellipticis serratis, pedunculis lateralibus aggregatis brevi-
bus

Lightfootia serrata Sw. prodr. pag. 83.

Habitat in Mont. Serrat in Ryan 5.

Habitus Prostratus
Rami Vesetos, glabri, cortice cinereo, a punctis elevatis et tuberculis post capsum

Foliorum et pedunculorum inaequali.
Folium pedicelata, alterna, saepe ex apice ramulorum, elliptica, attenuata, basi apiceque acuta, utrinque glaberrima, venosa, membranacea, serrata: serraturis remotiusculis.

Petoli femiunguiculari.

Pedunculi uniflori, laterales vel ex apice ramuli aphylli brevissimi, aggregati, interdum 0. interdum pauciores, glabri, breves.

Flori hermaphroditi masculis foeminei in distinctis plantis

♂ Calyx tetraphyllus: folioli ovatis, acutis.

Corolla nulla

Stamina filamenta numerosa, longitudine calycis. anthera subrotunda
filamenta, parva, utrinque linea exarata, subdidyma.

♀ Calyx perispermis: folioli ovatis.
Corolla nulla

Stamina nulla

Stylus nullus.

Germen ovatum, superum, calyce parum brevior. Stigma sessile, orbiculatum, sulcatum, maturitate in 3. 4 lobos rumpens.

Bacca globosa, magnitudine pipi. Semina, oblonga, nitida, vix magnitudine semini coriandri, duo abortientia

Oruznosa Lightfootii

Habitata in insula Bobonia Commerçon herb. Fus. 5

Rami sparsi, teretes, glabri, cortice cinereo. Folia petiolata, alterna, bypollyciana, oblonga, integerrima, glaberrima, supra nitida, saepe colore oruzniis, avenae, subcinerea, enervi, subtus pallida subtilissime venosa, punctata, obtusa. Petioli semivulgares, purpurei. Pedunculi laterales, aggregati, uni flori, usquidulares.

Leightfootia

Habitat in Madagascar Cbm. herb. Fusf.

Rami alterni, glabri, frequentes, superne tetragoni. ^{alterni,} Folia petiolata, pollicaria, ob
longa, obtusa, basi attenuata, glaberrima, venia, ^{utrinque} obscure oblique nervis ^{puber-}
menatis ^{elevatis} punctata, remote crenata. Petioli brevissimi. Pediculi ex apice
ramulorum, brevissimi, 5-6 flori. Pedicelli semi unguiculares

repanda Lightfootii

Habitat in Madagascar Commes herb. Mus.

Rami virgati, teretes, cinerei, flexuosi, teneres, alterni, glabri. Folia petiolata, alterna, semipollicaria, ovata vel subrotunda, basi acuminata, obtusa, repanda, obscure venosa, laevi, subnitida, remota. Petioli semunquiuulares. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, semipollicares.

Lightfootia

1 fenata Lightfootia foliis ~~acutis~~ oblongo-ferratis ^{ovatis} acuminati, pedunculis lateralibus
aggregatis

Lightfootia fenata Swartz prodr. pag. 83.

(Lecta in Montserrat a Dr. Ryan qui benevole hanc mecum communicavit una cum ditissima collectione plantarum rarissima nempe hujus insulae quam ex insula Trinitatis, quarum descriptiones sequens ille fructus publici juri quam primum facere constituit, ratus me rem facerem Botanicis acceptissimam.

~~undulata~~ undulata 1910-1912. Descriptionem ulter. vide in ter Desi: Amer.
191-

^{Lignif. fodicia}
2 Theiformis ~~Prostrata~~ foliis lanceolato-ellipticis serratis, ^{obtusiusculis} pedunculis axil-

laribus subsolitaris unifloris
Habitat in Insula Bourbon J.
Habitus Thea

Rami, utriusque reliqua partes, planta glabra.

Folia petiolata, alterna, bi-pollicaria et ultra, nervoso-venosa obtusiuscula, interdum emarginata, basi ad pediculum parum reflexa

Petiolus vix semiquadrilaterus, e folio parum decurrite marginatus.

Pedunculi axillares, solitarii vel gemini, et e tuberculo ^{a folio} distincto ~~emergentes~~, ^{infidens} sesquipedales, basi versus squamula minutissima infunditi.

Calyx tenuis, membranaceus.

Germe conicum

^{oblongo} Capsula stylo truncato brevi terminata, unilocularis.

Semina 3. 4. glabra, nitida.

192

179

(~~Haec tres conveniunt habitu, calyce, staminibus, fructu vero differunt, quod est verisimile. Fuit sub eodem genere retinenda~~) ^{stilo}

Ligustrum tubicola ^{oblongis obovatisque}
7 integifolia ^{Proctus} foliis emarginatis subintegerrimis, pedunculis
lateralibus ^{parvis, serratis} unifloris

Habitat in Insula Francio cum antecedente benevolentia
in Suspici debet

Rami teretes, glabri, cortice cinereo.

Folia petiolata, ^{pollucina et utrinque} alterna, rarius obovata, ^{non simpliciter venosa} asensia, basi acuta,
subcordata, margine obsolete crenulata, loria.

Pedunculi rfb, ex axillis vel ad latera ramorum, ad unum
n, unguiculares, adpressi squamulis nonnullis.

Floris majores quam in reliquis.

Calycis foliola obliqua.

Stylus ut in *P. theiforme*

Haec tres conveniunt habitu, calyce, staminibus, fructu vero et
stilo differunt ~~theiformis~~ et integifolia

193
100
(Hanc una cum precedente uti species Proctus misit amicus finis
Suspen. Conveniunt certe quam maxime Calyce, staminibus
et habitu, ut ignoto genere *Ligustrum* facile species esse
veste

(Proctris credes. Differunt vero precipue stigmatibus
num ~~hermaphroditus~~ Polygama sunt uti prima species ignoro, ego tantum hermaphroditos
vidi. Lightfootia oxycooides et subulata Gmel. ed. Syst. Lin. minime
huc pertinent. L. Herdieri male ad hoc genus a Gmelino in ed. Syst. Lin. ~~re-fata~~
referuntur, nil nisi nomen commune habent cum Lightfootia Swartzii