

Ligustrum

3

Cal. 4 dentatus. Cor. 4 fida. Bacca 4 sperma bilocularis: loculi di-  
spermis

- ~~1. vulgare L. foliis lanceolatis, panicula simpliciter trichotoma~~
- ~~2. latifolium L. foliis ovalis acuminatis, panicula decomposita trichotoma~~

18.  
17 Ligustrum. Cal. 4 dentatus. Cor. 4 fida. Bacca 2-bocularis:  
loculis dispermis

vulgare 1 Ligustrum foliis lanceolatis, <sup>elliptico lanceolatis glabri</sup> ramis compositis <sup>concreta</sup>

Ligustrum Borensis B. p. 185 math. 176

Pluto Kompt. am. Exot. fasc. V. 298

Ligustrum vulgare; foliis lanceolatis acutis, panicula pedicellis oppositis

Lin. Syst. Veg. 56. Flor. Dan. t. 1141.

italicum β. foliis lanceolato-acutis Mill. Dict.

Habitat in Europa collibus glareosis, ad saepe inque Japonia <sup>brevis</sup>

Rami teretes, glabri; ramuli apice pubescentes. Folia petiolata; pollinaria et

ultra, primum lanceolata, dein lanceolato-elliptica, utrinque acuta.

Color albi. Basia nigra

folia semperverentibus.

Varia foliis ternis; auratis; fructu albo. β. gaudet foliis semperver-  
entibus. De Roi Hortik. .1. p. 576.

*Juncea Lychnis* foliis lanceolatis, racemis oblongis cæcilibus et terminali  
bus Lour. fl. Cochinch. pag. 19

Habitat prope Cantonem Siamum

arbor 3 pedalis. folia integerrima tomentosa, petiolata. flores albi.

Bauhinia 4 perma

Sinense ? Liquidum foliis lanceolatis tomentosis, racemis corymbatis. +  
Liquidum sinense; foliis lanceolatis: racemis oblongis, lateralibus et ter-  
minalibus Lourer. fl. Cochinch. 19.

Habitat prope Cantonem Sinarum &

Arbor ortopedalis. Rami diffusi. Folia petiolata. Flores albi. Calycis  
obiformis. Bacca minima, subrotunda, fusca Lourer. l. c.

virginica Chionanthus pedunculis trifidis trifloris L. V. p. 56. f. 9. H. B. Cliff. 17. Sp. pl. p. 11. 1  
Amelanchier virginiana, laurocerasifolio Pet. sic. 241. Cad. by Carolina r. p. 60. t. 60.  
Habitat in America septentrionali

~~ramuli apice villosi folia petiolata ovalia basi acuta.~~

~~Flora in racemis <sup>superis</sup> foliis; pedunculis trifloris foliis oblongis acutis~~

~~vel <sup>terminali</sup> ramis pedunculatis axill.~~ Petala latera quam in reliquis

~~racemis <sup>terminali</sup> pedunculatis trifloris, floribus pedicellatis petalis linearibus~~

~~canaliculatis~~

Japonicum & Ligustrum foliis oblongo-ovatis subacuminatis, racemis decempositis, pedunculis  
pedicellis patentibus. <sup>Japania Wattasi Kempf. An. Ex. fasc. V. 776</sup>  
Nipponi Motpi, alius Ligustrum japonicum foliis ovatis acuminatis, panicula decemposita Trichostema  
Thunb. fl. japon. 17. t. 1.

Habitat in Japonia

Rami tertiusculi, rugosi, cinerei, oppositi. <sup>Res qui pollicaria</sup> Folia petiolata, glabra, medio superiore  
pubes longitudinali, subcinereo, arsenia, <sup>intrinseca</sup> acuta, <sup>vel obtusa</sup> apice magis curvata  
obtusis. Pedunculi et pedicelli oppositi, angulati. Bractea sub pedunculis  
inferioribus, lanceolata, sub superioribus setaceis. Calyx tubulosus apice dilatatus  
truncatus, obsolete quadridentatus, glaber.

Habitus generis. Rami superne, et pedunculi compressi. Folia petiolata, opposita,  
indivisa, integerrima.

Japonicum & Ligustrum foliis ovatis acuminatis

Domengezi Cl. foliis ovatis utraque glabris, panicula terminali subdymosa  
calycibus lobis La Mart. T. E. pag. 30  
Habitat in Dominica 5

~~reviser~~