

Lilium

Phalangium canadense Lili convulsi splio

Habitat in Canada herb fus,  
gemina, elliptica

Folia graminea, radicalia, lata, acuta, basi attenuata, pithamea. Scap  
pus teres. Flores tres, pedunculati: pedicelli incurvi, semipollicares. Petala  
lanceolata, basi tomentosa. Filamenta filiformia, liti styles longitudina  
Corolla. Spatha nulla  
an lilium?

1 candidum Liliū foliis sparsis corolis campanulatis: intus glabris Len. I. V. p. 324.

Lilium candidum Dod. perempt. 197.

Lilium album, flore erecto, vulgare Bauh. pin. 76.

β. Lilium album, floribus dependentibus s. peregrinum Bauh. Pin. 76.

γ. Lili albi pulehni et ignoti species Bauh. Pin. 76.

Lilium caule plano compresso Gron. Oreat 106.

Habitat in Palæstina, Syria, Gades &

Caulis bipedalis teris, teris. Folii quadripolliciano, obtusiuscula, supra  
na ovato-lanceolata. Flores nudentes. Petala candida sessile  
basi parum attenuata.

Congiflorus L-folius canicollatis, corollis tubulato campanulatis  
caule glabro Trunb in Act. pr. - ten.  
Habitat in Japonia

non vidi

*Canisfolium*. L. foliis oppositis lanceolatis, nervis erectis subcomprom-  
catis Thunb in Act. Soc. Lan.  
Habitat in Japonia

non vid.

Platylobium

Legum: pedicellatum, compressum, dorso alatum, polypermum



3 pomponium liliu foliis sparsis subulatis, floribus reflexis, corollis revolutis lin  
Spec. pl. p. 434 + S. V. p. 324.

Lilium nigrum procor Clus. h. 1. p. 133.

Lilium nigrum angustifolium Bauh. Pin. 70.

Lilium radice tunicata, foliis sparsis, floribus reflexis, corollis revolutis -  
Gmel. Sib. 1. p. 42.

β. Lilium miniatum odoratum angustifolium Bauh. Pin. 79.

V. Lilium brevi et gramineo folio Bauh. Pin. 79

Habitat in Pyrenois, Sibina 2

Caulis lavi bipedalis vel ultra. Folia frequentia obtusiuscula, angusta  
erecta, ~~est~~ bis. Tri pollicaria. Petala aurantiaca, linearia  
apice callosa bi pollicaria. Nectarii una valde dentata



<sup>Cilium</sup>  
Cordata ~~Hemerocallis~~ foliis cordatis venosi Thunb fl. Lap. p. 143. L. V. p.

Caulis teres glaber

Habitat in insula Nepon Japonia

Caulis teres, glaber, pedalis. Folia alterna, petiolata, ovata oblonga, acuta, subtus pallida, utrinque glabra, erecta, spithamda, palmam lata, juniora minus minus cordata. Petioli compressi, alati longitudine folii. Flores terminalis, alterni, erecti. Capsula ovata, angulata, 6-valvis, 6-lobulata glabra prolicia. Semina imbricatim imposita; orbiculata, depressa glabra, ala membranacea cineta Thunb. l. c. an hujus generis?

4 Chalcedonicum liliū foliis gracilibus lanceolatis, floribus reflexis, corollis revolutis  
Lin. S.V. pag 324. Spec. pl. pag 434. Jacq. Pl. Rust. Vol. 5. app. t. 20

Liliū rubrum f. miniatum byzantinū Clus. h. 1. p. 131.

Liliū Byzantinū miniatum Bauh. Pin. 70

β Liliū by byzantinū miniatum polyanthos Bauh. pin. 70.

γ Herosocallis chalcidonica Lobel. Ic. 164.

Liliū purpureo sanguineum, flore reflexo Bauh. pin. 70.

Habitat in Persia, Platina Carniolia &

Racemus ante florescentiam rix incurvatus ut in 305 Caulis usque ad  
apicem vestitus foliis congestis lina.

5 pyrenaeicum Lilium foliis subulatis parvis floribus subumbellatis reflexis corollis revoluto  
tis Jouan illustr. p. 25.

Lilium montanum flore flavo Lob. adv. p. 205.

Lilium montanum, flore maculis distincto Clus. appt. et altera

Lilium montanum, flavo flore, nigris et atrioribus maculis Clus. tur. post.

Habitat in herbis Pyrenaeorum.

Radix flava, squamis <sup>ad radicem usque</sup> infallis. Caulis crassitie digiti minoris, bipeda  
lis finatus. Folia <sup>ad radicem usque</sup> numerosa, 3-4 pollicares (in culta) angusta, erecta  
marginibus albedo ciliata subtilissime ut in Pompeis et Chalcidoneis  
Julis et exarata. Caulis 1-4 florus. Pedunculi bipollicares, in culta  
non umbellata sed alternatim <sup>folia suo ad basin singuli</sup> pedata pollicaria flava sordide rubro  
maculata. Corolla flavo ciliis prominentibus inaequalibus  
et nigricante rubroque violaceis, purpureisve striata.

6 Superbum liliium foliis sparsis lanceolatis, floribus reflexis ramoso-pyramidalis, corollis  
revolutis Lin. S. V. pag. 324. Mill. Diet. n. 8.

Si am J. Martagon canadense, flore punctato Cat. Fear. 2. p. 56 et 56.

Liliium foliis sparsis, multiflorum, floribus reflexis pseudo aureo limbo  
aurantis, punctis nigricantibus, pedunculis fragilibus uno foliolo Tricor.

Chret. 2. p. t. 11.

Habitat in America septentrionali

*Speciosum* L. foliis sparsis ovato oblongis floribus reflexis, corollis  
revolutis, caule ramoso Thunb. in Act. sci. Linc.

Habitat in Japonia

non vid.

7 *Gaponium litium* foliis parvis lanceolatis, corollis cernuis <sup>sub</sup> campanulatis Thunb  
fl. Jap. p. 133\*

Kasbako vulgo Konocho Tun i. Konei Tun Komf. Am. ex. Jap. 5<sup>th</sup> p. 971.

Habitat in Japonia

Caulis teris, lavis, glaber, bipedalis. Folia alterna, petiolata, acuminate  
marginata, glabra, sesqui palmaria, subtus pallidiora, 3 nervia et  
stipes terminales reflexi cernui. Corolla campanulata, albida, pal  
mani. Differt a *G. albo* foliis parvis in caule debilem unifloro  
remotis, longiusculis, petiolatis, nervosis

non vid.

*Cordifolium* L. foliis cordatis Thunb. in Act. Soc. Sci.  
Habitat in Japonia

non vid.

*Soromeum* | *Platylobum* Ait. *fori*: *lea-hend.* 2. p. 340.

Habitat in nova Hollandia.

Folia opposita cordato-ovata acuta. Stipula canaliculata.

Flori axillares solitarii. bractea ad basin pedunculorum ovata  
conicava. Filamenta basi omnia connata. Calyx infidus  
lobis duobus supremis maximis obtusis



Poster hoc L. caule unifloro, petalis unguiculatis Walt. fl. Car.  
pag. 123.

Habitat in Carolina

non vidi

maculatum l. foliis parvis verticillatisque lanicolatis globis  
corollae campanulatae intus maculatae, limbo reflexo  
Thunb in Act. Soc. Lin.  
Habitat in Japonia

non vid.

3 Martagon Liliaceae foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis Lin. V pag. 324 Gaerq.  
flor. Aust. V. 4. t. 351.

Lilium sylvestre Tod. pempt. 201.

Lilium, floribus reflexis, montanum Bauh. Pin. 77.

β Lilium, floribus reflexis, alatum hispidum Bauh. Pin. 78.

Habitatio Hungaria, Helvetia; Lipsia

Caulis lavis trif. pedalis. Folia plurima ad <sup>sin</sup> singulum verticillum  
utrinque attenuata, superne linear lanceolata parva.

9 canadense *Lilium lotus verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis - campanu-  
latis* Lea S.V. p. 324. Mart. 364 \*

*Lilium matayan canadense maculatum* Monf. hist. 2. p. 408. f. 4. t. 20. fig. 9

*Lilium angustifolium, flore flavo maculis nigris distincto* Tournef. Inst.  
371. Mart. var. 770. t. 125.

*Lilium s. matayan canadense, floribus magnis flavis non reflexis* Cat. Fl.  
Carol. p. 11. t. 11.

Habitat in Canada hab. Richard

Folia tri-linearata. Corolla basi flavo, punctis atris

Caulis crassus, pennis cyneis lani. Folia verticillata, sena, bipollis-  
na, lanceolata. Flores ternales, terni. Petala recta, lanceolata

10 Camſchatcenſe Ciliuin foliis verticillatis, flore exoto, corolla campanulata, petalis  
ſeſſilibus lin. Am. acad. 2. p. 340 & L. V. pag. 324. Ed. 1. p. 320

Habitat in Camſchatca 7

Caulis teres, lœvis, pedalis. Folia lanceolata ſeſſilia, quatuor vel ſex, tria  
parum obtuſa, lœvia; ſuprema folia duo vel tria, ſæpius alterna an  
guſtiora. Flores terminales pedunculati: pedunculis brevifimis nudis  
exſtriſculis. Corolla campanulata. Petala ovata obtuſa, lœvia  
ſinata purpureſcentia. Stylus nullus. Stigmata tria oblonga  
recurva longitudine germinis

non vid.

" *Philadelphicum leucum* foliis serratis, floribus erectis, corolla campanulata, petalis  
unguiculatis Lin. Spei: pl. p. 434 \* L.V. p. 324. Cat. bot. carol. 2. p. 50. t. 50.  
β. *Lilium* foliis serratis brevibus; corollis campanulatis, unguibus peto-  
lorum angustioribus, floribus erectis Mill. Dict. t. 165. fig. 1.  
Habitat in Canada 4  
Similis est *Lilium camthaticensi*, sed ejus petala ovata, sessilia, hujus li-  
quibus longis distinctis. Lin. l. c.

non vidi