

Limodorum

1. tuberosum L. floribus subspicatis barbatis
2. album L. floribus imberbibus, spicis subpaniculatis
3. striulatum L. foliis radicalibus geminis vaginatis, vagina radicali inflata;
scapo vaginato, floribus sessilibus
4. ensatum L. papaverati L. corollis imberbibus racemosis foliis ensiformibus
complicatis
5. striatum L. floribus imberbibus racemosis, foliis ensiformibus striatis
pediculis lanceolatis: labiis oblongis, plano
6. Tanquerellii L. floribus racemosis imberbibus, foliis lanceolato-ellipticis
7. gentianoidei L. ? radice tuberosa, ophoglossum, caule vaginato, floribus
paniculatis

Cathifolium Limodorum

Habitat in A. Domingo herb. Thonini

Caulis crassitie pennis anferis, vaginatus, striatus, foliosus. Folia pollucis
duos et ultra lata, lanceolata-elliptica, 11nervia, subreticulata. Naxami axilla
res. Pedunculus compressus

moniliforme & caule tereti articulato striato moniliformi nudo simplicissimo,
foliis linearibus acutis Len. I. V. p. 219
Eu. Non Kempf. Am. 1764. Tab. 264.
Habitat in Japonia nubiis et arboribus parvifloris.

Limonium speciosum

caudatius E. caule ancapiti, foliis lanceolatis pedunculis ut illam
uniflori floribus calicem congesto

Habitat in Insula Bourbonia

Radix fibrosa. Caulis ascendens spithameus basi aphyllus vaginatus
vagina utroque canaliculata compressi striati nervosi unguiculatis
foliis simplicibus tripollicariis attenuatis basi acuta. Pedunculi
axillares solitarii bipollicares erecti. Petala 5 que lanceolata
cornu fissiformi pedunculo longior

Limodori spec

Tuberifera Lim. floribus subspicatis barbatis Hort. kew 3. p. 301.

Limodorum Tuberifera floribus sessilibus racemosis alternis h. S. V.
p. 816.

Habitat in America septentrionali 2

Scapi subsimpliibus floribus subsessilibus L. Herbar. p. 20. no 2

~~Specimina h. S. V. h. S. V. et h. S. V. determinata~~
~~forte h. S. V. idem~~
men vid.

Diurnum L.

Lindorum diurnum Jacq. coll. 4. p. 107

Habitat ad canalicum parafitica arborem

Totum glabrum. Folia duo vel tria ex singulis bulbis sublinearia
obtusis, concava, forma uncinaria sesquipedalia uncinam lata
leniter margine revoluta. Pappus teres erectus, flexuosus, spatula
filanosa vaginante brevi vestitus, bipedalis, baculis punctis utroque
eius adspersus exasperatus. Racemi alterni, quinqueflori. bractea
saepe nulla. Petala foveola viridia nectarium album staminibus
punctis. Jacq.

non vid.

triste bulbis indivisis, galea unicalcarata, Callo integro Lin. Suppl. p. 402.
L.V. pag. 811.

triste Lem. foliis coriiformibus erectis, caps. ramoso floribus
remosis Thun. prodr. pag. 40. non vidi

Giganteum l. bulbis rotundis, caule nudo, labello fagittato Lin. Suppl. pag. 402.
L.V. pag. 811.

Giganteum Ling. foliis ensiformibus recurvis, floribus speciatim
remotis Thunb. prodr. pag. 4.

non id.

capensis Ser. foliis conduplicato ensiformibus: caule superne nudiusculo
vaginae spathaceis Mant. 293. + L. V. p. 216

Habitat in P. bono p. 4

Caulis pedalis, simplicissimus lavis. Folia radicalia ensiformia
complicata, lavis, digitalia acuta. Caulena remota vagrantia
vix foliosa, oblonga, acuta, pollicaria. Racemus terminalis
simplicissimus, secundus. Ombus 11. f. 12. pedunculis propriis
bracteis lanceolatis membranaceis, flore brevioribus. Petala
5 lanceolata, lavis, erecta. Nectarii labium trifidum L.

capensis Lem. foliis ensiformibus foliatis, spica ovata
scapo flexuoso. Thunb. prod. 1. pag. 4
non vid.

altum sem floribus imberbibus, spicis subpaniculatis Hort. kew. 3. p. 361.

Helleborine radice anandracea, foliis amplis semis lyratis Plum. spec. 4
T. 109.

Helleborine americana, radice tuberosa, foliis longis angustis, caule nudo,
floribus ex rubro pallide purpureis Mart. Cent. 50. tab. 50
Mull. Dict. t. 495.

Lemodorum altum floribus pedunculatis Jacq. Lin. S. V. pag. 816.
Habitat in India occidentali 2

Lemodorum altum si quis paniculatis, floribus pedunculatis L. Herbar
no 7

non vid.

hians l. corolla galea calicemata hians, nectario ovato, foliis linearibus radicali-
bus den. Suppl. pag. 401. S. V. p. 812.

hians Comodon foliis linearibus erectis Thurb flomibus cernui
Thurb prod r. pag. 3.

non id.

Felicornis O corolla nectario bifido, cornu capillaria Len. Suppl. pag. 4
400. s. V. pag. III.

Habitat in Cap. bonoppei

Caulis semipedalis, subflexuosus. Folia radicalia plurima, linearia
acuta, breviter. Caulis lanceolatus, acuminatus. Spica & floribus
d. remotis. Germenibus bracteae vestiti. Petalum supremum pedi-
cellatum, fornicatum ovali oblongum, lat. lateralia sessilia
opposita. Nectarium intra florem arcuatum, tuberculatum subul-
tatum: labium superum et inferum bifidum. Cornu dependens
longitudine petalorum

~~optus polens in Suppl. eadem planta~~

Limos ortum *Felicorne* Thunb. prodr. pag. 3

non vidi

Anacardium Lem foliis radicalibus geminis vaginae, vagina radicali inflata;
scapo vaginato, floribus sessilibus. Sw. prod. p. 119
Habitat in Jamaica, Domingo &
Radix tuberosa.

non rudi

grandiflorum L. radice tuberosa, foliis subquaternis, floribus termi-
nalibus subternis amplissimis Aubl. fl. Guian. p. 810. Tab

321.

Habitat in Guiana.

non vid.

ovato-lanceolatus
Tankervillea Lim floribus racemosis imberbibus Hort. Kew. 3. p. 302. Tab. 12. +

Habitat in China &

^{capis} Caulis sesquipedalis crassitie digiti superne sepe minus tubulosis
oblique truncatis. Folcia ovato lanceolata nervosa. Flores
nubantes

Limodorum Tankervillea fapsi radicalibus terminalibus que sim
plicibus, floribus pedunculatis. L'Herbier pag 20. no 1

pendulum

L. radice fibrosa, caulis simplicibus longissimis,
foliis amplexicaulis, floribus axillaribus solitariis Aubl.
fl. guian. pag. 119. v. 322.

Habitat in Guiana

non vidi

Ruscus L. radice fibrosa, foliis ensiformibus spicae florum. semi p
plic: spirali, nectario sessili Wals. fl. car. p. 228.
Habitat in Carolina.

autumnale L. caule foliis bracteisque pubescentibus; spicae florum
seriæ duplici spirali Walt. fl. Car. p. 221.

Habitat in Carolina

non vidi

gentianoides Lem. ? radice tuberoso aphyllum, caule vaginato, floribus pedunculatis

Lat. in prodr. p. 119.

Habitat in Jamaica 4

Radix tuberosa