

Limonia

1. grandis L. inermis ramis superne angulatis, foliis pennatis, paniculis axillari-
bus.
2. sermentosa L. spinis solitaneis, foliis ellipticis emarginatis, racemis terminalibus
3. sessiliflora L. foliis spinis axillaribus floribusque axillaribus solitaneis foliis simplicibus.
4. biloba L. inermis, foliis simplicibus oblongis ellipticis emarginato subbilobis,
paniculis axillaribus aggregatis
5. monophylla L. spinis solitaneis, floribus axillaribus aggregatis, foliis simplicibus
6. trifoliata L. spinis geminis, foliis ternatis, petiolis aequalibus
7. paniculata L. inermis, foliis ternatis, petiolis alatis
8. acutissima L. spinis solitaneis, foliis pennatis, petiolis articulatis alatis

Herm.

Paraghet herb. an Limonia
a flor. hami teretes glabri. Edulis pilulata, bipollucaria, oblonga pumumata, obtusa
cum mucrone, integerrima, glabra, sulcus punctata, spina unguiculata, axillaris
patens. Paniculi axillares plures. Stamina 6.
Limonii baccata Jedd. B. nym
a la

minuta Limonia

Forster

Habitat herb. Mus.

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, alterna, ovata vel subcordata, attenuata, altero latere angustiora et basi obliqua, integerrima, membranacea, glabra, simpliciter subvenosa. Panicula terminalis, dichotome ramosa.

malicolenfis heronca

Doster

Habitat herb Mus. 7

Rami alterni. Folia petiolata, alterna, simplicia vel bipuga vel pollicaria, cili-
nosa majora, terminale majus, ovata, venosa, glabra, integerrima, extrorsum obtu-
re crenata. Pedunculi terminales, terni?

Limonia

Habitat in Monomotapa Commerc. herb. 4us. p. 3

Inermis. Rami glabri, superne angulato-compressi. Folia petiolata, alterna, pennata
cum impari, bipinna: foliola petiolata, alterna, glabra, venosa, punctata, lan-
cedato-elliptica, obtusa, integerrima, 4-5 pollicaria, interiora minoria. Petioli
compressi. Racemi axillares, compositi. Peduncululi et calyces ferrugineo subbrillo-
si foliorum habeo

pentaphylla L. inermis foliis subqueratis Retz. obj. fasc. 5. p 24
Habita in India orientali

mibi haud nota nisi eadem est cum Lem-grandis

5 monophylla Limonia foliis simplicibus, pinnis solitariis ^{floribus axillaribus aggregatis} in Mant. 237* S. V. pag. 402.
Limonia papillae zeylanicae sylvestris Burm. zeyl. 143. t. 65. fig. 1.

~~Glaberissima~~

Habitat in India orientali

glaberrima. Rami superne angulato compressi ut in Citro. Folia ^{ternifera} petiolo
sa alterna remota, elliptica, bipollicaria, firma, venis reticu-
lata, integerrima, late viridia, emarginata. Spina axillaris
solitaria, horizontalis pollicari superne minor. Peduncululi axilla-
res aggregati capillares longitudo petioli semunquicularia.

3

*Asplenium
parvifolium*

Limoria foliis simplicibus oblongis, ^{floribusque} spinis axillaribus ~~flor~~ solitariis

Habitat in India orientali

Rami dichotomi ^{divaricati} teretes superne angulato compressi pubescentes. Folium
brevissime petiolata alterna, pollicaria oblonga, venosa, glabra
nervis utraque minute punctata integerrima nervum reflexa, emar-
ginata. Spinae axillares validi ^{superiores} ~~quae~~ flavescentes; unguiculares
~~Pedunculati axillares brevissimi uniflori~~ ~~Stem~~ axillares solitarii
vix pedunculati parvi

pepella Lemonia

gesta. de semin. et fruct. cent. 4. tab. 5. p. fig. 4

mhi. ignota ignota quoque folia et aliqua planta

2 Jamento fa Lemnea frutis simpliciter solitatis, foliis ellipticis emarginatis, ^{racemus terminalibus} floribus ^{racemosis}
Habitat ad latera montium et in nemorosis hinc et
inter ^{et} ^{terminatus} ^{ramosis}
Rami flexuosi teretes glabri. Ramuli villosi virides. Folia alterna glabra
petiolata, elliptica utrinque rotundata apice emarginata, integerrima
firma, subtus punctata venulosa, bipollicaria quipollicaria patentissima
petiolus pubescens semiunquicularis. Fructus brevis valida solitaria ad
latus ramulorum. Racemus ramulos terminat, tripollicaris Flores
alterni, remoti pedicelli subbreves folioli brevis versus apicem. Calyx
villosus campanulatus 5 flos laciniis ovatis acutis Corolla petalis quinque
lineariibus calycis triplo longioribus. Stamina filamenta 10 longitudine petalo
rum primum agglutinata in tubum deinde a se invicem distantes.
Stylus longitudine filamentorum stigma caputatum

in herbario desiccata

Trifoliata *Limonia* foliis ternatis fructu geminis ^{petiolis integris} *Lin: Mant 237** S. V. p. 402.

Limonia fructu axillaribus geminis, foliis ternatis ovatis impari majore,
fructu solitario *Burm. Ind. p. 103. t. 35. fig. 1.*

Habitat in India orientali ζ .

Rami teretes flexuosi glabri. Folia petiolata, alterna, ternata, foliola
oblonga brevissime petiolata, glabra obscura crenata, emarginata,
punctato perforata, unguiculata terminis impari duplo ma-
jor subovata. Spinulis geminis axillaribus recti longi parvi. Pan-
iculi axillares terminalesque saepe 400. Fructus magnitudine
Pisii, oblongus

3 aedissima Lemonia foliis pennatis, spinis solitariis Lin. Mant. P. V. pag. 402.

Theru-Cattu Narayan Rheed. Mal. 4. p. 31. t. 14.

Anisi folium Rumph. Am b. 2. t. 43.

Spinis foliis pennatis: petiolo marginato articulato, spinis axillaribus solitariis Lin. Fl. Zeyl. 175*

Lemonia spinis axillaribus solitariis rectis foliis pennatis: petioli alatis Brown
Jan. 1802.

Habitat in India;

Rami purpurascens glaberrimi superne alternatim subcompressi.
Folia petiolata ~~par-~~ alterna pennata cum impari bi-³ triplica. Folia
ca. obovata ad ~~ca-~~ opposita ad articulos petioli, brevissime petiolata,
integerrima pollicaria, glaberrima remota. Petiolus bi-³ triarticulatus
articuli superne lateribus. Spinæ axillares solitarii pollicares per
purascentes, recti. Flores laterales racemosi. Pedunculus sesqui
pollicaris; pedicelli horizontales uniflori longitudine fere peduncu-
li glabri basi squama minuta setacea

4 lobata ^{inermis simplicibus} foliis ellipticis apice emarginato bilobis, ^{pedunculis} floribus axillaribus
aggregatis

Habitat in India orientali

Rami teretes cortice cinereo superne pubescentes. Folia alterna brevissime
petiolata, coriacea, reticulato venosa, integerrima, pollicaria
pubes minus, sume punctata. Petiolo apice profunde emarginato
subbiloba lobis obtusis. Petiolus pubescens. Spis loco spinarum super
la minus parva axillari subulata, flexilis. Pedunculi aggregati
axillares siliiformes uniflori, semiunguiculares.

paniculata Lemonia fo inermis foliis ternatis petiolis alatis.

7

Habitat in nemoribus quae Ceylone frequentes ^{superne pubescentes}

:Soliolo fessilia

Rami teretes cortice cinereo. ^{in egypto} Solia alterna, petiolata obovata, glaberrima

minus nigra
quam in reli
quis

Coriophma avenia, obtusa latere minore pollicaria, intermedium

magis fessipollicare. Petiolus pollicaris superne versus sensim latior

Spirae nulla. Flores axillares terminalesque paniculati. Pedunculati
pedicellipetalycies pubescenti subinervi

minuta L. inermis foliis pennatis, racemis corymbose terminalibus
Forst. prodr. p. 33

inchi cyota

1 grandis Limonia inermis, ramis superne angulatis foliis ~~impari~~ pennatis
et paniculis axillaribus.

Habitat in nemorosis ^{superne} Reylond. h. Honig

glaber Rami inferne ^{ramis} teretes ac utae angulati. ^{penicillata} folia petiolata, alterna
remota, pinnata cum impari, foliola alterna brevissime petiolata

triplo elliptica, remota, integerrima glabra quadripolliciana circumferenti
brevi obtusa. Petioli ^{inferna} basi teretes ceterum anicipites. Peduncululi
~~ob paniculis~~ axillares bini terni ^{peduncululi} com angulati tripolliciares, ^{libri} partiales alterni.

Flores parvi minuti mihi hucusq. generis conferti: basi squama ovata ad basin calycis
Calycis quinque dentati dentibus rotundatis petala calycis duplo longiora
oblonga. filamenta 10 longitudine corollae ^{fragra} fere germina oblonga ^{partia} ^{benicillata}

venis

Folia revere pennata nec petioli ramus est ^{foliola} eorum cum ullem
pro his petioli ramis formibus subiectus ne certum quidem adest
sed ob situm foliolorum ramuliformes apparent petioli uti etiam cum
non pennata primo intuitu apparent cum apex petioli ^{obtusus}
huius oblique rotundatus foliola duo quatuor ^{parva} infra alterum
foliola habitus ceteri quamvis non pennata

non limonia

Limonia pentaphylla Herb. fasc. V. pag. 24
in herb. desiderat