

Lipana

1. sphonica L. floribus capitatis, foliis lanceolatis ellipticis nervosis glabris
2. opposita L. pedunculis axillaribus dyphylli subuni flori, foliis lanceolatis glabris
3. umbellata L.
4. graminifolia L. floribus capitatis, foliis lineariibus alternis acutis sessilibus, calycibus villosis
5. villosa L. floribus fasciculatis, foliis ovatis villosis tomentosis
6. sericea L. floribus subspicatis axillaribus solitariis, foliis oblongis villosis
7. imbricata L. floribus sessilibus axillaribus geminis, foliis oblongis villosis sericeis
8. biflora L. pedunculis axillaribus bifloris, foliis oblongis villosis subserratis

Lipar. foliis ovatis nervosis et
venis africanis intersecans, foliis Tartariensis flora purpurea H. de laeudi Tournef
inf. v. h. hab. mus

umbellata L. floribus umbellatis, foliis lanceolatis lobis glabris lin.
Mant pag. 269. S.V. pag. 665

Rubn. 414 fig. 1.

Borbonia longata foliis lanceolatis nervibus glabris, involucri
calycibusque hirsutis Lin. Mant. p. 100 +

Habitat ad Cap: 6. p. 5

Rami ^{de holomo} cicatriciati glab. lineis tribus a basi folii ad proximum deier
rentibus inferne glabri superne hirsuti. Folia sessilia copiosa
approximata polliciana, subovata, supra obtuse nervosa
acuta. Pedunculi terminales hirsuti. foliolum ovatum coria
rum rigidum hirsutum pedunculum inferne obvolvens aequi
parum longior flavescens. ^{capitata mucronata} Calyx hirsutus pubescentis lacinis
quadringue quatuor ovatis acutis, inferior parum longior. Corolla glabra
legumen hirsutum.

variat tota glabra, leguminibus est ceptis

pedunculi termi
nales ex axillis
summis et termi
nales quadringue

umbellata Cyana, floribus umbellatis, foliis lanceolatis lobatis Lin. l. V. pag.

pag. 665
+ Borbonia longata foliis lanceolatis enerviis glabris, involucri calycibus
que hibis Lin. l. V. pag. 643.

- (Cum specie haec duo non differant, delenda erit in Borbonia. F. X. V. d. d.
tota glabra, leguminibus exceptis)

+ genista aethiopica rufifolia minoribus foliis Pluch. Amalth. p. 104. tab. 414.
fig. 1.

[Faint, mostly illegible handwritten notes at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

angustifolia. Folia linear-lanceolata glabra, Capitula terminalibus
oblongis subtriphyllis.

Habitat in India orientali Kony.

Caulis herbaceus, erectus, tetragonus, pilis adpressis brevibus
adpressis ramosis. Rami oppositi simplicissimi caule
altiores fere filiformes, diphylli ~~non~~

Folia sessilia, angusta, attenuata, longi pollicaria, ad Costam
pilis minutis adpressis densa, pallide viridia, integerrima

Pedunculi ramosi terminans elongati

Capitula unguiculata tercia obtusa, Folia plerumque
trina ad basin paguli capituli, raris sine gemma
structura foliorum caulis, capitulo longiora ~~et~~ ^{et} ~~creata~~

^{pilis raris} Calycis foliola ovata concava, mucronata canna subpubescente
Petala 5. lanceolata concava extus pubescentia, subaequalia
filamenta basi mediante membrana connata
Germen oblongum glabrum. Stylus unicus stigma simplex

Hesperia leporia

Habitat in Cap. b. p. herb. Boissm.

Tota villosa, hispida. Rami aggregati. Folia frequentissima, sessilia, patentia, supra
prima sericea, semipollicaria, oblonga, acuta. Flores terminalis et in supre-
mis axillis conferti.

Myrt. folia lepana folus ovati, conaceis, pedunculis unifloris

Habitata in Cap. b. p. i. herb. Royani 7

Emiter rigidus, glaber. Ramis fraxi, subangulati. Folia subpetiolata, pollicaria, fusca
minoris, distantia, arenia, enervia, conacca, rigida, submucronata, subhinc-ovata

Calyx glaber: dentes ovati

affinis Crat. capent. folus rhombes subrotundis

genit. folia *Leparia* foliis linearibus acutis, pedunculis axillaribus unifloris ophyllis

Habitat in Cap. b. spec. herb. Royenii &

Tortriculus totus glaber. Stami teretes. Tolea frequentissima, sessilia, semipollicaria, angu-
sta, basi subpurpurascens, apice subnervosa, margine dorsoque parum recur-
vata. Pedunculi rari, solitarii, folio breviores. Calyx bilabatus: lacina lacina
lata, intermedia labii inferioris angustissima
affinis ^{et} opposita

eadem forte ac *fulvina*

parviflora Lpana folus lanceolatis, pedunculis axillaribus unifloris duphyllis racemosis, calycibus unguibus petalorum brevioribus

Habitat in Cap. b. per herb Royen. t.

Trunculus totus glaber. Rami in formam racemi, crassi collecti Rami Vertes.

Folia seminaujucularia, lanceolata, acuta, basi versus angustata, crassiuscula, enervia, laevia. Pedunculi superne, copiosi, approximati, inferiores folio breviori, superiores longiores, superne folia duo linearia lanceolata, corolla parum brevior. Flores pallide flavi, nutantes. Calycis dentes curvati, superiores duo parum breviores.

affinis Cr. opposita, diversis floribus Triplo minoribus, copiosissimis, in formam racemi compacti collectis

racemosa. Lepadia foliis linearibus - lanceolatis, floribus racemosis, calycibus vil-
losis

Habitat in Cap. b. spec. herb. Royani;

Rami teretes, sparsi, glabri: ramuli raris altiores. Folia sessilia, vix pollicaria,
basin versus parum angustata, submucronata, avenia, lora, crassiuscula, se-
quenti racemi subsequente flori, primum terminales, demum ramulo ulterio-
ri excrecente laterales, folio longiores. Pedicelli, uti calyx villosus. Bracteae
deciduae. Flores magnitudine Barb. longato. Calyx basi subtruncatus: laciniis
quinque subaequalibus, oblongis, acutis. Stamina diadelphica. Germen hirsutum
Vexillum emarginatum

Salicina Lepana

Habitat in Cap. b. spec. herb. Nuyeni

Tota glabra, exsiccatione more generis nigrescit. Rami superne parum angulati. folia frequen-
tia, sessilia, sesquipedalium, lanceolata, basin versus basin angustata, obscure mucro-
nata, lœvia, ax^{illa}~~illa~~ Pedunculati superne, axillares, solitarii, folio brevior, apy-
li, uniflori. folia bractœformia nulla. Flores mediocres. Calyx bilabatus: La-
bium superius bifidum, longius, laciniis ovatis: inferius setaceum. Bractœ
minutæ, setaceæ, versus apicem pedunculorum

geminata *Leparia* foliis lineari-lanceolatis, pedunculis axillaribus geminis apy-
li

Habitat in Cap. b. p. herb. Royani 5

Tota glabra. Rami teretes. Folia sesquialtera, vix pollicata, acutiuscula. Pedunculi
longitudine fere folii, pauciter. Calyci lacini lanceolata. Folia duo breviora, bractea
formis in axillis florum, pedunculo brevioribus. Calyx bilabatus: labrum superius
2 fidem: laciniis ovatis; inferius trifidum, laciniis lateralibus ovatis, superioribus
oqualibus, intermedio fetacea
affinis *Prot. opposita*

cum bellatis. ^L floribus umbellatis; foliis lanceolatis glabris

Borbonia longata foliis lanceolatis nervibus glabris
involucris calycibusq; hirs. Lin. Mant. pag. 100

Habitat in Cap. b. p. 5

Ramiteretes glabris ^{ca}ca foliis ovatis dentatis
foliis sessilibus alternis lanceolata acuta crispis
nervis arenis. Pedunculis superne villosis ~~et~~ laciniis
calycis ovatis. bracteis pedunculum involventibus
varietas bracteis calycibusque glabris

Lin. descr. bona *Borbonia* semipollitana, intermedium nervi 2 ob
scuri propter costalis. Pedunculi saepe squa, semipollitana. ^{forma}
topi hinc folia spectata
geneta *buxifolia* Burm. vel *myrtifolia* fl. copiosi prodr

1 *Sphenoclea* L. floribus capitatis, foliis lanceolatis nervosis glabris ten. Mart
260. f. V. p. 665.

genita africana nisi foliis longioribus, floribus luteis in globum
congestis Ray. dandr. 107.

Habitat in Cap. b. p. 1

Caulis robustus ^{que spinosus} ~~que spinosus~~
Rami teretes, uti tota planta, glabri. Folia sessilia alterna
erecta la mucronata rigidissima sesquipolliciana, lato-
lanceolata nervosa venosa, pungentia. Capitulum
verminale sessile, magnitudine calycis Cynara, foliis
tamquam calycis longitudine corollularum cinctum

gramini folia L. floribus caputatis, foliis linearibus alternis acutis hispidebus;
Calycibus villosis Lin. Mant. 268. t. V. pag. 665

Geneta africana foliis peristri Raj. de Ind. 105

Habitat in Cap. b. p. i. arenosis T

Caule determinate ramosis. Rami & caena costa foliorum decurrente
angulati teretibus adpersi pilis raris longis. Folia plana
acuminata copiosa bipolliciana, univerria avenia glaberrima
Stipula minuta gemina pubulata. Capitulum terminale &
rariore compositum. Calyx pilis longis hispitis. Corolla lan-
ceolata. Corolla glabra.

23 opposita L. floribus solitariis, foliis floralibus oppositis Lin. Mant.

269.

Genista foliis genista Andronia majoribus Herm. afr. 11.
spatium capense ramis lateralibus alternis, foliis alternis
lanceolatis Lin. Am. acad. 6. p. 91. n. 207

Cytisus capensis. foliis parvis linear-lanceolatis ramis tertri-
bus, pedunculis axillaribus bifoliis subumbellatis
Berg. Cap. p. 217. *

Habitat ad Cap. b. p. 175

Rami teretes, glabri, uti tota planta. Folia linear-lanceolata
bipolliciana ^{utrinque} acuta integerrime praesa sephla avenia
enervia. Pedunculi solitarii in axillis foliorum supe-
riorum foliis longioribus, filiformes versus apicem folii
gemini corolla longioribus. Caecum calycis lanceolato
angue calycis parum, longioris

opposita L. pedunculis axillaribus diphyllis subumbellatis, foliis
lanceolatis glabris

Forſan quod duo ſpecimina ex Tabulis in Herbario ſub nomine Crota-
lana Inſeſa huius potius ſpectant
Carni ~~Est~~ ^{mu} Syst. Ed. murri: non enim invenitur difficile adhas

U. villosa L. *Floribus fasciculatis, foliis ovatis villosis. Tomentoso* Sen. *Muscl.*
269
Quercus africana tomentosa, foliis cochleariformi, flore luteo Seb.
Thes: 1. p. 38. t. 34. fig. 1.

+ *Bobonia tomentosa*
B. - quercus africana arborescens, foliis argenteo lanugine vestitis Seb. *Thes.*
1. p. 38. t. 24. fig. 2.

V. Lotus fruticosus L. *S. M. D. 10. p. 1179*

+ *Bobonia tomentosa foliis obovatis villosis* L. *Spec. pl. pag. 994. 7*

Habitat ad Cap. b. Spei. *truncati, crassitie penna anserina*
Rami teretes, tomentosi ramulorum: ramuli subverticillati. folia
lespicae corymbosa, polliciana ramosi et ramulosi. Legentia, oblonga
cinerea. Flores ad apicem arborum lespicae foliis obovatis
laevibus calycis lanceolatis. Corolla purpurea glabra
Legumen sesquipollicare tomentosum lanceolatum

* *Fenicea* L. floribus subspicuatis, foliis ovatis villosis tomentosis Lin Mart.

pag. 269

Habitat ad Cap. b. spei 5

Erigitur ramis sparsis interdum subdistichatis. rami nodosi tuberculati
e cap. foliorum. Folia sesplices oblonga, mucronata semper
Eulan, villosa tomentosa, sericea imbricata copiosa. flores vesperis
incomum axillares solitarii sesplices. Calyx feniceus.

floribus subspicuatis axillaribus solitariis foliis oblongis villosis feniceis

an mea eadem cum hanc an hanc. Bot. imbricata diversa
an a rotalana imbricata e hunc haffus
gen.

6 imbricata. L. floribus sessilibus lateralibus axillaribus geminis, foliis oblon-
gii villosis sericeis

Habitat in Cap. 6 spec. 5

Rami villosi sericei, tuberculati. Folia sessilia utrinque argen-
teo muricata, copiosa subimbricantia. ~~Rami vix~~ Flores unguis ulanae
flores in axillis summis in formam speciei.

Botanica axillaris La Martini in foliis herb. h. M.

an a Senecio diversa?

7 biflora L. Pedunculis axillaribus bifloris, foliis oblongis villosis pubescentibus

Habitat in Cap. b. prout

rami teretes inani basi folia sessilia alterna distantia
acuta, seminequaliter, pilis brevibus decisa quam ante
cedentes. Pedunculi ex axillis interdum et supremis in for-
mam vixemini plerumque gemini, calyx villosus tomentosus
laciniis ovatis obtusis inferior parum major. Corolla glabra
flava. Legumen sesquipedale canaliculatum villosa pubescentibus