

Lippia

1. americana L. <sup>lanceolato ovatis</sup> capitulis pyramidatis, foliis scabris
2. hemisphaerica L. capitulis hemisphaericis, bracteis acuminatis subpungentibus, foliis lanceolato-ovatis cauleque glabris
3. hispida L. hispida, foliis oblongis rugosis serratis subtus tomentosis, paniculis axillaribus, capitulis ovatis
4. cymosa L. foliis cymosis, foliis ovatis subserratis

ovata Ennis vel Selago

umbellata *Leppia* caule fistulos tetragono, foliis ovatis serratis  
nigrescentibus, floribus umbellatis Caran. *Fig. 2. p. 75. Tab. 194*

Habitat in Mexico

Caulis 4 pedalis. Rami oppositi tetragoni villosi. Folia subtus  
albicantra subtomentosa. Petioli connati vix pollicares.  
Pedunculi axillares. radii 5que. Bractea externa cordata  
flore <sup>bractea</sup> longioribus. Cal. 1 phyllis globosis tomentosus semibi.  
fidus Corolla lutea limbo quadruplo lacinus rotunda  
tis revolutis. Stigma globosum tomentosum. Capsula glabra  
2 loculari loculis monosperma Caran

non radi

americana L. capituli pyramidatis Kun. Spec. pl. p. 003. 7

Habitat in vera cruce &

Indet, caulibus teretibus, pallidis ad gemicula compressis. Folia  
lanceolato-ovata, extra medium serrata, petiolata, scabra,  
opposita. Pedunculi axillares, oppositi, brevissimi, capitati. Capitu-  
la retrosum imbricata squamis innumeris, tetragonis, ovatis, mag-  
nitudine pisi, flosculo inter singulam squamam lin.

Rami tetragoni, inani oppositi. Folia petiolata, elliptico-lanceolata, in  
segorima, apice attenuata, serrata, supra nitidiuscula, ovulo armato puni-  
tis minutis piliferis, subtus villosi, basi adnata. Pedunculi axillares  
foliis multo breviores, inani, utrinque 4. 5. hab. Fus.

foliis scabris

*Cymosa* Lep. floribus cymosis, foliis ovatis subintegris. Sw. prodr. pag. 93.

Spiceo congener *Spinosa*, foliis subrotundo acuminato integro Sloan hist.

2. 30. 1. 174. fig. 3. 4.

Habitat in Jamaica

Rami infernae teretes superiores tetragoni leviter pubescentes. Folia breviter petiolata utrinque acuta unguiculata subtus pallidiora juniora subpubescentia. Cymae terminales fastigiatae pubescentes lacinae calycis pro petalae.

Hemiphonica L. capitulis hemisphaericis L. V. p. Paey. hist. 176. t. 179. fig. 100

Habitat in America meridionali

Frutex decempedalis aromaticus ramis. Ramis vertes, reclinati.  
juniores quadrangulares floriferi. folia lanceolata acuta inte-  
gra interdum incisura una vel altera superne, glabra, b. f. tripolli-  
cana. Pedunculi axillares solitarii oppositi, longitudine petiolo-  
rum, flores in capitulo hemisphaerico squamo imbricato rhom-  
boides acuta cordata acuminata integra unica <sup>sub</sup> fo ad sin-  
gulum florem flores exigui brevissima pedicellato. Corolla alba. Paey.

Stellantis bracteis acuminatis subpungentibus foliis ovato lanceo-  
latis <sup>late calycibus</sup> ~~foliis lanceolatis~~ <sup>glabris</sup>

*Hirsuta* L. *Hirsuta*, foliis oblongis rugosis serratis subtus tomentosis paniculis axillaribus, capitulis ovatis Linn. Suppl. p. 288. & N. V. p. 74.

Habitat in America

Caulis tetragonus hirsutis canus. Folia opposita, petiolata supra pilosa, subtus tomentosa cana. Pedunculi axillares plures elongati in paniculam ramificantes. Pedicelli terminantes in capitula ovata, bracteis binis suffulta. Flores minuti albi.

Lin

*L. myrtifolia* Benth