

# Lobelia

## \* foliis integerrimis

1. piniifolia L. fruticosas, foliis lineariibus confertis
2. Dortmanni L. foliis lineariibus bilobulatis obtusis, caule subroso
3. tupa L. foliis lanceolatis, racemo spicato
4. Kalmii. caule erecto, foliis lanceolatis lineariibus obtusiusculis alternis,  
racemo terminali
5. paniculata L. foliis lineariibus, panicula dichotoma
6. <sup>panicosa</sup> ~~lineari~~ tinifolia L. foliis lineariibus glabris, pedunculis lateralibus
7. grandis L. foliis oblongis glabris, corymbis bracteatis, corollis hispidis
8. <sup>depressa</sup> ~~depressa~~ <sup>et corymbosa</sup> cornuta L. foliis ovatis petiolatis, staminibus longissimis

## \*\* caule erecto, foliis unispi

9. Columnae L. foliis oblongis obtusis crenatis glaberrimis subtus tomentoso-albis,  
caule corollis pulvisculentis
10. ciliata L. foliis ellipticis denticulatis acutis apice revolutis, staminibus va  
riatis  
cymosis, caule fruticoso.
11. ~~conspicua~~ ~~L.~~ foliis lineariibus dentatis, spica terminali foliosa
11. bellidifolia L. caule paniculato, foliis obovatis crenatis

ulti

pmu

aque

stine

lis

atata,

can

atis

- Jussiaea*  
 12. *lanceolata* L. foliis ellipticis serratis y labris, capsulis globosis, calycibus subrotundis  
 13. *cardinalis* L. foliis lato-lanceolatis denticulatis, racemo terminali secundo  
 14. *siphilitica* L. foliis ovato-lanceolatis subternatis, calycem fructibus reflecti  
 15. *secunda* L. glabra, foliis infimis oblongis dentatis superioribus lanceolatis integerrimis, pedunculis racemosis secundis  
 16. *patula* L. herbacea, diffusa, variegata, glabra, foliis ovatis dentatis, pedunculis lateralibus  
 17. *aspergens* foliis lanceolatis serratis inferne dentatis, racemi compositi terminali  
 18. *acuminata* L. caule pubescenti, foliis lanceolatis attenuatis serratis, racemo terminali multifloro  
 19. *ferruginea* L. caule villosi, foliis lanceolatis serratis acutis ana stomophori  
 20. *longiflora* L. foliis lanceolatis dentatis subsinuatis, pedunculis brevissimis lateralibus, tubo corollae filiformi longissima  
 21. *cliffortiana* L. foliis ovato-cordatis petiolatis obtuse, inaequaliter dentatis, floribus corymbosis racemosis  
 22. *inflata* L. foliis ellipticis obtusis crenatis sessilibus, floribus racemosis, capsulis inflatis  
 23. *urens* L. foliis denticulatis inferioribus ellipticis, superioribus lanceolatis, floribus racemosis

M  
 2  
 2



patula  
crenata

23. rigida L. foliis setaceis subdenticulatis, caule ramoso rigido, pedunculis multi-  
floris divaricatis.

24. ~~plena~~ <sup>velut</sup> L. caule erecto, foliis linearibus subintegerrimis pedunculis solitariis

25. tomentosa L. foliis linearibus dentatis hirtis, pedunculis terminalibus longissimis

<sup>subuni-  
floris</sup>  
26. coronopifolia L. foliis linearibus dentato-pinnatifidis glabris margine carinaque  
subtrilobatis, pedunculis longissimis unifloris

27. triquetra L. foliis linearibus dentatis, racemo terminali

28. minuta L. foliis radicalibus obovatis, scopis capillaribus ebracteatis

17-18. fruticosa L. caule fruticoso, foliis inferioribus ovato-lanceolatis glabris, margine dentibus  
lato-cuneatis, <sup>caule prostrato foliis inversis</sup>  
racemo terminali <sup>spicato</sup>

29. laurentia L. foliis lanceolatis ovalibus crenatis, caule ramoso, pedunculis

<sup>solitariis unifloris</sup>  
30. ennus L. caule patulo, foliis radicalibus ovalibus: caulinis lanceolatis subdentatis,  
pedunculis longissimis

31. ennodes L. caulis filiformibus, foliis petiolatis oblongis dentatis, floribus can-  
panulatis

32. anceps L. foliis inferioribus spatulatis angulato-dentatis, caulinis lanceolatis  
recurvatis, fructibus lateralibus filicostis angulatis

33. ~~Depressa L. Depressa, foliis lanceolatis, caule carnos.~~  
 33. lutea L. foliis linearilanceolatis serratis glabris, floribus sessilibus subsessilibus  
 34. thermalis L. caule procumbente hispido, foliis lanceolatis dentato serratis sessilibus pedunculis axillaribus calycibusque hispida  
 35. hespita L. fruticosa hespita, foliis ovatis dentatis pedunculis lateralibus longis  
 fimo bi. trifloris  
 36. alata L. foliis lanceolatis sessilibus crenatis glabris, caule alato.  
 37. zeylanica L. foliis ovatis petiolatis acutis serratis; inferioribus obtusis crenatis, pedunculis unifloris, calycibus subulosis  
 38. humifusa L. foliis oblongis crenatis, floribus subsymptosis, calycibus glabris  
 39. nummularifolia L. caule repente villosa, foliis petiolatis subrotundis, floribus axillaribus, fructibus inflatis  
 40. cumuloidei L. foliis denticulatis inferioribus subrotundis petiolatis, superioribus oblongis sessilibus, fructibus pyramidatis glabris  
 41. rotundifolia L. foliis serratis subrotundis sessilibus, pedunculis lateralibus capulisque glabris  
 42. lanata L. foliis ovatis crenatis lanatis, floribus lateralibus solitariis



<sup>dentatis</sup>  
Lobelia pilosa, foliis (inferioribus) spatulato-ovatis superioribus lanceola-  
tis, caule decumbente

Habitat in Cap. b. sp. i

Caules herbacei, filiformes, paucis ramosi, inferne angulati, superne teretes  
Folia petiolata, unguiculata, <sup>subtus purpurascens</sup> in pedem acuminata, obtusa, utrinque 3 vel  
quadridentata, dentibus obtusis, superioribus oblonga, <sup>bessilia</sup> suprema linear-lanceo-  
lata integerrima. Pedunculis et axillis supremis, remotis sesquipedicatis, pa-  
tentissimis. Calyx striatus: laciniis subulatis, patentissimis. Corolla  
Lobelia Enni

affinis repente

~~unident.~~  
*Lobelia petersa*, foliis spatulato-ovatis



rotundifolia Lobelia

Habitat in Antillis herb. Tuss.

Caulis teretes, glabrus. Folia petiolata, subrotunda, subovata, integerrima, ex trochiloidi  
dentata, semipollicana, areolaria, subnervosa, glabra. Racemi terminales, sim-  
pliciter: pedicelli medio bracteati binis parvis alternis.

Det. Ryan

*Conglobatus Lobelia*

Rapentium foliis crispis lucidis flere multiplici: corollis conglobata

Habitat in America herb. Gronov. no 799

Caulis crispus pennis asperis. Folia pedalia, basi versus sensim angustata  
remote acute dentata, nitida, extus perim dilatata, venosa, acuta, glaber  
rima. Racemi bipartiti tri-pollicares, villosi: foliola floralia bipolli-  
ciana, linearia. Pedunculi filiformes villosi, superne foliola duo  
linearia, dentata alata, unguiculata.



*begonia folia lobelia*

Habitat in Cap. b. p. n. herb. Rozeni

Folia radicalia, petiolata, semi-pollucaria, oblonga, per petiolum parum decurrentia  
profunde et grosse serrata crenata vel incisa, interdum pinnatifida, lobis dentis  
uno alterove notatis, venosa, pilis raris finis adpressa. Scapus erectus, glaber, sim-  
plex, spithameus. Flores superne racemosi. Calycis laciniis linearibus, villosis

confer cum lob. incisa Thunb.

*filiformis* Lobelia

Habitat in insula francia herb. Guss. Commerson

Caules filiformes, prostrati, glabri, laxi, herbacei, pedales, subramosi. Folia per  
filia, semipollicaria, linearia, integerrima, interdum denticulo uno altero,  
obtusiuscula, glabra, avenia, enervia. Pedunculi axillares, solitarii, capillares,  
folio longioris, uniflori, ebracteati. Calycis laciniis subulata.



Serpens Lobelia

Habitata in insula Barboto

Tota glabra. Caulis herbaceus, decumbens, pedalis, ramosus, rami alterni simpliciter. Folia sessilia, unguiculata, oblonga, basi attenuata, obtusa, ex <sup>trorsum</sup> remote obsolete crenata, arena, enervia, supremis angustioribus, <sup>lopa</sup> cuneatis. Flores racemosi: pedicelli foliorum longiores, uniflori.

*Erysi folia Lobelia*

*Lobelia laciniata* Lamour.

Habitat in America meridionali herb. Gusf.

Caulis erectus, subramosus, glaber, teres; herbaceus. Folia petiolata, distantia, lan-

ceolata, inaequaliter incisopinnata, <sup>partibus</sup> fere ut in *Lycopo italico*, oculo armato villosa.

Racemi superne, breves; Pedunculi <sup>partibus</sup> abactate uniflori. Calycis laciniis subulata,

Corolla purpureo striata



repens lobelia

Habitat in insula Francia Comneson herb. fus. f.

Caules laxi, e membrana decurrente alatis, glaber, repens, ramosis: rami simpliciter. Folia  
petiolata, semipollicaria, ovata, lanera, inaequaliter obtuse dentata, otulo armato adpressa  
nervis brevibus, rarisimis, obtusa, per petiolum decurrentia, suprema lanciolata. Pedunculis  
axillares, solitarii, uniflori, folio brevioris. Calycis lacinae patulae. Capsula glabra  
an varietas Lob. alata

*perfoliata* Lobelia

<sup>in marsh</sup>

Habitat in Guadeloupe herb. Fusf

Caulis herbaceus, erectus, teres, striatus, glaber. Folia petiolata, alterna, 4-5 pollicaria, utrinque attenuata, acute serrata, obtusa, ~~4-5 pollicaria~~, sanosa glabra. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, tri-pollicares, folium versus medium subulatum. Laciniae calycis subulatae. Corolla purpurea: laciniae acuminatae.

a Rojasano habui



*batjanina Lobelia*

Habitat in Madagascari Commes. herb. Guoj.

Caulis herbaceus, decumbens, simplex, glaber. Folia petiolata, semipollicaria, oblonga, setae remote ferrata, simpliciter venosa, basi versus integerrima, obtusa, mucronata. Pedunculi superi, solitarii, uniflori, longitudine foliorum, ebracteati: Flores parvi.

Conglobata Lobelia

Rapuntium folii Cypri lucidis flore mult-pluri coeuneo conglobato. Plum. Ic. Tab. 47.

Habitat in America herb. Guaj.

Caulis herbaceus. Solia petiolata, spithamea et ultra, elliptico-subtriangula, glabra supra nitida, subtus venosa, acuminata, basi attenuata, tenuissime serrata, altero latere saepe integerrima vel tantum serris brevibus paucis. Radices Verminalis. Pedunculus foliis brevior, crassitie penno anfractu, glaber. Radiculi capiosi, conferti, uniflori, potentes, allosi. Bracteae lanceolatae, simulatae pedicello breviores, allosi.



campanulata Lobelia

Habitat herb. la Merska

Pesunculi atillares interdum s. in caule interdum 2-3.

coromandeliana Lobelia

Habitat in Coromandel <sup>Penin</sup> in arenosis graminosis  
in <sup>unquicula</sup> <sup>in</sup> <sup>teger</sup> <sup>mina</sup>

Folia radicalia, oblonga. Caulis digitalis, ramis ad apicem confertis unifloris

Flores picturae coeruleae, odore Viola maritima

a. Koenig, 1769 habuit



cuneata Lobelia

Habitat Am. septentr. herb. Desfont.

Caulis herbaceus, erectus, simplex, sesquipedalis, villosus, angulatus. Folia subtri-  
neata, infima subpetiolata, superiora remota, sessilia lanceolata-oblonga, villo-  
sula, extus obsolete denticulata. Racemus terminalis, elongatus. Flores  
frequentes, coerulei. Bractea, uti calycis lacinae subulata, glabra

*Cynanchodes lobelia*

Habitat in Cap. b. sp. ai herb. Royenii

Glabra, herbacea, volubili. Folia brevissime petiolata, lanceolata, semipollicaria,  
remote obtuseque serrata. Flores axillares, solitarii, pedunculati.

Confer cum *lob. volubili*



*Castanea lobelia*

Habitat in America septentr. herb. Rubeardi

Caulis saepe sesqui quadratus, crispus repulvus

varietas plus ovatis suppetiolatis, subtus pallidis glabris

puberula Lobelia

Habitat in Carolina Herb. Richard

Pubescens. Caulis herbaceus, erectus. Folia inferiora subretroclata, superiora opposita,  
oblonga, cuneata, crenata, remote denticulata, obtusiuscula. Spica terminali,  
simplex. Bracteae lanceolatae, corolla brevior



campanulata. Lobelia

Lobelia campanulata; foliis ovatis, petiolatis, perperna glabris, rugosis  
pubtus tomentosis albis: corollis campanulatis pulverulentis Cavan  
Ann. hist. nat. 2. n. 4. p. 107

andropogon      Lobelia

Lobelia andropogon; caule fruticoso: foliis ovato-acutis, glabris,  
mollibus: floribus axillaribus coriaceis Cavan. in Ann. hist. nat.  
2. n: 4. p. 106  
Habitat in Peru.



gigantea Lobelia

Lobelia gigantea; caule fruticoso: foliis lanceolatis dentatis nervis: pediculis axillaribus solitariis, longissimis Raven. Ann. bot. nat. 2. n. 4. p. 104  
Habitat inter quaranda et monte N. Ant.

~~incarnata Salvia~~

~~Salvia incarnata; foliis ovato-acutis serratis: bracteis floralibus  
brevibus caducis: calycibus parvis quinque-dentatis Cavan. in An.  
hist. nat. 2. n. 4. p. 112.~~

~~Habitat in Hispania nova~~



hita *Lobelia* ~~caerulea~~ ~~frut~~

*Lobelia hita*; caule fruticoso: foliis lanceolatis, denticulatis, hirtis: pedunculis axillaribus, solitariis, floribus longioribus Cavan. in Ann. Lit. nat. 2. 1744. p. 168

~~Succedanea~~ ~~salvia~~ ~~foliis~~ ~~ovatis~~ ~~crenatis~~ ~~negosi~~ ~~obtusis~~ ~~floribus~~ ~~oppositis~~ ~~terminalibus~~  
~~oppositis~~ ~~foliis~~ ~~ovatis~~ ~~crenatis~~ ~~negosi~~ ~~obtusis~~ ~~floribus~~ ~~oppositis~~ ~~terminalibus~~  
grata <sup>laxa</sup> ~~salvia~~ ~~oppositifolia~~: foliis ~~ovatis~~ ~~crenatis~~ ~~negosi~~ ~~obtusis~~ ~~floribus~~ ~~oppositis~~ ~~terminalibus~~




~~oppositis~~ Fl. Penns. 1. pag. 26. tab. 43. fig. a

~~Habitat in arvis et ventosis Tarma~~

~~Caulis grata odora. Caulis pubescens, bipedalis, erectus, ramosus: Ramis~~  
~~trifloris. Foliis petiolatis. Corolla coriacea, exilis pubescens, calyce a quadruplo~~

~~longior~~ Fl. Penns. P. 1.





a cont. magnitudinem  
nat.  
b eadem longitudinalem  
perfecta  
c) filamentum  
d) Pist.  
e) capsula f) transvers.  
g) semen  
*Lobelia longica*

Corrigata Lobelia foliis ellipticis serratis glabris, capsulis grossis globosis, calycibus puberulis, corollis glaberrimis Lin. Suppl. pag. 392 - L.V. pag. 201.  
Lobelia furcamentensis: caule suffruticoso, foliis oblongis glabris serratis, floribus axillaribus pedunculatis Lin. L.V. pag. 201.

Habitat in insula Trinitatis ad Ryan.

Caulis herbaceus, erectus, teres, glaber, simplex.

Stem petiolato, alterna, bi-<sup>tr</sup>ipollicaria, oblongo-ovata, utrinque acuta, tenera, venosa, tenuispine denticulata, glaberrima.

Petioli subciliati, brevis.

Pedunculi axillares, solitarii, bipollicares, uniflori, basi versus bracteis binis, alternis, linearibus, subciliatis.

+ Corolla longitudine pedunculi, <sup>decurvata</sup> glabra, purpurea, <sup>a lineis quinque decur</sup> ~~compressa~~.  
<sup>ventibus angulatis, superne dilatata, basi ad insertionem staminum</sup>

+ Calycis laciniis lanceolatis, attenuatis.

♀ Coarctatus, foveolis quinque, angulis <sup>et</sup> dem elevatis. Cabum superius bifidum lacini inferius trifidum laciniis ovatis attenuatis inter medios angustiore porrectis, lateralibus deflexis. Corolla ante explicata tionem compressa



acuminata Lobelia caule erecto suffruticoso, foliis lanceolatis serrulatis, racemo  
terminali multifloro Sw. prod. pag. 117.

Rapunculus foliis oblongo, <sup>serrato, fere galeato, integro, pallide lutes</sup>  
Stoan. hist. p. m. t. pag. 158. Tab. 95. figum haec bona  
optima serratus enim in foliis desiderantur

Habitat in mont. ferrat. An Ryan.

Caulis superne herbaceus, altus, simplex, glaber, e lineis a basi petiolorum  
decurrentibus subangulatis

Folia alterna, frequentia, breviter petiolata, inferiora frithamosa, suprema  
minora, utrinque attenuata, apice, uti serratus, mucrona flava spen  
te terminata, serrata: serraturis remotis.

Racemus terminalis, semipedalis, erectus, fructus, simplicissimus. Pedun-  
culus communis e pedicellis decurrentibus angulatus. Pedicelli  
pollicares, patentes, uni flori, oculo armato pubescentes. Bractea  
ad basin pedicellorum linearis lanceolata, infima subpollicaris serraturis  
utrinque tribus, superiores sensim minores serraturis geminis suprema  
integerrima: duo aliae versus medium pedicelli lineares parum decur  
rentes, oppositae

Calyx glaber: Laeniis lanceolatis, attenuatis, vix semiunguicularibus.

Corolla pollicaris, pallide lutesca.

Stamina corolla breviora, pallida; anthera apice albido lanata

Forma magnitudinis p[er]i



graminea cobelia caule erecto simplicis spinis, foliis linearibus  
siformibus integris nudis, racemo longo simplicis La  
Mart. Enc. 3. p. 550.  
Habitat in Peru

michi ex parte

1 pinnifolia Cobelia Indica, foliis linearibus confertis integerrimis Len. S. V. p. 000 Beng. Aug. 172.

Rapunculus flore conico galeniculato, rosmarinifolis angustiore Raii Suppl. p. 384

Rapuntium aethiopicum, violaceo galcato folio flore, foliis pinnatis Raii Suppl. 385. Bryn Cent. 173. t. 27.

Rapunculus aethiopicus, violaceo galcato folio flore

Rapunculus fruticosus, foliis verrucosis acutis, floribus in ramulorum summitibus

af. III. t. 41. f. 2.

Habitat ad Cap. bono pait

Indetex ramosis. Rami post capum foliorum squarosis <sup>et pinnatis</sup> superne vis villosis. Folia con-  
ferta, <sup>robusta</sup> glabra, subtus subcarinata, unguicularia. Flores subaequalibus quatuor vel

foliola aequos <sup>in pedicellis</sup> foliis quinque ad apicem ramorum: bractea subulata ad basin pedunculorum. Calyx <sup>inaequalibus</sup> villosus villosus campanu latus laciniis quinque subulatis. Corolla est villosa



2. *Dortmanna lobelia* foliis linearibus bilocularibus integerrimis obtusis, caule subnudo  
Lin. L.V. p. 500. Flor. Dant. 39

*Gladulus stagnalis* Dortmanni Clus. Cur. post. 40. Reichert. 1911. \*

*Gladulus stagnalis* f. *lacustris* Rudb. Elyf. 2. p. 202. fig. 15.

*Dortmanna lacustris*, floribus prope pendulis Rud. Act. Uff. 1720. p. 97. 4. 2.

*Lobelia* foliis bilocularibus subulatis 8l. Capp. 299.

Habitat in campo frigidissimo lacubus, ripis. 4

Folia radicalia glabra, pollicaria aggregata. Scapus semipedalis et ultra  
inferae squama una alterave foliacea. Flores ~~pro~~ <sup>supra</sup> superne in racemo,  
remotissimi penduli. pedicelli filiformes. ~~bract~~ <sup>bract</sup> bractea minuta linearis  
lacinae calycis breves lineares obtusae.

Simplex lob foliis integerrimis linearibus villosis, caule erecto. Thunb. prodr. pag 39

non vid.



5 paniculata lobelia foliis linearibus integerrimis, paucicula dichotoma Lin. S. V. p. 200

Rapuntium foliis linearibus acutis, floribus gemellis, polyanthos Burm. afr. 100.

t. 30. fig. 3. Habitat in Othiopia

Habitat in Othiopia

non vid.

Cerifolia Lobelia. <sup>bus</sup> foliis <sup>foliis</sup> <sup>genus</sup> <sup>quibusdam</sup> linearibus integerrimis glabris, pedunculis ~~linearibus~~ <sup>an</sup> illam

Habitat in Insula Francis <sup>pedalis</sup> Rouin

Caulis filiformis, simplex. folia sessilia anguste linearia, pollicaria remota.  
Pedunculi ex alis supremis capillares in flori foliis breviores. Capsula  
obovata glabra

quando a linearis differt ignoro.



lineatis L. foliis integris <sup>emissis</sup> Cincantibus glabris, caule erecto Humb. prodr. pag.

<sup>224</sup>  
Habitat in Cap. b. spici

non vid

4 Kalmii Lobelia caule erecto, foliis lanceolato-linearibus obtusiusculis alternis integerrimis, racemo terminali L. spec. pl. p. 1310\* S. V. p. 300

Rapuntium canadense humilimum, linariae folio Tournef. F. R. H. 114.

Habitat in Canada Kalm C. Dedit Hutchins

Planta pedalis, caule tereti, rixramoso. Folia inferne lineari-lanceolata, superne linearia integerrima, obtusiuscula, nuda, sessilia. Racemus terminalis latus: Pedunculis alternis unifloris, ex alio supremo ramo folio nudo, foliolo instructis. Flores conici L. sp. L. C.

Folia radicalia unguicularia, obtusa, basi attenuata, caulina remota fere pollicaria



3 *Tupa lobelia floribus lanceolatis integerrimis, racemis spicatis* L. S. V. pag. 300

*Rapentium spicatum, foliis acutis velgo Tupa* Desv. penus. 2. p. 739. t. 29.

Habitat in Peru herb. La Mancha

velosa canescens. E. alia decurrentia, bi pollinaria, oblongo lanceolata  
integerrima, venosa, subtus subnigra. Racemus terminalis. Bracteae lanceolatae,  
pedicellis brevioribus. Flores natantes. Corolla purpurea villosa

~~non vidi~~

32 Depressa *Lobelia depressa*, foliis lanceolatis, caule carnosissimo in Suppl. p. 395 #. S. V. pag. 802.

Habitat ad C. bono hui

Caulis herbaceus, palmatis, depressissimus, varicosus, undique prostratus.

Pedunculi alterni, foliorum longitudine, solitarii. Folia lanceolata minima  
Decurrentia. Flores utriusque purci hui l. c.

non videt



7 grandis lobelia foliis oblongis integerrimis glabris, corymbis bracteatis, corollis hispida  
Len Suppl. p. 394\* L.V. pag 800.

Habitat in America meridionali

Stem maxima, oblonga, glaberrima, integerrima, nisi margine repanda, me-  
tuolata. Flores plures corymbosi, interspersi bracteis rotundatis, hispida. Pedi-  
celli florentes elongati, hispida. Calyx hispidus: laciniis ovatis obtusis.  
Corolla clavaata, hispida & ruginea, ante florentia curva, postea  
recta. Stamina rubicunda hispida. Len L.C.

elongato  
hispida

L. foliis integerrimis ovatis hispida, caule erecto pedunculis elongatis,  
lobelia hispida Thurb. prodr pag 39

hispida Thurb. p. Lin. n. differe videtur mihi non nota



① *Cornuta Lobelia foliis ovatis petiolatis, staminibus longissimis* L. S. V. pag. 899  
Habitat in Cayenna

non vid.

arborea L. foliis petiolatis ovato oblongis serratis, pedunculis axillaribus solita  
ris unifloris Forst. prod pag. 40

non vidi



foetidissimum S. folia suboppositis, floribus patentissimis Lin Mant.  
1794.  
~~Sp. Sideroxylum pauciflorum Trigu. sup. amer.~~

id.  
vado foetidiss. et terrar. inter Humelam  
~~vado~~

10 *Cunhosa* *Lobelia* foliis ellipticis denticulatis acutis apice revolutis, floribus racemosis, caule fruticoso.

Habitat in Domingo.

Rami teretes glabri purpurascens crispis pennis columbeis, foliis alternis petiolata, <sup>polliciana</sup> subcoriacea, minute denticulata, supra glaberrima, infra subtus albida tamen glabra nisi nervis villosis apice revoluta in hamo. Petiolus brevissimus villosus. Racemus terminalis fere lob. cardinalis pedicelli patentes fini, pollicares, villosi, filiformes. Bractea lanceolata ad basin pedicello breviori denticulata. Corolla purpurea infundibuliformis laciniis linearibus subaequalibus. Gathera conplexa apice bractea alba barbata.



9 Columnnea Lobelia foliis oblongis obtusis crenatis glaberrimis subtus tomentoso-albis,  
caule corollis pulverulentis Lin. Suppl. p. 393\* S.V. pag. 880.

Habitat in Nova Granada.

Ramus (an Caulis?) tomentosus: tomento pulverulento albo. Folio ~~periclorato~~  
ovali-oblonga, obtusa, rugosissima, consistencia crassiora, subtus densi-  
tomentosa: tomento albo; supra glabra, splendens. Flores latera-  
les, solitarii, pedunculati. Corolla Columnnea scandenti, extus tomento-  
sa. Tubus incurvus. Limbus quinque fidus: laciniâ infima profun-  
dius separata; supremis minus divisis, nec interne se magis divi-  
dentibus, contra morem reliquarum. Filamenta sub laciniis om-  
nis divisis. Anthera omnia Lobelia

Laeterna  
sans fume uno alterna  
pare opposita

12. Surinamensis Lobelia caule suffruticosa, foliis oblongis glabris serratis, floribus axillaribus pedunculatis. L. Sp. pl. pag. 1320 \* L. V. 001.

Habitat Surinamensis  
glaber teres.  
heterostylis. <sup>elliptica</sup> Cilia alterna, subpetiolata, ovata, acuta, tenuissimè serrata.  
Pedunculi solitarii, vix longitudine foliorum, versus basin bracteis duabus  
lineariibus. Calyx gibbus, torulosus. Laciniis linear lanceolatis. Corolla  
longitudine folii, pentagona, supra basin quinque fariam impressa. + Cappi  
+ nbro. Caesenticoza Lin. Sp. L. c.

Lobelia longata foliis ellipticis serratis glabris, capsulis 9 lobosis, c'alyceibus  
subulatis, Corollis glaberrimis Lin. Suppl. p. 392 \* L. V. 001.

floribus axillaribus

Descriptio inter americana



13 *Cardinalis* Lobl. caulis erecto foliis lato-lanceolatis denticulatis, racemo terminali  
secundo. Lin. S.V. p. 301

*Rapuntium maximum*, coccineo spicato flore Hern. Mex. OT9. t. 300.

*Rapuntium galeatum virginianum*, coccineo flore majori Monph. 2. p. 466. f. 5.  
t. 5. fig. 54.

Habitat in Virginia

Tota glabra caulis erectus, striatus, simplex. Folia sessilia sesquipollitana, paten-  
tisimo, utrinque attenuata. Bractea subulata Pedicelli filiformes  
bracteis brevioribus versus basin squamosus alternis minutis. Calyx glaber  
Cocinis subulatis longitudine tubi corollae.

Clamenta corinata ut in reliquis - Linea utrinque parva decurrens a folii <sup>vel</sup> in petioli inflexione ut in  
onibus

10 ferruginea lobelia caule villosa, foliis lanceolatis serratis acutis anastomosis venarum utraque tomentosa ferrugineis, genitalibus elongatis Len. Suppl. pag 394 & L.V. pag 801.

Habitata in America calida meridionali

Differt a Lob. grandi tomento ferrugineo, quo teguntur caules, petioli nervi foliorum, peduncululi calycis et corollae; foliis multo minoribus, acutis et serratis; peduncululis magis elongatis, fere longitudine foliorum; floribus magis curvis; genitalibus longe extra corollam elongatis, nec ineludis Len. l. c.

In Lobelia Columnae, ferruginea ~~et~~ ~~lobi~~ ~~lobi~~ singulari est virile sita; quo partes carum herba et floris teguntur; sunt quasi Echini radii pelosi, sic etiam sunt petioli Lob. cordifoli.



minuta Lobelia foliis radicalibus ovatis, scapis capellanibus L. Mant. 292. \* S. V. p. 801  
Habitat in Q. b. huius subaquosis ©

Planta minuta (uti Melleum minutum) pollicari. Radix bifurcata, propaginibus  
repens. Folia radicalia, obovata, obtusa, tenera, vix crenata, longius petiolato  
scapus setaceus, bipollicaris erectus, aphyllus, uniflorus. Calyx oblongus, can-  
didatus erectus à pediculis. Corolla infundibuliformis. Capsula infera, oblonga.  
affinis Lob-Laurentia sed tenerior, nec ulla bractea in scapo; ab Enno differt caule  
nullo h. l. c.

*Strelitzia* L. caule erecto suffruticoso, foliis inferioribus ovato-lanceolatis glabris, margine  
dentatulo-aculeatis; racemo terminali spicato Sw. prod. p. 117

Habitat in India Occidentali. Guadeloupe herb Surinam

Caulis caeruleus, peripedalis, simplicissimus; glaber, crassitie pennae usque supra  
foliis squamis subrotundatis imbricatis. Folia plerumque versus radice[m] conferta  
bipolliciana, sessilibus lanceolata, acute serrata, aerea subtus obscure  
senesca, acuta. Racemus caulem terminans. Pedicelli foliarii alterni  
foliis floralibus brevior. Calycis lacina lanceolata.

~~non~~ ~~est~~

~~caeruleo-latis~~  
descriptum per inter americanum



19  
24

Longiflora lob foliis lanceolatis dentate subpinnatis, pedunculis brevissimis lateralibus, tubo corollae filiformi longissima L. Mant. 482. # 1. V. p. 300. Jacq. Amer. 219. Hort. Vind. 1. t. 27.

Rapunculus aquaticus foliis Putorii, flore albo tubo longissimo Sloan. hist. 1. p. 158. t. 101. fig. 2. Mag. Suppl. 383.

Trachelium fenchifolium, flore albo longissimo Plurm. Jacq. 3. t. 253. fig. 1.

Habitat in Jamaica ad ripas ☉

Caulis ramosissimus ex fragulis alis, cetera planta hirsuta, pedalis. Folia sup. basi angustata grosse dentata subpinnata denticulata bis. tri. pollicaria subtus hirsuta. Flores axillares solitarii, pedunculi brevissimi bracteae setacea versus basin. Lacinae calycis subulatae, denticulatae dentibus quinque, oppositis, denticulatis. Corollae tubus foliis longior filiformis, reflexus. Lacinae limbis albis, lanceolatis aequalibus. Germen turbinatum pentagonum len. l. c.

Succus manus inflammat. Folia equis delictoria, planta venenata sphaera Jacq.

17 *asurgens* Lobelia foliis lance acutis serratis inferne dentatis, caemis compositis terminalibus Am. acad. 5. p. 408 Pl. V. p. 361.

*Lobelia major* bracteata *asurgens*, foliis oblongo ovatis denticulatis basi appendiculatis utrinque productis Brown jam. 322.

Habitat in Jamaica

Herba folia pedalia, latius lanceolata, serrata, basi dentata: dentibus longis patentibus. L. L. C.



~~Asphodelus~~ ~~Asphodelus~~ ~~foliis ellipticis subcrenatis, calycibus~~  
12 *Asphodelica* Tob. foliis ovato-lanceolatis subcrenatis, calycium sinibus reflexis. Hort.  
Piff. 426. \* Am. Acad. 4. p. 527. Mart 402. \* S. V. p. 801. Gay. coll. 1. p. 163.

*Rapunculus galeatus virginianus*, flore violaceo majore Mon. hist. 2. p. 466.  
f. s. t. s. fig. 55.

*Rapunculus Americanus*, flore dilute conules Dodart. Mem. 297.

Habitat in Virginia sylvis aridis, latifolia

Caulis sulcatus angulatus erectus simpliciter <sup>folia</sup> cernuus. Foliis ellipticis, venosa  
glabris, obscure crenata in se sesqui pollicaria inferiora obtusa supe-  
riora acuta. Pedunculi ex alio supremis solitarii uniflori tandem  
racemulati ~~racemulati~~, tandem racemosi foliis subiecto breviori  
vellosi. Calyx vellosus sinibus <sup>obtusis</sup> sicutus ut in Campone  
sive <sup>primis</sup> <sup>partibus</sup> laciniis lanceolatis acuminatis vellosis. Corolla superne <sup>apice</sup>  
tandem sive vellosa. Palato duobus gibbositatibus

glandulosa L. subulosa, foliis oblongis subserratis flombus axillaribus solita  
ris subsessilibus bracteis duabus glandula terminatis Walt. fl. Carol.  
pag. 210.

Habitat in Carolina

non vidi



20 Cliftoniana lob foliis ovatis <sup>cordatis</sup> petiolatis obtuse inaequaliter dentatis, floribus corymbose raci-  
mosi.

Rapuntium Trachelii folio, flore purpurascente Plum. spec. 5. F. 235. fig.

Lobelia <sup>2.</sup> Cliftoniana caule erecto, foliis cordatis lobis obsolete dentatis petio-  
latis, corymbis terminali Lin. Hort. Cliff. 426. t. 26\* L.V. p. 801.

Habitat in Virginia Canada &c.

Caulis erectus simplicissimus, glaber sicut tota planta. <sup>minuta</sup> Lina utroque  
decurrens basi folii petioli. Folia glabra obtusa, teretia, superiora pa-  
rim minima remota. Flores corymbose demum racemosi. Pedicelli  
solitarii <sup>longi</sup> capillares. bractea fetacea ad basin laciniis pedicello duplo  
vel triplo brevior. laciniis calicis subulato, flores parvi violacei.

quam nospiceo maxime simili foliis et dentibus acutis an varietas e Canibus

ellipticus obtusis

29 inflata Lobelia foliis ovatis crenatis ~~sub~~ sessilibus, floribus racemosis, capsulis inflatis  
Lobelia caule erecto brachiato, foliis ovato-lanceolatis <sup>obsoletis</sup> incis, capsulis inflatis  
Hort. Cliff. 1700.

Lobelia inflata caule erecto, foliis ovatis sub serratis pedunculo longioribus, capsulis  
inflatis Act. Ups. 1741. p. 23. t. 1. Syst. V. pag. 801.

β. glabra.

Habitat in Virginia, Canada <sup>polluciana</sup>

Caulis erectus simplicissimus, teres. Folia infima basi angustata: superiora sessilia  
Pedunculus in axillis foliorum superiorum folio brevior, plerumque in caulem termi-  
nant in racemum, pedicellis bracteis lanceolatis longioribus. Fructus globosus  
magnitudine Pisi glaber





11 bellidiflora Lobelia caule erecto paniculato, foliis obovatis crenatis Lin. suppl.  
pag. 396\* LV. pag. 800

Habitat ad Cap. b. spei O

Caulis palmari erectus, inferne hispidus, foliatusque, superne divisis in  
paniculam longiorem. Folia obovata, crenata, subtus pubescentia  
obtusa. Panicula foliis ramis pedunculatis, laxis: pedunculis  
inferioribus longioribus L. S. L.



comosa Lobelia foliis lineariibus dentatis, <sup>foliis</sup> picea terminali Herb. Cliff. 500. S. V. p. 202.  
Habitat in Aethiopia ①

lifida L. foliis ovatis dentatis hirsutis caule erecto bifido Thunb. pag. 40.  
Habitat in Cap. b. spec.

non vidi