

Lobelia

xx + x caule prostrato foliis integerrimis

43. oppositifolia L. foliis subulatis integerrimis suboppositis, pedunculis lae-
vialibus terminalibusque (an ad pinnidivisionem)
44. depressa L. depressa, foliis lanceolatis caule carnosissimo

specimen ex antellis caule herbaceo flexuoso glabro pediculis

pallida Lolida

Habitat Roth

offinis L. urenti. Diversus floribus minoribus, gemmi pallide coeruleis
tereti clavati purpureo magnitudine Comandi periclytus nec
nec purpureo

Caule. Duo a ter, bi-tripetalis & margine veni ^{folium} setus ^{venis} ^{venis}
angulatis. angulis pubescentibus, superiora glabra. Folia
obovata marginata tenui subrecurventia, remote paucis
celato oblonge inaequaliter denticula bi-tripollicari basin
inferiora basi veni angustiora, glabra venosa crasse ciliata
racemus elongatus flores solitarii vel gemini bractea lineari
pedicello longior. lacina calycis longitudine fere tubi lacina
labii superioris parallela nec divaricata ut in purpureo

Ciliani *P* umbellatis subsaepe radiatis ^{ap. p. l. l.} spicis compositis imbricatis Veret. Cypri
onicis squamis spicularum oblongis squarosis.

Habitat in India orientali
Culmus bipedalis in quibus striatus inferne foliosus non crassus
basi crispata penna anthera ^{nulla} ^{intra} tenuior. Folia frequen
ter altitudine culmi ^{retrospun} ^{scabra}. Umbella radi
6 compositis. 2. 3 sespilis in ⁱⁿ ⁱⁿ centro simplicis. Longiores
in pollicariis striatis; compressiusculi. An solvunt folio
la 4 or duo longissima pedalia 3 umbella dimidio
longior ⁴ ^{trun} brevior omnia angusta retrospun scabra
involucella nulla nisi ^{se} ^{se} squama minuta subulata
Siccis 4 or vel septem sespilis saepe pollicares intermedia
erectae interdum reliquis parum longiores spicularis radi
que imbricata, penna columbina duplo crassiores.
Spicula frequenter compressiuscula parva oblonga
sordida flavescenti demum 13-15 flora squama ovata
carinata carina vixi mucronato, mucrone reflexo
patenti hinc spicula quasi ciliata.

Lobelodes

Caulis erectus, vix ramifus pubescens. Rami alterni. Folia petiolata
alterna oblonga obtusifolia integerrima nervosa, cylindrica, pollicia
ria. Flores ^{hispida} alterni remoti, filis lateralibus vel suboppositis foliorum
pedunculatis. Pedunculi solitarii uniflori brevissimi. Calyx tubulosus
nervosus unguiculatus 5-fidus laciniis sabulatis. Corolla caly-
ce duplo longior tubulosus tubo apice parum ampliato. Laciniis quin-
que aequalibus tubo dimidio brevioribus linearibus argutis, antheris
Congestis in tubi ^{antheris linearibus} ~~in summitate pubescentibus~~. Capsula triloculari, adhaerente, disperma
semina compressa stylis 1. Longitudine tubi capillaris stigma unicum
obtusum

crisifolia L.

Rapuntium albosium foliis crispis flore serrescente Plum.

Habitat Herb. La Martini Sarrani

Caulis crispis pennis cymis. Folia sparsa lanceolata, epithemata, utraque
attenuata, remote serrata, glabra, subtus pubescentia. Racemi pedales: pedicelli
pollicares.

Est acuminat. Sarrani

bromoides Schoenus ~~culmo~~ Vereti foliis, pinnulis pedunculatis solitariis cras-
sis ~~confertis~~ La Mart. T. Enc. pag 137.
Habitat in cap. b. p. ei

non vid.

15 secunda lobata, glabra, foliis inferioribus oblongo dentatis, superioribus lanceolatis integris, pedunculis racemosis secundis. Lin. Suppl. p. 395 * L. pag. 001.

Habitat in Cap. bono spici

lingulari, quod rami fere a basi in omnibus axillis foliorum floriferi, et flores ad unum latus omnes nutantes hinc l. c.

non vid.

linariifolia *Labelia*

Habitat in Peru herb. Gusf.

Caulis herbaeus, erectus, simplicissimus, teres, glaber, palmari vel fistuliformis. Folia
semipollicaria, lanceolata, glabra, arena, nervis, extropium obsolete serrata, in
senora obtusa, superiora acutiuscula. Racemus terminalis: pedicelli uniflori
contracti. Capsula glabra. Flores lob. Doim. perenni minoris.

graminea Lobelia

La mark

Habitat in Peru herb. Gusf.

Caulis bipedalis, erectus, teres, striatus, glaber, uti tota planta, simplicispi-
mus, crassitie fere pennis anserinis. Folia 3 pollicaria, lanceolata, sparsa,
utrinque attenuata, acuta, integerrima, simpliciter venosa. Racemus
terminalis, spithameus et ultra, simplicispi-
mus. Bractea subulata,
longitudine pedicellorum. Calycis lacini subulata. Corolla purpurea

macrophylla Cinchona.

Habitat in Regno. fl. fe' herb. Thaurini.

Rami crassitie digiti minimi. Folia petiolata, semipedalia, subcordato oblonga
ultra pythamam lata, tenera, utraque glabra, ^{venis} subtus pallidiora. Petioli bipolli-
cari. Flores corymbosi. Capsula pollicari vel parum ultra, cylindrica, glabra,
superius attenuata, obscure longitudinaliter lineis elevatis. Pedunculi subanescon-
tes. Rami superne tomentosi, uti petioli, statura glabri. Stipula ovata, acuta
semi pollicares, dorso tomentosa.

16 patula *Tobelia* herbacea, diffusa, virens, glabra, foliis ovatis dentatis, pedunculatis *Castem*
salibus *Lin. suppl. pag. 395. L. V. pag. 201.*

Habitat in Cap. bono spici

Taxis spicis. Caulis punicus alt. tenuis striatus, glaber & demissus. Rami
alterni plures ex eodem puncto filiformes ramulosi. Rami folia
f. flores habet.

W. G. G. G.

diffusa Lobelia

Crenata L. foliis lanceolatis crenatis glabris, caule volubili. Herb. prod.

pag. 39

Habitat in Cap. b. spai

22. *simplex* Lobelia caule erecto, foliis linearibus integerrimis ^{pub} pedunculis solitariis Mant.
291. & S. V. p. 200.

Habitat ad Q. ^{entus} spei O.

busi rami aliquot simplicis primis altitudine caulis
integerrima, interdum denticulo uno altero

Caule *simplex*, teris, palmari. Folia alterna, sessilia, remota, acuta, teris, ^{pub} ^{3/4} ^{pub}
linearibus lanceolatis, digitorum transversum longa. Pedunculi axillares, uni flori, nudi, teris
erecti, foliis duplo longioribus. Capsula infera turbinata lina Mant. l. c.

¹³ differt foliis denticulo uno altero
23. *debilis* Lobelia erecta, foliis lanceolatis serratis glabris, pedunculis lateralibus
foliis longioribus lina - Suppl. p. 395. S. V. pag. 201.

debilis

Cenereus *L. folus linearibus dentato spinosis cinereo tomentosis floribus*
subsessilibus Thunb prodr. pag 40
Habitat in P. b. prai

non vid.

24 tomentosa Lobelia foliis tomentosa, foliis linearibus dentatis, ^{hirs} pedunculis terminalibus longissimis
subuni flori. Lin. Suppl. p. 394

Habitat in Cap. bono ^{per} ^{ramis} ramis. Sola approximata, unguiculata, supra canalicula
tomentosa. Caulis foliosus ^{hirs} hirsutus. Sola approximata, unguiculata, supra canalicula
tomentosa, utriusque unguis versus apicem. Pedun-
culi laterales, terminalesque, ⁱⁿ ^{planta} ^{ipso} ^{longior} ^{fructu} ^{ramo} ^{et} ^{ultra}
glabri, corisiformi feliformer squamis aliquot minutis versus apicem. Calyx
et corolla glabra. Similis coronopifolia in multis an sola varietas?

25 coronopifolia Lobelia foliis linearibus dentato pinnatifidis glabris margine carinaque
subciliatis pedunculis longissimis ~~et floribus~~
Rapuntium aethiopicum, flore conuleso galeato, foliis coronopi Herm afr.

18. Boeyn. Cent. 88

Rapuntium foliis longo profunde dentato, florum petalū longissimis Burm
afr. 98. t. 38. fig. 1.

Lobelia coronopifolia foliis lanceolatis dentatis, pedunculis longissimis
Lin. v. p. 802. Mart. 483. *

Habitat in cap. b. huius
prosp. in.

Caulis ~~linearis~~ ^{multiflorus} ~~ramosus~~, rami lignosi hispidi. ^{angustulano} Folia aggregata ^{confertissima}
~~et~~ linearia, acuta, ~~se~~ ^{se} subcunduplicata utrinque dentibus tribus pro
fundi remotiusculis, remotis oppositis, max subaristata, ^{perpetua in longiores} carina et margine
~~sub~~ ^{sciss} nonnullis ciliata. Pedunculi terminales, ^{perpetua in longiores} prothamni, ^{perpetua in longiores} ~~perpetua~~
glabri superne squamis aliquot setosis adpressis, uniflori, calyx
nilosus albus corolla multo brevior laciniis subulatis

26 triquetra Lob. foliis ^{lineantibus dentatis} lanceolatis dentatis, racemo terminali.

Lobelia triquetra caule erecto, foliis lanceolatis dentatis, racemo terminali
a) aphylo Lin. Mant. 120 * S. V.

β. Lobelia comosa, foliis lineantibus dentatis, spica terminali foliosa. Lin. Spae.

Pl. 1323.

Lobelia comosa foliis lineantibus dentatis, floribus corymbosis, caule ramo

L. Berg. Cap. 344

Habitat in Cap. per ②

Caule herbaceo sulcato. angulato ramis glaber uti tota planta. folia sessilia
remota, pollicaria, dentibus utraque 2-3. remotis. Ramulus pedunculatus
erectus. foliolum lineare-lanceolatum subdentatum ad basin pedicelli
pedicelli brevior. Calyx glaber 5 laciniis subulatis. Ovidius glottosus magni
tudinē P. si, glaber.

in mat. obtuse subdentat glabris
v. minuta *Lobelia foliis radicalibus obovatis, scapis capillaribus ebracteatis.*

Lobelia minuta foliis radicalibus ovatis, scapis capillaribus Lin-Mant. 292.
+ L. V. p. 301.

Habitat in Cap. b. spei Subayquosi O

Planta minuta uti *Bellium* ~~ut~~ *Lesqui pollicaris*. Folio radicalia, obovata
se longe petiolata tenera, integerrima vel obsolete dentata, longitudine
fere scapi, glabri. Scapus foliis parum longior, uniflorus, absque
ulla bractea, que nota proportionis offerat. Cal. Laurent. *Toliceola calycis*
Cariccolata. Corolla campanulata infundibuliformis inaequalis.

Lobelia minuta La Mant. Diversa a *Lin.* Habitat in capulis balcanicis
herb. Guss.

pygmaea L. foliis rotundatis serratis caulibusque decumbentibus hispatis
Thunb. prodr. fl. Cap. pag 40.
Habitat in Cap b. sp.

non vidi

maculata. L. foliis oblongis subdentatis glabri scapi uniflori medio bractea

^{ti}
Rapuntium eriticum minus flore maculato Bellido folio Tourne
fort. Cor. pag. 9

Habitat in Creta

Planta longitudine digiti folia plura ^{una} unguiculata obtusa petiolata
scapi capillares plures vespis medium bractea duo minut
Lobelia maculata minuta Lamourini

nyda 34 l-folus setacei subdenticulati caule ramoso rigido, ped uniculis
multifloris divaricatis

radicari L. foliis lanceolatis undulatis serratis caule decumbente radici
caute Thunb in Act. Soc. Lin.

non vidi

campanuloides L. foliis subpetiolatis laciniolato - oblongo dentato & pedic.
culis elongatis Thunb in Act. Soc. - Linn.

non vidi

• angulata L. caule simplicissimo, foliis subrotundis repando-dentatis,
pedunculis axillaribus solitariis unifloris Hoffm. prod. pag
50

non vidi

20 *Laurentia* Lobel. caule prostrato foliis oppositis lanceolato ovalibus crenatis, caule ramoso
pedunculis solitariis unifloris Lin. l. V. pag. 201.

Rapunculus aquaticus repens; flore caules inapertis Raii Suppl. 383. Boerh. mus.
35. t. 27.

Laurentia annua minima, flore caules Mich. Genes. 10. t. 14

Habitat in Italia O

Bractea setacea in medio pedunculi Lin.

~~non~~

Rapuntium ¹ *crithicum* minimum bellidii foliis flore maculato Tournesf. corol. 9. non ~~convenit~~ ^{convenit}
nec cum Descript. lin. nec cum figura Micheli

Quarta
plant.

Planta est ~~vix~~ digitalis, scapo erecto unifloro in medio folio renico vel geminis setaceis
foliis rosicaria, petiolata, oblonga, ^{gemina} integra vel subcrenata, glaberrima. i
Laurentia Lin. est Laur. ad div. f. onem antecedentem amandanda est.

~~ficus uniflorus~~

non dicit

egenius lob. caula patulo, ^{foliis} radicalibus ovalibus caulini lanceolati subdentati, pedunculis
longissimis Lin. Spec. pl. pag. 1321. * Mant. 483 S.V. pag. 802.

+ Campanula minor africana, erini facie, flore violaceo caulibus erectis Herm
Lugd. 110. t. 111.

Habitat ad C. bono spec. C.

+ Trachelium minus africanum, floribus violaceis per caulem sparsi Tournef. Inst.

131.

Caulis spithamei filiformi basi rami aliquot ascendenti simplicissimi glabri ut
tota planta ^{in pediculis} folia obscure denticulata: dentibus utrinque binis vel tribus;
radicalia ovalia basi attenuata in petiolum: Caulina ^{simplicia} remotissima lanceolata
obtusis. Pedunculi axillares solitarii filiformes foliis duplo ^{vel triplo} longiores, uni
flori

floribus campanulatis

30 denario. Lobelia caulibus prostratis filiformibus, foliis petiolati oblongis dentatis Ten Mart

2914 L.V. pag. 302.

Campanula minor africana, erini facie caulibus procumbentibus Heron Lugd.

p. 100. t. 109

Habitat in Cap. bono spei O

Caulis pluri mi, prostrati, filiformes, simplices, ~~semper~~ saepe semper aces. Folia aeterna, subpetiolata, remota, oblonga, obtusiuscula, dentibus lateralibus 2 f. 3. obsoletis. Peduncululi laterales, solitarii, folio breviores. Calyx foliolis lanceolatis. Corolla infundibuliformis campanulata, angulata, equali conlea, laciniis patulis.

Lobelia tenella differt caulibus ^{erectis} procumbentibus: ramosis rubris; foliis oppositis lanceolatis acutis: ad ultionibus reflexis; floribus in apicibus ramorum quinque partitis; calyce setaceo; capsula globosa. Ab Enoro dicitur quibus caulibus procumbentibus floribus campanulatis equalibus

longitudine folii

91 ^{ancaps} Stolonefera Lobelia foliis inferioribus spatulatis angulato dentatis, caulibus canaliculatis ^{decuratis.}
^{cataphalibus} ^{integris}
m, fructibus sulcatis alatis.

Habitat in Cap. b. f. u. O. serena

Plantae palmaris pilosa Stolones procumbentes foliosi. Caulis striatus ^{interdum} ^{ramis paucis} ^{striatus}
^{altiore} ^{oleosa} ^{caulis} foliis in nervis et stolonum, spatulata dente uno alterove angulato. Caulibus
canaliculata obtusa subintegerrimis. Pedunculi brevissimi laterales solitarii
uniflori. Flores longitudine folii. Capsulis sulcatis fol. angulis suberstantibus pilosis

Lobelia foliis canaliculatis decurrentibus in Suppl. pag. 395 & S. V. p. 200.

34 thermalis Lobelia Caula procumbente hispida, foliis lanceolatis dentate serratis
sessilibus Pedunculi axillaribus ~~hispidis~~ ^{set} calycibusque hispidis.
Habitat in Capite bono per
Caulis herbaceus, filiformis. folia subunguicularia setis aliquotaepe sa
magine inersata dentibus utrinque quatuor. Pedunculi axil
lari solitarii, rari, foliis brevioribus valde hispidi uti Calycis

38 her. jura L. fruticosa hirsuta prostrata, foliis ovatis dentatis, pedunculis lateralibus
longissimis. bis. trifloris.

Habitat in Cap. b. p. i. t.

Caulis remotissimi palmares. Rami e linea decumbente angulati curvati flexuosi
alterni. folia sessilia ^{aeterna} angustiora oblonga utrinque dentibus 2-3 remotis
obtusis hirsuta ~~pedonata~~ angustiora. Pedunculi axillares solitarii folio
longioris erecto patenti. Calicis linearis a. u. t.

36 alata Lobelia foliis lanceolatis sessilibus gla crenatis glabris, caule alato.

Habitat in Zeylona.

Caulis terribus anceps e membrana tenuissima utriusque per caulem a folio ad
folium decurrens, glaberrimus uti tota planta. Folia sessilia remotissima
superne minus, pollicaria, obtusa, venis crenata. Pedunculi laterales
capillares, solitarii, uniflori, folio brevior. ^{et folio supremo} Flores parvi conlei. Calyx
glaber

humifusa *Cobelia* foliis oblongis crenatis, floribus subcorymbosis calycibus glabris
38

Habitat in Insula Bourbonis Thouron ^{pubesplenis} ~~superioris rami alij~~ ramifus.

Caulis herbaceus prostratus prostrans glaber uti tota planta. Folia oblonga
inferiora basi angustata, ~~superiora suppetentia~~ sessilia crenis utraque qua-
tuor minutis, unguiculata. Pedunculis ex apice ramorum
flores corymbosi 4-5. pedicellis ~~capis~~ ^{si} bifloris basi foliolo lanceolata pedicel-
lis brevior. Flores conuli

39
nummularifolia Lobelia caule repente ^{villosa}, foliis petiolatis ^{disperatis} subrotundis, floribus axillari-
bus, fructibus capsatis.

Habitat in Tava: ^{tes}

Caulis tenuis repens, pedalis et ultra, folia subrotunda altera latere
basi parum breviora, argute serrata ut unguicularis, pub villosa, veno-
sa frequentia. Petiolo folio triplo brevior. Pedunculi folio duplo
longiores si biflorae glabrescentes. & calicis calycis ⁵ petalis.
Omentis ⁵ ovalis glabres pisp major

40 cuniloides ^{denticulatis} Lobelia foliis inferioribus subrotundis, superioribus ^{reticulatis} oblongis sessilibus, fructibus pyrami-

Datis glabris

Habitat in Madagascari Thousen

semotensis Desoivre
miquelensis acubis
similis Desf.

Caules repens fili formis ramosis; glaberrimus est tota planta. ~~Supremis integer~~ ~~et sequenti~~ Pedunculis laterales uni flori longitudine folii. Capsula cuneiformis longitudine pedunculi

Differt ab antedecente figura foliorum capsulis cap glabris, ab in sequenti foliis reticulatis Capsulis cuneiformibus illa enim subrotunda

18 *Stundifolia* Lobelia foliis subrotundi serratis sessilibus, pedunculis lateralibus capsulis glabris

Habitat in India orientali Honij.

Affinis Zeylanica differt. var. foliis sessilibus subrotundi omnibus acute serratis
calycibus glabris.

8 lineis parvis. tota glabra

^{lynata}
42 ^{hirsuta}

Lobelia foliis ovalibus crenatis lanatis, floribus lateratibus solitariis Lin.

Rapunculus galeatus othiopicus comleus, hirsuti et subrotundi crenatis foliis Planch
alm 316.

Rapuntium africanum galeatum, foliis oblongo rotundis dentatis villosis Prati suppe

^{305.}
Rapuntium foliis subrotundis hirsuti, flore ex alis solitario Burm. afr. 105. 840.

f. 2.
Habitat in Othiopia

pubescens L. caulis angulatis, foliisque lanceolatis dentatis hirsutis
pediculis axillaribus unifloris Hort. Kew. 3. pag. 29.
Habitat in P. b. sp.

non ord.