

Lonicera

* caule volubili

3. *Lonicera* L. verticillis subcapitati bracteolati, foliis deciduis subtus glaucis:
corollis nagentibus basi gibbis, ~~et~~ summis connato-perfoliatis
corollis nagentibus basi gibbis
7. *implexa*: floribus nagentibus verticillatis, bracteis loricibus, foliis perennantibus glabris oblongis: superioribus connato-perfoliatis, summis dilatatis
2. *opata* L. floribus verticillatis terminalibus, foliis perennantibus obovatis subtus glaucis: summis connato-perfoliatis, corollis nagentibus
4. *caprifolium* L. floribus nagentibus verticillatis terminalibus, foliis deciduis summis connato-perfoliatis
5. *impervirens* L. fructis subnatis terminalibus, foliis oblongis: summis connato-perfoliatis, corollis subaequalibus: tubo superne ventricoso
6. *peniclymenum* L. floribus nagentibus capitatis terminalibus, foliis deciduis omnibus distinctis

xx pedunculis bifloris

7. japonica L. floribus geminis terminalibus sessilibus, foliis omnibus distinctis.

xx pedunculis bifloris

8. nigra L. bacis distinctis, foliis ellipticis.

9. satanah. bacis distinctis, foliis cordatis obtusis, glabris

10. Hysterocheilus L. bacis distinctis, foliis ovatis vellosis, corollis unguiculatis

11. pyrenaica L. bacis distinctis, foliis oblongis glabris, corollis regularibus

12. alpegena L. bacis coadunatis didymis, foliis ^{oblongis} lato lac. lanceolato-ovatis

13. coerulea L. bacis coadunatis globosis, foliis oblongis obtusis, corollis ^{acutis} unguiculatis regularibus

xxx caule erecto pedunculis multifloris

14. symphonocarpos L. capitulis axillaribus pedunculatis, laciniis calycinis fimbriatis

15. ~~babingtonii~~ ^{Stundis} racemis terminalibus, foliis serratis

16. comboza L. corymbis terminalibus, foliis ovatis acutis

Lonicera

Capnifolium ereticum, non perfoliatum, foliis cœtini, floribus inodoris, partim albis,
partim flavis, cæcatis Tournef. Cor. pag 42.

Habitat in Picta herb. Tournef.

glaberrima, folia ^{inferior} subpetiolata, ^{oblonga} supra avenia, basi acuta, sesquipollicaria, sub
tus venosa, glauca, superiora connata. Corolla pollicaris, fauce Penety
meri, an species distincta

Canadensis Loureiro

vide de Hamel

Habitat in Canada herb Desfont.

affine L. coerulea. Rami cortice cinereo, teretes. Folia petiolata, sempollina,
na, ovato-oblonga, integerrima, glabra, acuta, subtus nervis venosa. Bot
ica condonata, coerulea, glabra. Stylus simplex. Stigma caputatum.

androsani-folia Lonicera

Baccifera scandens androsani-folia Hispanica Vaillant.

^{Habitat in Hispania herb. Mus.}

Caulis scandens, superne villosus. Folia petiolata, semipollicaria, ovata, opposita, crassiuscula, subtus fereosa. Pedunculi axillares, solitarii, petiolo brevioribus.

orientalis Linnæus

Chamaecrpus orientalis Linnæi foliis, fructu nigro Tournef. Cor.
Habitat in Cappadocia herb. Juss.

Folies Linnæi: alpeyano. Ramis glabris, uneres, superne purpureis, villosis,
Folia petiolatis 2-3 pollicariis, subcordata, oblonga, venosa, supra glabris, infera
subtus villosa, acuta. Pedunculi axillares, solitarii, cymosi, triflori.
Fructus uneres.

*Campylocyba lonitica pedunculata bifloris, bacis coadunato-didymis, foliis
ovato-lanceolatis Pallasfl. Prosp. p. 179.*
Habitat in subalpinis Caucasi

non vidi

Mongolica *Lonicera* foliis ovatis serratis pubescentibus, pedunculis multip-
lucis simplicibus unifloris Pall. itin. 3. app. 721. n. 76. fl. Ross. 1.
p. tab. 30.

Lonicera racemis terminantibus compositis, laxis umbellatis, foliis
serratis Gmel. fl. sib. 3. p. 135. n. 8. tab. 25.

Habitat in Mongolia, Dauria

non_ vidi

mongolica L. foliis ovatis serratis pubescentibus, pedunculis mult.
floris, bacis simplicibus unifloris Pall. A. vol. 3. op. pag. 721
no. 76. fl. ros. 1. pag. 59 tab. 30

Conicaria racemosa terminantibus compositis laxis umbellatis,
foliis serratis Gmel. fl. sib. 3. p. 135. n. P. tab. 25

Habitat in deserto Mongolorum &

Xylosteo minor. Folia subtus lanugine cana. Pedunculi terminan-
tes inter ultimum par foliorum, longitudine petiolorum,
bifidi pagulo bifido 2-5-floro flores fusi. Corolla par-
va campanulata aequalis. bacca globosa

non vidi

bubalina Lonicera capituliflora terminalibus pedunculatis, foliis oblongis in
mis glabris Len. f. V. pag. 216.

~~Id. d. de la Mart.~~
Frami Veretor, glabris, superne compressi, villosi, sub foliis parum
dilatati, e capite foliorum modo.

Folia petiolata, opposita, subcoriacea, tripolliciana, indegenima
glabra, costa tantum raris pilos, nervosq. a venia. Foli parvi in
copiosi in axillis foliorum.

Capitula brevia pedunculata, ~~axillaria~~ ^{sub flor.} vel terminalia rami
longum, ^{sub flor.} utrinque folium petiolatum.

Involucra polyphylla, brevissima, ovata, acuta, villosa.

Calycis lobis linear-lanceolatis, corolla breviori.

Corolla extus villosa, cinerascens.

Capsula biloculari. Capsula biloculari bispem

(Vix Lonicera species)

Litr. K. pag. 37.

Molena

Banistena benghalensis Lin

Symphoricarpos L. capitulis lateralibus pedunculatis, foliis petiolatis Lin. S. V

Symphoricarpos foliis alatis Dill. Elth. 371. t. 270. fig. 360

Habitat in Virginia, Carolina

Ramuli oppositi teretes, pubescentes. ^{pellucida mucronata} Tolla ovata vel oblonga
glabra, subtus glauca venis villosi. Pedunculi axillares breves. Stems
compressi. Calycis glabri laciniis subrotundis involucria minuta ope
centis villosa

16 Diervilla L. racemis & terminalibus; foliis serratis Linn. I. V

Diervilla acadensis fruticosa, flore albo Tournef. 4 Pl. II. act. 1706. t. 7
fig. 1. Duham. arb. 1. p. 209. t. 107.

Diervilla Hort. Cliff. 63. t. 7.

Habitat in Acadia, Novaeboracis

glabra. Folia petiolo ovata attenuata tripolluciano. Racemi
pauci flori. Solum lanicolatum petiolatum ^{attenuatum} ad basin pedicello
nisi et bractea setacea ad basin gemini. Laciniae calycis setae
corollae nongentibus

2 implexa L. floribus nigerrimis verticillatis, bracteis lobatis, foliis perennantibus
glabris oblongis: superioribus connatis perfoliatis: summi dilatatis Hort

Pur. 1. p. 231.

Et habitat in minoribus

foliis minoribus et angustioribus quam in plerisque speciebus hujus
generis.

non vidi

Caprifolium L. floribus verticillatis terminalibus sessilibus, foliis summis con-
nato-perfoliatis Cen. I. V. Falcq. fl. austr. v. 4. t. 957.

Caprifolium italicum Dod. pentst. 411.

Peritymenum perfoliatum Bauh. pin. 302.

Habitat in Europa australi.

Caprifolium L. floribus nigris verticillatis terminalibus, foliis deciduis:
summis connato perfoliatis Hort. Kew. 1. p. 230 venosa supra avenea
glabra. ^{venosa subtus pallidiora} ~~olea superiora connata~~ ^{venosa} ~~venosa~~ ^{micronata supra}
~~avenea subtus venosa~~ ^{connata} ~~suprema~~ ^{subrotunda}. verticilli quadri-
vel quinqueflori. Flores folio longiores.

5 *Sempervirens* L. verticillis aphyllis Verminalibus; foliis summis connato-perfoliatis

Lin. S. V.

Perilymenum perfoliatum Virginianum sempervirens et florens Heron. Lugd.

404. T. 403.

Habitat in Virginia, Mexico,

Sempervirens L. species subnudis Verminalibus; foliis oblongis: summis connato-perfoliatis, corollis subaequalibus: tubo supremo ventricoso Hort. Kew. t. p. 230

variat foliis subrotundis et oblongis

Volubis caulis purpurascens rami & latri. Corolla opposita petala
sa elliptica obtusiuscula glabra. Petiolus brevissimus. Discus
supremo connata subrotunda. Flores coccineis limbo quinque
fido

6, periclymenium L. capituli ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis
pubescent
Lin Hort. Ups. 427

Peniclymenium non perfoliatum germanicum Bauh. pin. 302.
globois. Caprifolium germanicum, flore rubello perfoliatum Tournef. G. R. H.

226.

Habitat in Europa media,

Periclymenium L. floribus nageptibus capitatis terminalibus, foliis deciduis,
omnibus distinctis Hort. kew. 1. p. 231.

volubili Ramis cicutricati inferne crenati. Folia petiolata opposita, elliptica obtusiuscula integerrima glabra subtus glauco-viridia
Peciusculus puberulus. Flores extrae purpurei, intus albi, ad me-
dium usque divisi in duo lobia, superiora quae confidum inferius
reflexum lineare.

1 japonica L. floribus binis terminalibus sessilibus, foliis omnibus distinctis caule
volubili Thunb. fl. jap. S.V. p. 26

Habitat in Japonia in herb. Royeni

Caulis volubilis hirsutus, parum ramosus. Rami oppositi teretes
diphylli floentes valde hirsuti unguiculares. Folia omnia petiola
ta, ovata acutiuscula villosa, subtus pallida pollicaria. Petioli
deflexo-patentes, hirsuti, ramis paulo brevioris. Flores in apicibus
ramorum terminales, bini sessiles. Calyx brevissimus. Corolla irregu-
laris villosa rubra. Thunb.

Rami et reliqua villosa. folia oblonga cum mucrona brevissimo. Flores gami-
ni sessiles in ramulis diphyllis sub flore axillaribus brevissimis

Alia planta sub eodem nomine in herb. Royeni aderat sed vitæ hujus generis cum
german videtur sapientia. Folia oblonga ovata, petiolata, distincta, sesquipollicaria
acuminata, extrosum serrata, venis sine venis, nervi subtus villosi, ceterum uti rami
non vidi. Pediculi axillares plerumque uniflori Calyx lacinae lineari

a grata lon floribus verticillatis Verminalibus, foliis perennantibus obovatis
subtus glaucis, seminis connatis-subperfoliatis, corollis singentibus Hook
Vern. 1. p. 231

Platymenum Americanum. Phil. Bot.

Habitata America septentrionali
Folia inferiora ovata, tota glabra

biflora Lonicera caule volubili, foliis cordatis petiolatis, pedunculis
axillaribus bifloris petiolo longioribus De font. fl. Atl. pag. 104.
Tab. 52.

Habitat in monte Trava Barbano §

quadrifolia Conium. pedunculis trifloris butis distinctis foliis verticilla
tis quaternis ovato-lanceolatis glabris Willden. spec. plant. pag.

906

Habita

5

non ord.

orientalis Lonicera. pedunculis bifloris, bacis conduratis, foliis petiolatis
ovato-acutis subtus pubescentibus Wild. spec. pl. pag. 900.
Chamaecerasus orientalis Laurifolia Tournef. Cor. 42.
Habitat. in Asia minor. 5.

non di

1 *Dioica Lonicera verticillis aphyllis terminalibus; foliis omnibus connato-perfoliatis*
Lin. S. V. p. 215

*Dioica Lonicera verticillis subcapitata bracteolata; foliis deciduis subtus
glauces: summis connato-perfoliatis corollis unguatibus basi gibbis*

Hort. kew. 1. p. 230

Lonicera media Murr. in nov. Com. Gott. 1766. p. 20. 13.

Habitat in America sept. 7

*Lonicera media: capituli verticillati aphyllis terminalibus; corolla
brevis gibbo basi d. d. ymo; foliis summi connato perfolia
tis Murr in com. m. Gott. 1776. p. 20. 4. 3. P. V. pag. 216. x*

Corolla brevis caulis ut in peneslymeni

o. nigra L. pedunculis bifloris basi distinctis, foliis ellipticis integerrimis

Lin. S. V. p. 2164 Haenqu. fl. austr. v. 4. t. 314. Spec

Peniclymenum rectum 2. Clus. hist. 1. p. 50.

Chamaecerasus alpina, fructu nigro gemino Bauh. pin. 451.

Peniclymenum rectum, folio serrato Bauh. hist. 2. p. 107.

Habitat in Delphinata, Gallia, Helvetia &

Rariora inveniri, sub folio dilatatis. ramuli purpurascens. Folia

canaliculata ^{in pyramide} utraque acuta, juniora hispida, subplicata unde
quasi serrata. Stipula ovata canaliculata. Flores purpurascens
des Pedunculi longitudine foliorum

9 tatarica L. pedunculis bifloris bacis distinctis, foliis cordatis obtusis Lin. Spec.
pl. p. 247* Jacq. coll. 1. p. 34 Pall. Fl. Ross. 1. pag. 55 tab. 36
Chamaecerasus fructu gemino rubro, foliis glabris cordatis Am. rith.
184.

Habitat in Tataria

Rami cinerei. Folia ^{integerrime} glabra pollicaria, subcordato ovata vel oblonga

interdum ternata. Pedunculi axillares. Involucrum ^{6 phyllis} diphylleum
foliis 2.

lineari lanceolatum longitudine florum corolla pallide incarnata.

involucella
ovata minutis
Labis superiore tripartito: lacina media bifida; inferiore simplicis

Bacis coccineo ruberimo

pyrenaea l. pedunculis bifloris basi distinctis, foliis oblongis glabris Lin. Spec. pl.

p. 2404

Hylosteum pyrenaeicum Tournes. F. R. H. Cog Magn. hort. 209. T. 209 Duham
abr. p. 374. T. 116

Habitat in Pyrenaeis;

Tota glabra rami cortice cinereo teretes. folia petiolata pollicaria
nervosa venosa. Pedunculi foliis longiores. ^{oppositi} fi. biflori

pyrenaea conv. regularibus; pedunculis bifloris etc.

10 *Xylosteum* l. pedunculis bifloris bracteis distinctis, foliis integerrimis pubescentibus
Linn. S. V. fl. Dan. T. 880.

Xylosteum Dod. pempt 412.

Chamaeceraspis dumetorum, fructu geminis rubro Bauh. pin. 451.

Habitat in Europa frigidioris partibus

Ramicinensi pubescenti Verstei. Folia petiolata, ovata vel
ovata mucronata, sesqui pollicaria. Squama gemmarum can-
tesolata villosa. Involucra setacea longitudine germinis. Involu-
cella subrotunda germine breviora. Pedunculi petiolo parum
longiores

Xylosteum l. corollis nigris

pubescens ^{basis distincta} Con. foliis ovatis acutis subtus paucis villosis; corollis argenti-
bis longitudine foliorum
Habitat in maritimo in Schrubbe 3
Rami teretes superne pubescentes. Folia petiolata
natae sunt pinnae, forma integerrima sequi polli-
canae obscure venosa. Petiolus ^{petiolus pinnarum} pinnarum
longitudine petioli. Bractea minuto ad basin ger-
mini corolla longitudine foliorum extus pubescenti
Cotyledones duae angustiores lineares reliquis oblongae

Caucasica Lonicera pedunculis bifloris, baccis coadunato-didymis
foliis ovato-lanceolatis integerrimis Pall. fl. Ross. 1. pag
57.

Habitat in subalpina Caucasio

Folia utraque glaberrima, pedunculi axillares solitarii
nullis. Sepala tres setaeo-lineares. Corolla subten-
da infundibuliformis lacina unica angustiora. Filamen-
ta corollae parum longiora. Stylus capitatus. Bacca globosa
atro-coenulescens
affinis Lonic. nigra

alpygena L pedunculis bifloris, bacis coordinatis didymis, foliis ovali lanceolatis

L. V. p. 2164 Gœq. fl. aust. v. 3. t. 274. Mill. Dict. v. 167. fig. 2.

Penclymenium rectum quadam Clus. hist. 1. p. 59.

Chamaecraspis alpina, fructu rubro gemino: duobus punctis notato

Bauh. pin. 451.

Habitat in alpidibus Helveticis, Pyrenæicis, Allobrogicis &c.

Rami inferne cortice cinereo ramuli purpurascetes, uti
reliqua parte glabri. Folia petiolata lato lanceolata
attenuata basi acuta, tripolliciana. Pedunculi axillares
solitarii folio dimidio brevioris. Involucrum lineare germi
ne paululum longior. Corolla purpurea nagentibus
labrum inferius fauce villosa

alpygena L corollis nagentibus, pedunculis bifloris, bacis coordi
natis didymis, foliis lato lanceolatis

13 Coerulea d pedunculis bifloris, bacis coadunatis globosis styli indivisi Lin. Sp. pl.
p. 249. Gaerq. fl. austr. v. 5. app. t. 17. fl. ross. 1. pag. 50 tab 37

Peniclymenum rectum, fructu coeruleo Clus. pan. Ps. Bauh. hist. 2. p.
108.

Chamaecerasus montana, fructu singulari coeruleo Bauh. pin. 451.

Lonicera aetnaea flor. Ross. t. 37.

Habitat in Helvetia

Rami veteri cortice purpurascens. ^{etate pueri} folia breviter petiolata
juniora pubescentia oblonga obtusa integerrima. Gemmae duae
s. tres altera supra alteram tamquam duo spinis, subulata com-
presso horizontali. Pedunculi ex oppositis infimis foliorum
cornu brevissimi. Germe unicum absque visibili perianthio
Corolla duabus speciebus regularibus albis. Bacca oblonga atro coen-
ulescente ^{juvencis pueris purpurea}
~~Lonicera aetnaea fl. Ross.~~