

Loranthoides

basifolius Loran & Hordes

Habitat in insula Francia de Thouri 5

Rami oppositi teretes inferne aphylli floriferi ad articulos
nodosi superne foliosi, cortice cinereo. Folia opposita petiola
ta, pollicaria oblonga obtusa basi acuta, integerrima utraq;
glabra venosa. petiolus brevis. stipula stipula connata brevis
seu rotundata cum mucrone. floris axillares ^{pub} sespiles 2-3.
pyramida 3-4 minuta in apice pedunculi. Calyx marginis integer brevis
infra germen. calyx proprius vix ullus nisi marginis brevis pinnis superioribus
Corolla 1 petala infundibuli formis glabris tubus Lemnigui
culari limbus profunde bifidus laciniis 6 linearibus oblongis
obtusis. Stamina filamenta vix ulla. Anthera 6 linearis
exte, inter laciniis corollae longitudine lacinae non
germen inferum oblongum. Stylus unicuique longitudine
corollae bifidus.

~~cuneifolius L. foliis cuneiformibus emarginatis alternis~~

~~rupestris~~

Habitat ad isthmum et ad freta maris solo arenoso
Seylonis Rony. 5

frutax. Rami glabri et caepe foliorum ciliatis tuberculatis
lati superne compressi inferne teretes. Folium
sparsa in petiolum attenuata coriacea glabra
et ^{alternis sessilibus} ~~egrimis~~ ^{arvensis} ~~erectis~~. Pedunculi axillares
fructus calycis lobatis compressis mar-
gine tenuiore unguiculatis
Habitus Loranthi. pentadru monozyna