


Loranthus

Loranthus flexuosus
vastator hortonum Presl.



Loranthus
obovatus

5 6 7 ^{peniculus 2}
Semi-floris Loranthus foliis ³ ovatis petiolatis, ² floribus axillaribus brevissimis
sub-floris.

Habitat in Guinea ^{part 5.}

^{superne nuda videntur}
Rami teretes, ut ^{superne nuda videntur} tota planta glabri. Folia petiolata, opposita, tri-pollicarica,
obtusiuscula, arena, vix nervosa, integerrima. Pedunculi brevissimi
bi- & triflori: pedicelli pedunculo vix longiores. Flores sesqui-pollicares,
tenues, versus lumbum crassiores: laciniis limbi 6. lineares. # Palyx mini-
mus, integerrimus. Bractea inseta, ovata.

angustissima
sesqui-pollicares

umbellatus Loranthus foliis ⁶ subsessilibus cordato ovatis, umbellis axillari-
bus ⁷ solitariis ⁴ pedunculatis, floribus ⁴ pentandris ⁹
Habitat in variis arboribus Guineae Theriacis ²

Stamiferatus, debilis, ramosi. Folia opposita, 1-4 polliciana
vix venosa, crassa, obtusa. Pediculi vix unguiculares. Flores
p-12. brevissime pedicellati. Calyx obscure sive crenatus. Corolla
sex qui polliciana, purpurea. Tubus superne et inferne sensim angu-
statur, pentagonus, basi ventricosus. Laciniae quinque partitae; lacinae
lineari. Stamina quinque. Stigma coeruleo

~~Parvosa hirsuta, viscosa~~ formis palibus 3
hirsuta Cassia foliis bipinnatis ovatis, petioli glandulosi, ramis axillaribus, caule
leguminibusque hirsutis.

~~Habitat in Guinea~~ Spert F 27

~~Radix simplex~~ ^{radix} Caule ^{hirsutus} fruticulosus, ramosus, teres, striatus, uti ^{tota planta} petioli et pedunculati hirsuto
viscosus. foliolo petiolato, semi-pollicaria, ovato-subrotunda, parum
acuminata, retusa, exteriora majora. Stipula pubulata. Racemi longi
tudine foliorum. Flores nutantes. Calycis iniani. Legumen linea
ria, compressa, multicoronata. Stamina 5.

~~glandula subulata~~
~~obsoleta~~ ~~incompleta~~
~~inter par inferum~~
~~petala obovata~~

variet corollis sanguineis et floris

obovatus Loranthus racemis simplicibus axillaribus foliis brevioribus; foliis obovatis sub
acuminatis.

Habitat in Montserrat dñ Ryan &

Rami alternatim compressi subanicipites; ~~folia~~ ^{petala} antheri glabri; sub foliis dila-

lata
Folia subsessilia, opposita, pollicaria, pollicem fere lata, acumine brevi
terminata, interdum subretusa, obscure venosa

Racemi axillares; foliis duplo breviores. Peduncululi angulati. pedicelli
oppositi, breves, uniflori, septem

Cal. duplex: exterior monophyllus; trifidus; laciniis ovatis: interior uncinata
sui integerrimus.

Corolla monopetala ~~lobata~~: petalis lineari lanceola

Stamina filamenta fere nulla: Anthera in medio petalorum sessiles

Pistillum germen oblongum. Stylus teres. Stigma obtusum.

Pericarpium drupa oblonga. Nux ~~loc~~ loc angulata monosperma
a n loc: emarginatus h.

a) flos magnit. naturali b) acutus c) calyx exterior. d) interior cum corolla.

e) petalum cum anthera f) Pistillum g) drupa h) eadem transversim
facta i) semen

biflorus Loranthus foliis petiolatis oppositi alternisque lanceolatis acuminatis, racemosis simplicibus; pedicellis bifloris, floribus sessilibus

Habitat in America ^{Meridionale} ~~Meridionale~~ L. v. Rohr;

Rami glabri, tetragoni, inferne cortice adhaerente, superne ^{foliis} glabrescentes, compressi
Folia petiolata, plerumque opposita, nonnulla alterna, bipollicaria vel ultra, ^{copiosius} lanceolata, attenuata, vel rarius subobovata, acuminata; utraque acuta, asencia, enervia.

Petioles unguiculares.

Pedunculi axillares, pollicares. Pedicelli oppositi, quatuor, singuli biflori;
flores sessiles femininiquiculares

Corolla bipartita: laciniis linearibus, obovatis, angustifimis

Stamentum in medio singuli laciniis corollae insertum.

Stylus unicus

(an eadem a L. sessili laequino diversus? differt foliis et numero florum in pedicellis)



Loranthus
americanus

Americanus Loranthus foliis lanceolato-falcatis ovatisque, cymis terminalibus
trichotomis fastigiatis.

Loranthus americanus racemis subramosis aequalibus, foliis ovatis Lin.
Syst. veg. pag.

Habitat in insula Trinitatis de Ryan &

Rami crassitie penno cyneo, obscure tetragoni, cortice cinereo; ultimi
oppositi; ultimi ad folia alternatim compressi, fusci, al' cinereo
maculati.

Folia sessilia, opposita, bipollicaria et ultra, plus coriacea, integerrima,
5.7. nervia: nervi versus apicem evanescentes, plerumque
lato canaliculata, attenuata, utrinque acuta, altero margine
convexa, altero ⁱⁿ curva, rarius ovata oblonga, basi acuta, apice
obtusius emarginata.

Pedunculi terminalis, ⁱⁿ ramis oppositi solitarii in axillis
penultimis minus compositi; terminalis tres vel quatuor, laterales
triflori: inter medius crassior bifidus, pedunculo longulo
partiale trifloro. Flores pedicellati.

Calyx duplici: exterior campanulatus, truncatus, obscure crenulatus:
interior infundibuliformis, tenuissimus crenulatus.

Solia in figura Jacquinii differunt a mascula imperfectum a mascula imperfectum

Longifolia lobelia foliis lanceolatis elongatis serratis glabris, pedunculis axillaribus
unifloris. ^{martinica}

Habitat in Cayenna a. von Rohr &

Caulis herbaceus, tripedalis vel ultra, erectus, simplex, superne ramoso uno vel altero,
terres, striatis, glaber.

Folia petiolata, sparsa, ^{frequentia} semipedalia, fere semper sensim minoria, ^{utrinque} tenera, gla-
berrima, subtus parum pallidiora, venosa, tenuiter serrata; serraturis mi-
croscopis.

Pediculi

Pedunculi axillares superne, axillares, solitarii, bi s. tri pollicares, compressi, sin-
gulis, uniflori, versus medium bracteis duobus, oppositis, setaceis, unguicula-
ris, decurrentes.

Calycis laciniis subulatis, pollicaris, glabris, purpureis

Corolla purpurea, sesquipollicaris.

Stamen totumna pallida, corolla parum brevior: anthera coerulea,
purpureo lineata, apice albido lanata.

Capitula turbinata, unguiculari pallida, nervis nonnullis coloratis striata

Dubius *Coranthus*: foliis alternis reniformibus emarginatis racemi
axillaribus
Habitat ad 4 ft. hinc et ad freta maris solo arenoso Tundra orientalis
Folia longis
Rami teretes glabri ciliati tuberculati. Folia parva
bi pollicina concava avenia nervia basi attenuata
flesca. Racemi axillares solitarii foliis breviori. Calyx marginatus
5-que vel ~~6~~ ⁶ cuneatis petala 8 ^{stamina} ^{stamina} 5; vel 8 stylus
unicui. Germen oblongum basi acutum compressifidum marginatum
stylus calycis longior

alaternus R. ~~floribus~~ ^{divisi}, ^{stigmata} ^{triplici}, foliis ^{ternatis} ^{longis}

Trimeris Loanthus

Habitat herb. la Martini

Rami tetragoni, oppositi. Spica 2-3 adnata

villosa Lomatius.

Habitat parasitica in foliis *Reybona* Koenig.

habeo, Descripta quoque in Encyclop

Tetrapetalus Loranthus

Swst.

Habitat herb. Mus. 5

Rami teretes, glabri, purpurascetes, tuberculati post casum foliorum. Stipulae breviter
petiolatae, unguiculatae vel parum ultra, oblongae, obtusae, coriacea, enervatae, arenae.
Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, brevissimi. Petala linearia.

Clavatus Loranthus

Habitat in madagascariae Comme for herb. 4^{us}
Nomen Dichotomi, teretes, glabri, cinereo-punctati. Folia petiolata, pollicaria vel panem
ultra, oblonga, coriacea, avenia, enervi, obtusissima, basi acutiora, latens
subequalia. Pedunculi axillares et infra foliacei, aggregati, uniflori, pediceli
panem breves. Calyx tubulosus, brevis, subdentatus. Bractea ovata, brevis ad ba
sin calycis. Corolla pollicaris.

Sesplis Loranthus

Habitat in Guiana Richard. herb. Guss.

Rami glabri, apice bifide, compresso angulati. Traxoni e lineis decurrentibus, glabri.
Folia petiolata, opposita, semipollicaria oblonga, obtusiuscula, obscure nervosa,
avenia, subionacea. Petioli semiunguicularer. Spica axillares, solitane, sesplis
folio dimidio breviores.

Margaritatus Coranthus

Habitat in Brasilia Dombey herb. Gussf.

Rami teretes, superne compressi, ceteri reliqua partes glabri. Folia petiolata, alterna, pollicaria, ovata, suprema opposita, acuta, sube ovacea, venis fine obscure nervosa, supra nitida. Axemi axi claver, folio parum longiores, patentes: pedicelli oppositi, patentes, tri-
flori: Flores sespiter, semineque ulvosa. Bractea ovata, longitudine calycis. Calyx
brevis

Coranthus

Habitata Madagascor Commes. herb fur

Rami crispitie pennis anferno, glabri, teretes, cortice cinereo. Folia petiolata, oblonga,
pollicaria, ^{vel pinnule} opposita, obtusa, emarginata, basi acuta, coriacea, venia nervia. Pedun-
culi laterales ad axillulas, 5-7. brevissimi, uniflori. Flores pollicares

habes.

brasiliensis Loranthus

Habitat in Brasilia herb. Gusf.

Rami teretes, uti reliqua partes glabri, fraxsi, crassitie penna cygneae vel anserinae
tuberculato-cicatricati. Folia petiolata, alterna, bi- tri-pollicaria, opposita
oblonga, basi acuta, obtusa, venosa, submembranacea. Petiolus unguicularis.
Pedunculi axillares, solitarii, angulati, bifidi: pedicelli 3 flori. Flores subpe-
dicellati. Calyx urceolatus, truncatus, basi unctus calyculo. Corolla polli-
caris, angulata.

Conyi bracteatus Loranthus.

Habitat in Pene herb. Aust.

Rami teretes, rugosi, superne angulati. Folia petiolata, subopposita, pollicaria, oblanceolata, basi subovata, acuta, coriacea, aspera, enervi. Petioli brevissimi. Racemi superne, bipollicares: pedicelli uniflori. Bractea ad basin calycis, subsessilis, semipollicaris. Calyx campanulatus. Corolla bipollicaris, recta.

reflexus Loranthus

Habitat Capenno herb. Desfont.

Rami glabri, versus folia compressi in sculo, superne compressi, leviter fere
quasi tomentosi. Folia petiolata, opposita, bipollicaria, ovato-oblonga, alte
mutata, acuta, arena. Racemi axillares, inferne solitarii, superne
gemini, folia parum longiores: pedicelli suboppositi, brevissimi, triflori
Flores sessiles, Pedicelli fructiferi reflexi
eadem ac V. hodie in festo semus

reflexus *Leranthus*

Forster

Habitat herb. Musf.

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, sesquipolliciana, opposita, oblonga, membranacea, acuta, serrata, obtusa. Pedunculis axillaribus, sesquipollicaribus, petiolo longioribus. Flores in apice fasciculati, 6. 7. Petala angustissima.

Loranthus

Habitat in Brasilia Comerson Herb. mus.

Rami cortice cinereo, glabri. Folia petiolata, opposita, sesqui polliciana, ovata, coriacea, glabra. Racemi axillares, longitudine fere folii, solitarii. Bractea 3 fuplex in singulo pedicello, magnitudine pepeni

forte quod habeo et quod jam descript. ex herb. Mus.

nodosus *Loranthus*

Habitat in Pene herb. Aust.

Rami teretes, glabri, dichotomi, ad articulos nodosi, inferne crassitie penna Cygnae.
Folia ad dichotomias, petiolata, bi-tripollicaria, subrotunda, conacea, obscure
nervia, glabra. Petioli vix semipollicares. Peduncululi axillares, plures. Corolla
longissima.

horticola Loranthus

Habitat in Guiana Richard herb Guaf. horticola infestus

Rami teretes, glabri, cinereo-rufescentes, crispis pennis anfractuosis, alternis, apice
saepe ramuli 4-5. compressi. Folia petiolata, alterna, ultima opposita, 2-4 pollicaria,
lato oblonga, obtusa, squulata, obsolete venosa, coriacea. Petioli unguiculati
laevissimi. Spica axillares, solitarii vel gemini, folio brevioris, bipollicares. Flores
oppositi, utrinque plures.

Cucullans Loranthus foliis lato lanceolatis falcatis nervosis
bracteis cordatis basi cucullatis subinflor. La Mart. Four
Rat d'hist. nat. no 12. pag 445. Tab 23.

Habitat in Guiana

Fasciculi duo in pedunculo communi singuli inflori
bracteatus Act. soci. hist. nat. Paris. herb. Ruche

Taberna montana heterophylla, foliis elliptico-lanceolatis subundulatis acuminatis
utrinque glabris, ramis dichotomis, floribus racemosis.

Habitat in Cayenna von Rohr.

Rami teretes, glabri, dichotomi, laeves.

Folia opposita ad singulam dichotomiam et parvum inter dichoto-
mias, tri- vel quadrifollicaria, opposita basi, elliptica

tri- vel quadrifollicaria breviter petiolulata, elliptica, opposita
un- vel multo breviora, sessile, subcordata, vel structura alterius
basi modo parum altero latere breviora sessile; omnia ac-
uminata, ~~acuta~~, acumine semipollicari, acuta, e margine
parum reflexo et undulato obscure crenata, ^{remota} nervosa,
vix pallidiora.

1. Tetrapetalus Loranthus floribus axillaribus ^{subsolitariis} ~~geminis~~ tetrapetalis, foliis oblongis oppositis subsessilibus
Loranthus Tetrapetalus, floribus ad articulos quatuor verticillatis tetrapetalis,
foliis oblongis oppositis subsessilibus C. B. Suppl. pag 211. * B. V. pag. 343.
Loranthus Tetrapetalus: pedunculis unifloris subsolitariis, foliis ovatis obtusis
subsessilibus Torr. prodr. p. 25.

Habitat in Nova Zelandia.

glaber. Rami & caepula foliorum tuberculati, superne obtuse angulati. Folia
angularia anervia basi acuta, ^{breve} patentia. Flores pedunculati solitarii
vel gemini foliis longiores. Petala lanceolata superne patentia inferne in
tubo angusto subsistentia. Anthera 4. erecta, longitudine corollae. Stylus
antheris longior. Stigma obtusum stylo parum inaequor

Mudleydes L. foliis ovatis floribus congestis axillaribus quadrifido
calyce truncato fructibus turbinatis La Mark.

Habitat in India orientali 5

Spice Mudleya indica. Caulis teres ramosus, Rami juniores
leviter villosi. Folia opposita interdum elliptica, in
termina revosa, byollucaria, brevissime petiolata, supra
glabra subtus leviter villosa. Flores uti pedunculi
villosi. Bractea ovata. Calyx truncatus ^{revollos tubus} anisatus
parva. Stamina 4 La Mark

non vid.

~~Crifata 1. foliis angulatis inferioribus cordatis, superioribus par-
dunformibus, capsulis multilocularibus Lin. 1. 1.
Abutilon laxatens flore, fructu Crifato Dill. Elth. 3. 1. 2.
fig. 2.~~

~~Plukn. 1. 7. fig. 1.~~

β. ~~Ida foliis inferioribus cordato angulatis, superioribus
hastatis, petalis integerrimis Royen. Lugdb. 349.
Habitat in Mexico O~~

glaucescens L. ped. uncinatis axillaribus uni floris, foliis ovatis

9 Linné's Thunberg prodr.
9 Habitat in C. b. ppen.

namredi

2 Scumula coronatus pedunculis unifloris congestis foliis obovatis Lin. Spec. pl. pag. 972 +

J. V. pag. 349

Si seum vitice innascens Camell. lux. 3. n. 36 Pet. Gaz. t. 63. fig. 8.

Scumula Lin. Spec. pl. 1. pag. 110

Habitata in China

Trinax paraficius. Folia opposita, petiolata, ovata, integerrima, glabra, altero latere paulo latiora. Flores axillares, 3-6. propriis pedicellis. Germena inferne attenuata Lin.

coniacus ^{oblongis} ^{oppositi alternis que}
Cor. foliis ovalibus obtusis, floribus axillaribus pedicellatis
aggregatis pentandris
An 44: Carni Rheed. Mal. T. p. 55. Y. 29. ?

Glutinae Commersonii

Loranthus coniacus pentander, foliis ovalibus oblongis
si vltis subsessilibus floribus adaxillaribus racemosis.
Capitatae La Mark. Diet. Enc.

Habitat in India orientali. 5

Rami punctati punctis prope elevatis, glabri fere
folia breviter petiolata coriacea basi parum attenuata
obsoleta trinervia bipollucana. pedunculi axillares
res 3-4. berrispmi

clavatus L. foliis cratis obtusis, flombus congestis lateralibus
subsplebis longe tubulosis Ha Mark
Habitat in Madagascari

Caulis teres ramosus fere dichotomus, cortice cinerofescente
foliis opposita glabra anerviis, subtus nupescenti. vix
voluceri, margine parum reflexo bipolliciana. floris
axillari vel laterali brevissime pedunculati subsple
sciculati. Palya dentibus sive brevissimis. Corolla
lesqui polliciani angusta tubulosa superne clavata
Stamina sive Ha Mark

non vid.

3 uniflorus Loranthus racemis ^{simplex} unifloris simplicibus, pedicellis unifloris Lin Spec. pl. pag
1672. Jacq. Amer. 10. t. 69.

Habitat in America;

Rami cortice cinereo, ^{inferne} ~~inferne~~ ^{superne} ~~superne~~ ^{acuta} ~~acuta~~ quadrangulari, ad folia
delata. ^{ut in floribus simplicibus} Folia petiolato ^{opposita}, ovata, pollicaria, nervis arenis
micronis terminata. ~~Ca~~ subtus caninata. Petiolus brevis ⁱⁿ ~~in~~ ^{angustis} ~~angustis~~
racemi axillari ^{oppositi} ~~oppositi~~ ^{angustis} ~~angustis~~, pedicelli compressi. Flores
oppositi solitarii. Corolla parva. ^{Stamina} ~~Stamina~~ ^{magnitudine} ~~magnitudine~~ ^{pese} ~~pese~~ ^{majoris} ~~majoris~~

non vid.

41 Europaei Loranthus racemos simplicibus & terminalibus, floribus dioicis Lin. Spec. pl. pag.
1672* Paquet. Vind. 230. & Lin. L. V. Gerd. fl. austr. t. 30. S. V. pag. 343

Habitat in Austria, Italia quercubus,

Rami teretes, oppositi, ad folia dilatati, fusci cortice fuso. Folia ^{opposita} petiolata
vel ^{alternata} ovalia pollicaria, quinquenervia. Gemma axillares. Racemi bypolle-
cares parum flexuosi. Flores brevissime pedicellati oppositi, solitarii. Bacca
flavescens

adda Lor biflorus

margynatus L. foliis ovatis subaruncatis margine sicuti
racemis foliatis axillaribus, pedicellis 3 floris La
mark.

Habitat in Brasilia 3

glaber. Rami teretes subtilissime striati. Solia petiolo
sa interdum subalterna plerumque opposita, bipolli
cana, margine ferruginea subpellucida. Racemi folio
brennes, pedicelli oppositi patentes breves apice tri
florifloribus sesquialibus. Calyx superior obscure denticu
latus ad apicem basi squama. Corolla utraque
2. lingua. Stamina 6. La Mark

non vid.

Lespedeza L. micromis foliatis simplicibus, floribus. Vernus.
Lespedeza Gouan. Am. p. 99

Habita in America

non red

15 ^{fannopus} ~~Pentandrus~~ *Loranthus racemis simplicibus, floribus quinquefidis, foliis alternis petiolatis* ^{pulverulentis, oppositis que}
~~Lin. Moest. 63. N. 1. V. pag. 377~~

Habitat in Tordia

Tortex ramis ad folia dilatatis. Folia alterna petiolata, ^{pubescentia, obtusa} ~~trinerviâ~~ ^{sinuata} ~~sejura~~
Lauri. Racemi axillares, solitarii s. bini, petioli paulo longiores. Corolla semi
quinquefida. Filamenta 5 a medio lacinarum corollae, antheris brevioribus. Anthe
re erectae, longitudine corollae ~~lin. m. l. e.~~

Pedicelli breves patentes, 13 rachae ovatae, concavae. Calyx est pediculi, pulverulento
cinerei. Corolla semiquinquefida, laciniis linearibus, acutis, reflexis. Filamenta
5que in medio lacinarum, Antheris brevioribus. Antherae filiformes, erectae longi
tudine corollae. Stylus filamentis parum longior. Stigma capitatum

*Loranthus fannopus pentandrus foliis ovato-oblongis, racemis
fannopi axillaribus, corollis tubulosis - ventricosis, apice
reflexis la Martk Enc.*

~~elliptica~~
pentandris

Coranthus foliis oppositis alternisque ^{sesquipedibus} ~~superlati~~, racemis simplicibus floribus
pentandris glabris

Cor. pentandris foliis alternis, petiolatis, basi simplicibus, floribus quinquefoliis
dis. Mart. pag. 63. S. N. pag. 44

Habitat in Andia

Corax superius rugosus subrimosis. Rami a caulibus ramorum ad folia dilatata

Folia alterna vel opposita, elliptica ^{obtusata} apice ~~obtusata~~ basi angustata in petio

in petiolo
folia subtus subnervosa
versus non enim
in axilla ipsa
sed parum vltimis
latera

~~cum brevissimum ut potius sessile dicitur~~ ^{invenitur}, coratca integerrima, glabra
avenia, subnervia facie laevi bipol sesquipollicares. Racemi axillares
simplicis foliaria pedicellato unguis eulan. floris conferti sive brevis sive
pedicellati. Corolla quinquefida laciniis lineariibus apice dilatatis fila
menta longitudine laciniarum sive. anthera lineares filamentis longiori
tu Congoni &

Coranthus ^{pentandris} foliis alternis petiolatis racemis simplicibus
~~pentandris~~ racemis simplicibus, fl
bus floribus sive fide Lin Mart. pag. 63.

Longiflorus Lor. ~~colla tubo elongat. superne inermis~~

foliis ovato oblongis, racemis axillaribus florum
tubo elongato clavato pentandris.

Coranthus Longiflorus pentandris corolla tubo prologo
superne inermis, laciniis brevibus apice reflexis
^{La Mart.}
Soll. illi. - Can. Rheed Mal. 16. p. 5 tab 4.

Habitat in India orientali

glaber. Caulis teres. Folia opposita, petiolata
bipollicaria. Pedunculi axillares ternales
flori 12-20 in racemis, bipollicares rubri
Cor. inaequaliter speda, parvis curvata inferne
angustissima. Calyx superior truncatus La Mart.

clastrius L. foliis sessilibus ovatis acutis nervosis, corollae
junctionibus medio fenestratis ^{pentagonis} La Mark.
Velutia - ibi - Cann. Rheid. M. 16. p. 7. t. 3
Habitat in Malabara

non vid.

5 pedunculatus. Coranthus racemis simplicibus pedicellis trifloris, foliis ovatis acutis
Coranthus pedunculatus: racemis simplicibus solitatis. floribus ternis
pedunculatis Jacq. Rarp. sel. pag 1247

Habitat Carthago 5

Rami teretes cortice ferrugineo. Folia brevissime petiolata, ^{opposita} ~~resorbata~~
venosa, subcordata, bipollicaria, Racemi oppositi plerumque
solitarii foliis breviores. Pedunculus angulatus. pedicelli maturo
fructu reflecti.

quomodo differt ab oleo dentali

6 Coecineus Loranthus racemi simplicibus, floribus quinquefidi longis semis glabris, foliis
^{oppositis} inferioribus lanceolato ellipticis superioribus oblongis.

Habitat in India Orientali Konij;

Rami teretes ad folia dilatata. Folia brevissime petiolata ^{opposita} oblique
nervosa, acuta, ^{margine subciliolata} inferiora lato-lanceolata quadrivel 5 polli-
cari superiora, intermedia ovato-lanceolata, ~~f~~ breviora,
superiora oblonga, latiora. Racemi axillares oppositi
vel alterni bipollicares. Pedicelli sparsi, plures apice
ad basin floris bractea concava. Calyx ^{integro} truncatus, integer
rimis. Corolla ^{lobigata} sesqui pollicaris, ^{coecineus} ante evolutionem clavatus
apice pentagonus, ~~co~~ Stamina filamenta s' brevissima super
ne anthera longitudine ^{pa} laciniarum. Stylus filiformis
longitudine corollae. Stigma ^{var} lineare incrassatum.
Accedit ad americanam et racemi simplicis. variat foliis superio-
ribus latioribus et angustioribus.

Coremeus Loranthi foliis inferioribus ellipticis lanceolato ellip

Indicus

L. foliis ovato-oblongis obtusifoliis racemis elongatis
simplicibus axillaribus, fructibus ovato-cylindricis La Mart
Lonicera reylanica Gort. de fruct. p. 132. tab. 27.?

Habitat in India orientali

glaber. folia subopposita, petiolata fere ovata, plerumque
efformia coracica nervosa tripolliciana, pollicem fere longa.
Racemi $2\frac{1}{2}$ pollicis longi floris paucis, bacis oblongis La
Mart

borbonica *Plathura* Desf: gen. p. 206

Habitat in Insula Borbone

arbuscula ramis nodis inde Bors casant. flores corymbosi
terminales affinis *Enthali*.

7 *Falcatus* *loranthus* racemis paucifloris axillaribus, foliis linearibus obtusis lateraliter
falcatis glaucis. Lin. Suppl. pag. 211* L.V. pag. 344.

Habitat in Madagasc.

Folia margine deorsum vergente falcata, integerrima, arena, cana. Racemi axilla-
res pauciflori. Flores falcati; fulvi. Lin.

non vid.

occidentalis coranthus racemis simplicibus, floribus irregularibus Loe. A. 187. * Lin Am

Acad. 5. p. 396 * 30 * S. V. pag. 343

~~Sambucus~~ parasitica, foliis majoribus subrotundis, spicis florum simplicibus alari

bus Braun. Jam. 197.

Viscum lecticonibus et subrotundis foliis, flore purpureo Sloan. Hort. 2 p. 92. t. 200

fig. 2. Raj. Dendr. 52. ?

Habitat in America arboribus

Statura 1. Americani. Rami divaricati. Folia ovata. Spicis oppositis, late
vales simplicibus Lin.

foliis obovatis mucronatis

rescript. quora inter amar

9 *emarginatus* Loranthus racemis axillaribus simplicibus, foliis cuneatis ovatis emarginatis
Schw. prod. p. 58.
Habitat in Hispaniola

non vid.

florescentibus. Coranthus ramis oppositis patentissimis simplicibus quadrin-
gulatis foliis oblongo-oratis obtusissimis brevibus in omnibus
axillis solitariis simplicibus Act. Soc. h. n. Par. 1. pag. 107.
Habitat in America merid.

non vid.

longibracteatus L. foliis lanceolatis enerviis subsessilibus.
spicis ^{La man} terminalibus, bracteis floriferis floribus 5 andris
Habitat in Peni 7

glaber. Caulis ramosis teres. Folia prostrata, interdum ovato-lanceolata acuta subsessilia coriacea enervia 1-2 polliciana. Spicis terminalibus. Bractea structura foliorum limbo lanceolata. Calyx fere dentatus. Cor. 2 1/2 polliciani superne clavatus, 5 fidus laciniis reflexo in bractea sessilibus. La man.

non vidi

trichotomus L. foliis lanceolatis oblongis utrinque acutis oppositis
nerviis axillaribus brevissimis.

Habitat in Bengala

Stem teretes glabri, subtrichotomi. Folia petiolata
3-4 pollicaria supra obsolete venosa. petioli ungui-
cularis. ^{nerviis} axillares oppositi; terminales gemi
ni unguiculari. floris breviter 7. oppositi
unguiculari

Spicatus *Loranthus* *speciosus* quadrangularibus Lin. Mant. 63. * l. v. p. 344 Jacq.
hes. 97. t. 60.

Habitat Carthagensis; parasiticus
Folia opposita, obtusa, nervosa

ciliaris Homanthus

no paucifloris coranthis pedunculis foliis brevioribus, foliis obovatis Schw. prodr. pag. 58.
Habitat in Jamaica.

an mea Sw.

Rami tetragoni cortice usque glabri folia petiolata opposita
peltata basi acuta, mucrone minuto terminata. Racemi axillares,
oppositi unguiculares 5-7 flori parvi fructus oblongus

brasiliensis L. foliis lanceolato-ovatis, corollis ante florescentiam
tubulosis rectis clavatis demum 6 petala. La Mart.

Habitat in Brasiliis &
glaber. Rami floriferi teretes. Folia petiolata, facie
ovata cuneata tomentosa, alterna, rarius opposita, supra
lucida, tripollicaria vel parum ultra. Flores in apice
ramorum in pedunculis bis ternatis ramosis. Calyx superior
obscure dentatus. Corolla fere pollicari ante floren-
tia apice subclavata. Petala linearia superne
parum dilatata. Stamina 6 La Mart.

non vid.

10 Americanus coranthus racemosus subramosis aequalibus, foliis ovatis Lin. Am. Acad.
S. p. 396. * S. V. pag. 343.

Coranthus racemosus flore corceino, bacis nigris Vaill. act. Panf. VII. 2. p. 174.

Conium flore corceino, bacis nigris Plum. gen. 17. c. 166. fig. 1. Sup.

Coranthus americanus cymis ramosis Jacq. Amer. 97. t. 67. Pl. filic. pag.

122.

Habitat in sylvis montosis Martinico &c.

Folia petiolata, opposita, aserna nitida, plerumque promorsa & difformia.

Corymbi ramosi inaequales, axillares & terminales: ramusculi ultimi
sopites triflori. Flores numerosi, corceini, sesqui pollicares, penduli.

Corolla inferne hexagona incurva ^{vel oblonga} glabra venosa subsalicata

folia petiolata, ovato-oblonga, obtusa, altero margine convexa, altero
nervi ^{longi} ^{pubescentissimi} ^{rectiora}, bis ^{f.} 3 pollicaria. Pedunculi superne, & retrotoni herb. Surin.

adde ~~clavatus~~ ~~corymbosus~~ scalprobitis

nodosus L. foliis ovato rotundatis, pedunculis axillaribus fasciculatis, corolla
tubo congestis articulis nodosis Lamour. Enc.

Habitat in Lem. 4

Caulis teres ad articulos nodosus, ceteris caulis. Ramis dichotomis.

Folia petiolata, opposita, coriacea, glabra 3-4 pollicaria, 7
nervi. Petioli breves. Pedunculi axillares et divaricati
longitudine petiolorum. Calyx truncatus. Corolla tubo 3 polli-
cari, bifida. Lamour.

non vid.

Cochinchinensis: Coranthus foliis ovato lanceolatis oppositis reflexis, pedunculis
multifloris congestis

Coranthus cochinchinensis pedunculis polyfloris congestis, foliis acutis
obtusis longifloris Cochinchinae pag. 145

Panpitica in ramis arborum hostiosum Cochinchinae. 5

Caulis botulosus, brevis, ramosissimus. Folia integerrima, densa
glabra, incurva: peduncali axillares. flori vixidi lutei.

Panarth. caperum 3 phyllis. Cor. 1 petala tubo amplo hexago
no, lobis profunde 6 partibus, laciniis lanceolatis - lineatis.

Bacca luteo rubra

non vido

Fetida *Loranthus vociferi trichotomi*, pedunculis trigonis, floribus aequalibus (An. S. V. pag. 394)

Loef. A. 104.

Habitat in *Pumano* arboribus, ^{nova Zelandia} opposita, ramis alternis,

Rami teretes, folia petiolata, oblonga, obtusa. Sesquipollicaria venosa. Pedunculi axillares apice trifidi, pedicelli flores tres sessile gerentes intermedii sex flori. Calice pollicares ante emphysem quinqueangulati, angulis acutis interjecto sulco profundo.

Loranthus reflexus Forst.

Rami teretes uti relique partes glabri, superne compresso angulati.
Folia petiolata inferum interdum alterna, superiorum opposita obovato pollicaria basi acuta, coriacea, avenia, anervia. Pedunculi axillares 3-4 dichotomi (non trichotomi) sesquipollicares longitudine foliorum

17 corymbosa ~~Conocera~~ Corymbis terminalibus foliis ovatis acutis L. S. V. p. 277.

Periclymenum foliis acutis, floribus profunde dissectis Sewall. Penw. 2. p. 760

f. 45.

Habitat in Pen. 4

Corymbosus ~~Loxanthus~~ foliis ovatis acutis, corymbis terminalibus, corollis
tubulosis 4-fidis Tetrandris Ca. Mark.

13 *parvifolius* *Coranthus pedunculatus axillaris infidis, pedicellis unifloris, foliis ovatis integris.*

Schw. prodr. p. 58.

Habitat in Jamaica

non red.