

Lobus

filiformis Synonym^{us} Beng. fl. Capensis Coronarium

Lotus

Lotus pentaphyllus minor glaber, foliis terminalibus. Venisibus et angustibus Hort. Edinb.

Habitat herb. Lusj.

Caules plures, prostrati, glabri, uti tota planta. Soliola linearis lanice
lata, utrinque acuta, semiovata, interdum subincurvata in eadem
planta. Pedunculi 1-2-3 flori

cernuus Lotus villosus, folioli linearibus racemis erectis elongatis; Leguminibus
compressis arcuatis villosis pendulis

Lotus africana annua hispida floribus luteis Commel. hort. p. 163.

Habitata in Africa herb. Mus. ~~in~~ ~~est~~ Mus.

Caulis fruticosus & ramifusus. Rami teretes, teneres, villosi. Folia petiolata, vix
angustulana, supra glabra, subtus villosa, linearis-cuneata, obtusa. Stipula
ovata, acuta. Racemi oppositi foliis, & equi palmares, multiflori. Flores
parvi, cernui. Bractea lineares. Legumina pelliciana, 6 sperma ad
semena subtrilosa.

microphyllus Lotus, pedunculis bifloris, leguminibus teretibus & lubris, foliis linearibus
sesquialteris

Habitat in Canario herb. Desfon

Caulis plures, tenues, canescentes, striatissimi, ramosi, diffusus. Rami filiformes.
Folia sessilibus, semicircularia, obtusiuscula, canescentia. Pedunculi axillares,
bipollicares. Flores magnitudine loti corniculati, 1-2 per folium cum
folio simpliciter, lineari. Calyx vel sepalum. Legumen loti angustissimi

tomentosus Lohri

Herbatat herb. La Mark

Trinervis, tomentosus, minime nitidus.
Eulana. Stipula subcordata.

Folia frequentia.

Folia obovata, crassa, semineque

brevisiliqua Lotus villosa puberula, legumi rubis Ternati fructis, caule erecto herbaceo,
foliis cuneatis

Lotus orientalis hirsutissima, filiqua brevi Vaillant.

Habitat in Oriente herb. Vaillantii

Caules latti, virgati, et tota planta villosa hirsuta, teretes, erecti. Folia
petiolata, semipollicaria, remota. Stipula subcordata. Pedunculi foliis lon-
giores. Legumina tripollicaria, glabra. Bractea oblonga

Lolus

Lolus græca, maritima, foliis glaucis et veltis argenteis Tournef. Cor. pag. 27

Habitat in littoribus maritimis græcia herb. Tournef

Caules herbacei, plures, prostrati, ramosi

herb.

Lobus

Habitat in oriente herb. Tournef.

Caulis fruticosus, erectus, ramosus. Rami villosi. Racemi terminalis,
spithamæ.

Atlas no 1

maritimus L. Leguminibus solitanis membranaceo quadrangulis, foliis glabris,
bracteis lanceolatis fl. ju. n. 6764 fl. Dan. Tab 800

Lotus tetragonolobus Barth. act. 2. p. 346.

Lotus filiquosa Lutea, filiquis pinnatis striationibus et longioribus
Prax. bot. 9 67.

Habitat in Europa maritima 4

^{decumbentes}
Caulis ramosi vix pilosi.

Folia petiolata: foliola sessilia. Catena
catenarum internodiis fere falcata, inter medium obovatum, glauco-
viridia unguiculata, subaequalia, cuspidata. Apud vata.

Pedunculifolia multoties longior. Bractea folia verna sive

tura foliolorum ad basin calycis Calyx pilosissimus.

2 *Ptelepogon* L. Leguminibus solitariis membranaceo quadrangulis, caulibus proxi-
mentibus, foliis subtus pubescentibus L. Sp. pl. p. 10094 Calyc. fl. austr.
4. 4. 361.

Lotus pratensis *Ptelepogon* Luteus Baud. pin. 332.

Habitat in Europa australiori pratis subhumidis &
Caulis ramosus, vix pilosus. Folia petiolata: foliolo sessile lateraliter ^{glauco, media}
exteriori falcata, intermedium obovatum unguiculata sublonga
lia fere crassiuscula. Stipula ovata. Radiculi axillares solita
rii folio multoties longior. Bractea ternata ad basin calycis
folioli figura foliorum. Calyx pilosus ^{glaucus}

a priori vix diversus nisi quod lutescens in mea bractea tantum
monophylla an semper & si constanter haec nota addit facili
negotio a mantimo distinguere potest

culta

3 Tetragonolobus L. Leguminibus solitariis membranaceo-quadrangulis, bracteis
ovatis L. S.V

Lotus ruber, filiqua angulosa Bauh. pin. 332

Lotus pulcherrima Tetragonolobus Com. bot. 91. v. 26.

Habitat in Sicilia et Barbaria O

Caules plures prostrati sulcati hirsuti inferne ramosi.

Folia petiolata: foliola oblongata, vix ramulibus adpresso
firmulque in frontaneo punctis minutissimis oculo armato
videndis, juniora hirsutiora. Stipula lata obtusa. Bractea

triphylla. Calycis hirsuti laciniis lanceolatis nervosi.
Legumen bipe tripolliciare.

tetragonolobus L. L. ——— subfoliariis membranaceo quadrangulis
angulis crispis stipulis ovatis obtusis

lata truncati
frontane variet floribus solitariis, geminis et ternis an hoc potius conspi
gatus cum puncta evidentiora, in foliis an specie diversa

4 conjugatus L. Leguminibus conjugatis membranaceo-quadrangulis, bracteis
oblongo-ovatis L. Spec. pl. p. 10904

Lotus luteus siliqua angulosa Boeck. Lugdb. 2. p. 37.

Habitat Mospelii ☉

Diversa a precedente apparet quam vi nota esse creditur.

convenit habitu, foliis ^{mutisque foliolis} hirsutis. Differre videtur floribus
et leguminibus minoribus floribus alutis coloratis. Alia legu-
minum minus crispis brevioribus angustioribus stipulis angustioribus

Lotus montana siliqua lutea foliis pinguibus glabris Magn. bot. Mosp.

conjugatis L. Leguminibus conjugatis membranaceo quadrangulis alis planis
stipulis ovatis acutis

Legumina bipollitana
spontanea.

6 *Tetraphyllus* L. Leguminibus solitaniis, foliis ternatis obcordato-cuneatis,
Styula solitana simili, bracteis monophyllis Lin. l. v. p. 691 +
Suppl. p. 340 +

Habitat in majora. 4

Caulis plures palmari, decumbentes filiformes; herbacei demum
adscendentes glabri. Folio petiolata foliola cuneata subre-
ctata parva aequalia. Corolla - *Styula solitana* nec parva
folioli brevior, canaliculato oblongo. Pedunculis e summi-
tate tripollicari. Corolla lutea reticulo venis purpureis

5. *Edulis* L. Leguminibus subspontanis gibbis in curvis Spec. pl. p. 1090x

Coron:

4c. 2 - p. 44

tab. 157

Trifolium corniculatum creticum alp. extol. v. 268

Lotus pentaphyllus filiqua cornuta Bauh. pin 332.

Lotus oligoceros cretica lutea, filiquis binis curvis prope
dentibus Monf. hist. 2. p. 176. f. 2. t. 10. fig. 5.

Habitat in Italia Sicilia, Creta

Caulis plures pedales ^{vel procumbentes} scumbentes, caetero simpliciter vel ramoso uno
altissime superne pilosi. Folia petiolata. Foliola obovata

unquiculana, aequalia, glabra, superne subtullosissime serrata

Stipula lata ovata ^{superiora acuta} fere unquiculares. Peduncululi laterales
pilosi, bipollicares. folium vernatum ^{sub basi calycis} foliola oblonga

lucina calycis subulato hispida. Corolla lutea. Carana apice
rotata legumen cylindricum parum curvatum glabrum

Inont

7 Neida C. Leguminibus penatis fructis & arboribus mutantibus

Habitat

Allemi

a peregrino cum peregrino in omnibus convenit nisi quod Legumina
Tertia

⊙ peregrinus L. Leguminibus sublinatis lineamentis compressis nutantibus
lin. L. V.

Lotus plegius geminis, peregrina Boeckh. Leydb. 2. p. 30.

Habitat in Europa australi

Caules
Saepe loti ornithopodioidis pubescens uti folia, pro decumbentibus
pedalis teretes. Legumina duo recta bipollicaria. ^{glabr.} Calycis
pilosisiuli

percy. Leguminibus linatis lineamentis compressis, bractea florali
triphylla

uniflorum T

9 glaucus h. Leguminibus subbinatis cylindricis glabris, folioli subcuneiformi-
bus carnosis uncinatis, stipulis foliiformibus Hort. Kew. 3. p. 92.
Habitat in Madera δ

non vidi Character hujus uti et plurimum hujus generis emendando

10 angustifolius L. Leguminibus subternatis linearibus strictis erectis, caule erecto,
pedunculis alternis Lin. S. V.

Lotus pentaphyllus minor hirsutus, filiqua angustifolia Bauh. pin. 332

Lotus corniculata, filiqua singularibus binis, Venus. Bauh. hist. 2.
p. 356.

Habitat in G. narbonensi sub Fournes

~~Sectus loti ornithopodi~~

caules teretes ramosi ^{rami pilosi} erecti stipuli ^{foliola lanceolata}
pilosa. Ped. minorum quam in peregrinis. Pedunculis est ali
fere omnibus. pedes folio quadruplo longiores. Pedicelli
gemini vel tres. Calycis pilosi flos. Legumina gla
brata valde acuminata. Legumina unguicularia glabra
tertia

angustifolius Leguminibus subternatis ^{ternatis} teretibus, bractea florali monophylla
calycibus hirsutis

Europaei Ulex Lin. S. V.

Pl. Dan. Tab. 60 P.

~~Genista spinosa Dod. pempt. 659~~

~~Genista spinosa major, longioribus aculeis Bauh. pin. 394.~~

~~B. Genista spinosa major, brevioribus aculeis Bauh. pin. 394.~~

~~Habitat in Anglia, Gallia, Brabantia &c.~~

17 Olyoceras L. Leguminibus subbinatis teretibus rectis stratis villosis, caulebus
adscendentibus ~~erectis~~ ^{erectis} folioli villosis
Lotus olyoceras Leguminibus binatis teretibus rectis stri-
tis villosis albo-punctatis Scop. enf. 1. p. 14. Tab. 6.

Habita

Caules plures teretes, erecto adscendentia, simplicissima
superne pubescentia. Foliola ovata villosa lanifera.
Stipula ovata obtusa. Calycis triflori terni vel gemini solum
ternitiam sub floribus. Legumina in massa glabra

12 ornithopodioides L. Leguminibus subternatis arcuatis compressis, caulis
diffusi. Lin. Spei: pl. pag. 1091. Cavan. i. 2. p. 40. Tab. 169

Locus peculiaris filiquosus Cam. hort. 91. t. 25

Locus filiquis ornithopodii Bauh. pin. 332.

Habitat in Sicilia & ser

Caules plures decumbentes ~~diffusi~~ ^{acutis-aequalibus} pubescentes. Soliola obovata
vel unguiculata villosa. Stipula lato ovata acuta supra pedun-
culi laterales velis apicem folii parum longioris. Flores tres
vel 5. Calycis pubescentes laciniis subulatis. Bractea vernata sub
floribus. Legumina glabra reflexa sesqui pollicar
foliis caulibusque villosis etiam inventur

Locus pentaphyllis filiquis retrois pedes corvinos reflexos

Trifolium aciculatum creticum Prosp. alp. Ea. 260

herb. Mus. hinc pedunculata videntur nisi quod folia uti tota plant
Vall. Mus. hinc mea

Spontanea

17 *Crotium* L. Leguminibus subternatis, caule ^{pub} frutescente, foliis pinnatis ^{nitid}
Dis lin Spec: pl. p. 109/4. *Caran.* c. 2. p. 44. Tab 156

Lotus argentea crotia Plukn. alm. 226. t. 43. fig. 1.

Lotus polyeratos fruticosa crotia argentea, siliquis longissimis prope
dentibus *fructu* Mon. bot. 2. p. 177.

Habitat in Syria, cetera, Hispania &

Fruticulus palraani ramosis totus senes nitens. Rami teretes. Folia copio
sa sespilia: foliola lanceolata vix unguiculata acuta subaequalia
stipulae magnitudine et figura foliorum. Peduncululi laterales et termi
nales foliis duplo longioribus. Inflorescentia monophylla Anctura
foliolorum. Calycis lacina lanceolata, legumina oblonga cylindrica
calycis parum longiora glabra triperma.

senes nitidus
Crotium L. leg. -----
lanceolata

oblongis, caule -----

folia sespilia foliolis

fructu

14 *Tacobius* L. Leguminibus subternatis, caule herbaceo erecto, foliolis linearibus
Lin. S. V. p. 691 + Mill. Dict. 7. 168.

Locus angustifolia, flore luteo purpurascite, insula fr. Taciobi.

Comm. hort. 2. p. 165. V. 93.

Habitatio insula fr. Taciobi ?

Caulis teres ramosus, subpubescens. Folia petiolata: foliola breviter
petiolata linear-lanceolata fere bipollicaria vix villosa tenella
pubescens. Ripula magnitudine et figura foliorum. Pedunculis
foliis duplo longior, 5 floris. Bractea monophylla lanceolata floribus
longior ad basin pedicellorum. Calycis pubescens laciniis pubulatis
Corolla corol colore Antiocheni insula

(5) arabicus L. Leguminibus cylindricis arifatis, caulebus prostratis, pedunculis ^{pub} trifloris
nisi bracteis monophyllis Lin. Mant. 104. & P. V. p. 691. Jacq. hort. 2. v. 153.

Habitat in Arabia 4

Caules plures sesquipedales, prostrati. Vertices ^{apice} ~~remota~~ pubescentes. Folia subpeltata
cota: ^{remota} Soliola obovata unguiculata sessilia subequalia mucronata
& nullis parvis subnitens, culta glabriora. Stipula figura et magnitudi-
ne ferè psholoum. Pedunculi secundum totum caulem foliis triflo-
re quadruplo longiores 1-4 flori. Flores mutantes pallide nubescentes
^{proditæ} folium obovatum ad subpedicellis, monophylla. Legumina pollicia
na vel parum ultra cylindrica glabra mucronata.

Spontanea cultura parum mutatur nisi quod glabrior et folia parum latiora
evadunt

^{videtur}
an varietas? herb. Desfont. 70

Totus villosus facies omnino corniculati. Folia petiolata: foliola oblonga
obtusis, semipollicarum: lateralia altero latere angustiora. Stipula ovata, magni-
tudine foliorum, obtusa, basi acuta. Flores 3-5 cum folio ternato sessi-
li magnitudine et latitudine corniculati. Legumina teretia, glabra.

in herb. mus. sequ. varietates:

β majus villosius

γ majus glabrum

α herpetum majus

16 corniculatum L. capitulis depressis, caulis decumbentibus legumini-
bus cylindricis patentibus. An. Sp. pl. p. 1092 + fl. Dan. 7.

Trifolium corniculatum Dod. pempt. 573.

Lotus f. melilotus pentaphyllos minor glabra Bauh. pin. 332.

β. Lotus pentaphyllos, flore majore luteo splendente Bauh. pin. 332.

γ. tenuifolium Trifolium corniculatum frutescens, tenuissimis foliis Bauh. prod. 144.

Lotus pentaphyllos frutescens, tenuissimis glabris foliis Bauh. pin. 332.

Habitat in Europa 4

varietates 2. Legi ad montmorency satis notabili

alter prostratus in humidi folioli linearibus

alter in dumetis, caule bipedali folioli lati pilosi.

✓ varietatem hujus ad Efflai legit Forst. pilis longis hirsutis foli caule
filiiformi, calycibus quatuor folioli fere lanceolati.

descript. e specimen melilotis conficienda

Veri.

17 *Cystifolius* L. capitulis dimidiatis, caule diffuso ramosissimo, foliis tomentosis Lin. 1. V

Colus flequosa maritima lutea, *Cystifolii*. Barr. 12. 1031.

Habitat in maritimis Europa australis.

terre

Caules plures tenues decumbentes ramosi superne villosi uti petioli, folia et calycis, foliola basi ca. obovata anguste equalia. stipula ovata. capitula lateralia et terminalia 3-8 flori folium ternatum sub flombus.

107 *hirsutus* L. capituli subrotundis, caule erecto hirsuto, leguminibus ovatis lin

L.V.

Lotus pentaphyllos filiquosus villosus Bauh. pin. 372.

Lotus polydactylus frutescens incana alba, filiquis erectis crassioribus et
brevioribus rectis Mont. h. r. p. 177. f. 2. t. 10. fig. 14.

Habitat in G. Narbonensi, Italia, Oriente &

Caule uti folia et calyces hirti. Folia breviter petiolata.

Foliola sesipha oblonga, utrinque acuta unguiculata. Stipula
foliolorum structura, parva minima. Flores erectos octo breviter pedicellati

pedunculati ad
apicem folii
sani

si. Bractea monophylla foliolis
similis

hirsutus L. capituli
foliis oblongis acutis

Mont.

19 rectus L. capitulis subglobosis, caule erecto lavi leguminibus rectis glabris

Lin. S.V

Trifolium rectum monopetalum Bauh. hist. 2. p. 359.

Lotus pterygopus glaber, floe rotundo Bauh. pin. 332.

Lotus polyneatos pterygopus hispata alba major latifolia, pterygopus venibus

Curtis Mon. h. 2. p. 177. f. 2. t. 18. fig. 13.

Habitat in G. Narbonensi, Sicilia, Calabria &

caulis erectus, frutis oblique ramosis bipedalis. Rami pilosissimi
folia pinnolata. foliola pollicaria mucronata subtus cincta

pilosa lateralibus parvis minoribus stipulae per unguiculares lato

acuta. Pedunculi et atellis ultimis foliis parvis longioribus
copiosi parvi. calycis unius vellosi. Legumina glabra nitida

sub hoc nomine in herb. Guss. vid. caule filiformi, leguminibus pollicis

rectus L. ^{caulis filiformi, leguminibus pollicis}
^{obtus foliolis parvis pedunculis} caule erecto, foliolis obovatis stipulis
cordatis leguminibus cylindricis

Lotus gracilis L. capitulis subrotundis, caule erecto, foliis quinatis, leguminibus
ovatis *lin. Mart. 104. + F.V. p. 691.*

Lotus graeca *manthina*, foliis glaucis et veluti argenteo *Tournef. Cor. 27.*

Habitat in *Graecia* 4

Habit. secti. Caulis teres, striatus pubescens ramopis. Folcia petiolata, remota
foliola sex obovata ses sibia, mucronata, ^{glaucis v. viridia} ~~are~~ utroque pilis rari
bus adpressa sanguiculana lateralibus parvis minoribus. Sepala
magnitudine et figura foliolorum. Pedunculi axillares foliis
duplo longiores solitarii un. sex 16 flori. Calycis sulcosi sulci. Legumina
glabra calyce parvis longiora

gracilis L. capitulis ————— - foliis quinatis ternative bipulvis
que obovatis leguminibus ovatis

Mont.

21 *Dorycnium* L. capitulis aphyllis, foliis sesquialteris quinatis Hort. Cliff. 371 r
Dorycnium monopelienicum Lob. ii. 51.
Trifolium album angustifolium, floribus veluti in capitulum congestis
Bauh. pin. 329.

Habitat in Hispania, G. Narbonensi, Austria &
vel in montibus quinatis
ad plantam in Trophi
pertinet fer. herb. Mus.
Dorycnium orientale sesquialteris
latifolium villosius aequale. Stipula longitudine et sequuta foliolorum. Flores in
Tournes. Cor.
caulis erectus, uti folia
puberis et capitula glabris
fer. villosius. foliolorum
capitulo 5: 8 floro. folium vernatum ad basin capituli, deliduum
Stipula sequa foliorum
virescente
virescente

Aliam habeo, nescio unde, que in variis differet si caulibus ^{virescente}
glabris foliis remotissimis ^{foliolorum} lanceolatis glabris. Floribus ^{virescente} ^{capitulis}
nibus folium solitarium lanceolatum supra medium pedunculum
ei an specie diversa.

varietas ^{virescente}
Alia adhuc Trophi ^{virescente} foliis longioribus latioribus quam in praecedentibus
mont. nosis, pedunculis trifloris folio ^{virescente} serratis floribus quinatis
nominibus.

gossius Lotus capitulis subrotundis, caule erecto patula, foliis quinatis, Legumi-
nibus ovalis. Lin. mant. 104. S.V. pag. 691

Lotus belegradia: foliis quinatis, cuneiformibus; caule erecto; fili-
quis calycis sesqui longioribus; solitariis, erectis glabris Boiss. Desf. pag.

213. no. 71.

arabica Lotus leguminibus cylindricis aristatis; caul. prostratis, peduncu-
lis trifloris, bracteis monophyllis. Lin. Mant. 104. S. V. p. 691.

Lotus rosea caulibus prostratis, pedunculis quadrifloris, foliis
quinatis Tosk. Desf. pag. 140. no. 38.

~~Stipulas foliis adnumeravit Tosk. h. l. c. sine folia ei quinata~~

Pedunculus foliis ^{nunc. vel tri} ~~duplo~~ longior, 2-3-4 florus

Legumina glabra

(Stipulas foliis adnumeravit Tosk. h. l. c. sine folia ei
quinata)

peregrinus Lotus ^{Lotus} Leguminibus subternatis linearibus flatibus erectis compressis
mutantibus in S.V. pag. 691
Lotus villosa Tournef. Cat. Syff. plant. Egypt. pag. LXXI. no. 386

191. ~~inferatur ad hunc in ornithopida~~

Soryenium Lotus Capitulis aphyllis, foliis sessilibus quinatis Lin. S. V. pag. 692.

Ononis quinata; foliis quinatis integris, cuneatis, sessilibus; floribus sessilibus
subquaternis Loft. descr. pag. 130.

Soryenium
Planta plures ~~sub nomine~~ ~~Lot. Soryenium~~ in variis herbariis vidj ita diversa,
ut pure specie distingui possent. eatent

22 polyphyllus L. Legumini bus racemosis, foliis petiolatis novem natis

Habitat in Cap. b. Spei

Caules herbaceus glaber folia longe petiolata foliola oblonga
subtus pilis raris albidis adpressis femiunguicularia tena
in singulis ramificatione petioli. Petiolus caudis dichotome
divisus bractea barva ovata solitaria duo setales ad base
longuli petioli parvales. Pedunculi laterales elongati.
Flores in racemo, parvi. Calycis breviter subternesi an
super genere

pedunculatus Lotus caule herbaceo foliis lanceolatis pedunculatis
latis, floribus longe pedunculatis Coran. t. 2. p. 52. 7. 164.

Habitat in Hispania

Caulis tripedalis teres uti tota planta glabra. Stipula
ovata foliis latioribus. Flores unibellato capitati. Pedun-
culi fere semipedales apice folio ternato. Calyx carnis
subulatis Corolla lutea Coran

Subbiflorus Lotus - pedunculis subbifloris foliis longioribus: foliis quinato-pinnatis
foliolis oblongis.

Habitat in Pondichery Commerçon herb. Mus.

Caulis ramosi, tenues, glabri. Folia pinnata, 5na, utraque villosa, ter-
minale reliquis majus, semiunguiculata. Stipula subulata, parva.

Pedunculi 1-2 flori - legumina pollicaria, teretia, glabra

L. diffusus L. pedunculis subuni-floris, caule ramosissimo decumbente, foliis calycisque
pilosus, leguminibus teretibus strictis gracillimis Smith. fl. angl. 2. pag. 793

Trifolium corniculatum minus pilosum Baub. prodr. pag. 144.

Lotus pentaphyllos minor hirsutus; siliqua angustissima Baub. per. 332.

Habitat in rupibus montanis ?

Epilobium No 842. No 52. umbella puberula

odoratus

Lotos

Scarus boe e Marorio

deumbentor

Caules suffruticosi elongati tri-ve quadripedales prostrati. teres, pilosi & lani, amovii. folia lanceata pilosa. Stipulae oratae reflexae acuta latitudine foliorum. Pedunculi tri-ve quadri flori. bractea ^{seorsim pedicellata} monophylla orata. Calycis lacinia linearis Corolla loti cordata lobata. Ova flava

~~Protonotaria P. Eulima nuda Inguete, umbella composita in vertice rotunda
in canaliculis later. ad 4. p. 10. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.~~

~~canaliculatus~~ P. umbella sub octophylla partialibus triphyllis, fructis compositis
canaliculatus erectis elongatis speculis oblongis

Habitat in India orientali

Calculus ~~apophyllus~~ nudus acute triquetris latens planis
~~fenatis~~ ^{umbella} involucri quatuor longiora et profundi
unum margini fixata. involutella subulata
fructu breviora radii universales triquetri. et hinc
membranaceo lato pollicaris basi purpureo fentes
subulato foliolo terminata. pedunculi universales
inter novem 3 pollicaris vel parum ultra
radix r. thales totidem unguiculares ^{fructu} bipollicaris
fructu speculo copioso altero d. ^{fructu} convertit 5-7 flora
feruginea margini carinaque vespenti parva alterna
squama ovata mucronata.

alios longitudine
radii

Ingueto

Cypripedium canaliculatum Calmus oblongus canaliculato nudus
umbella composita pedunculis racemosis involucri polyphyllis
longissimis. Retz off 6 pag 20

D. monbrous

glaucus Lotus Leguminibus solitariis geminatis Vernatisque lineantibus fructis, caule diffu-
so, folioli obovati

Lotus graecus mandimur folio glauco et veluti argenteo Tournef. F.R. 4.

Habitat. herb. mus.

Caules tenues lani, canescentes. Foliola absque mucrona, semiunquid ulonia.

Stipula ovata. Bractea oblonga otulo armato sulcata. Legumina pollicaria
An varietas L. cythridis et ille gaudet folioli mucrona Vernatis et bractei
Crenicolati.

arborum Lotus

Habitat herb. Tusf.

Caulis fruticosus, ramosissimus, teres. Rami superne compressi, striati.
Folia tuberculo infidentia: foliola parva, obcordata. Stipula membra-
nacea. Pedunculi triflori. Legumen sive unguiculare, oblongum, venosum
acuminatum.

Sublobatus Dolichos foliolo intermedio rhombico

Habitat Aeb. Fus.

solubili. Foliola glabra mucronata, sesqui pollicaria. Stipulae
to. Pedunculati petiolo duplo brevioris.

var. varietas Dol. trilobi

uniflorus Lotus pedunculis unifloris.

Habitat in Aegypto herb. Tuss.

Caules plures, diffusi. Foliola parva, coraspi²cula, glabriuscula.

Pedunculi folio longiores.

axillaris Lohr.

Habitat in Cap. l. p. h. b. Mexic.

Caulis suffruticosus, ramis, peli adpressis, subteris, teris, decumbens, diffusus: ramis di-
chotomi, laxis. Folia petiolata, ternata: foliola sessilia, vix semipollicaria, lineari
lanceolata, obtusa cum mucrone brevi vel emarginat, pelli adpressi, mucrone ter-
men cinerea. Stipulae parvae, lanceolatae, acutae. Flores 3. axillares vel terminales
cum folio ternato petiolato, nutantes, parvi. Calyx villosus, quinquefidus: legumi-
na lanceolata, compressa, unguiculata, acuta, calyce duplo longiora.
an potius Ononis species

incanus. Lotus floribus umbellatis, foliis obovatis incanis

Dorychnis corymbosa planta Clus. hist. 100.

Lotus corniculatus argenteus flore luteo ex ore gaditanensi

Lotus fruticosus etc: Bar. Ic. 006.

Dorycnium luteum Bar. Ic. 1179.

Habitat in Hispania herb. Tus.

Caules lignosi, prostrati, procumbentes, laevi, ramosi. ^{incano ferici uti tota} folia brevissi-
ma petiolata, ~~ubi caulis incanis~~ ^{planta}. Soleola parva, obtusa vel acutiuscu-
la, frequentia. Stylus folii formis. Flores quaterni in pedunculo elon-
gato, axillari. Legumini teretia, pollicaria, glabra recta.
una varietas loti cretici soleola vero triplo minor.