

Ludwigia

Specimen folii latius a Boiss ad ^{T.} privatam pertinet

ramosissima Ludwigia caulibus prostratis diffusis, foliis lanceatis, floribus axilla-
 ribus subsolitaris & sessilibus cuneolatis
 Habitat in Carolina

interdum rami
 Dichotomi caulis
 Caulis plures, prostrati, undique diffusi, tunc statim a basi dictantur ramosi
 semipedales, tetragoni glabri. Folia opposita, sessilia, subrotundiora utraque
 acuta acuminata, stipula interfoliacei aligeri opposita laciniis albis
 subulatis. Flores interdum oppositi interdum gemini ab uno vel altero latere
 in dichotomiam 8-10. parvi. dentes 4 subrotundi acuti, petala vix longiora
 diam. calycis

Cornucopiae Desferri foliis linearibus lanceolatis glaberrimis, nervulosis terminata
 tubo monophyllo trichotomo caule herbaceo
 Habitat in nova Gallia
 foliis glabris
 Caulis polygamus, folia alterna, prostrata
 ciliolatis, prostratis, in summo ciliolatis
 quodammodo, tenuis lanceolata
 figur. Cordis

Cannthiaca, *Wulfenia* Jacq. Miscell. 2. p. 62. f. d. f. 1. Icon. rar. 1. t. 2. Reiner
& Hohenwaith den. Bot. t. 13. p. 1. p. 73. f. 1.

Podarota Wulfenia: foliis ^{laevibus} ~~oblongis~~ ^{oblongis} obtusis, ^{specie} ~~specie~~ ^{secunda}, caule ^{nudo}
^{laevibus} ~~oblongis~~ ^{oblongis} obtusis, ^{specie} ~~specie~~ ^{secunda}, caule ^{nudo}
Habitat in summis alpinis Cannthiis sole pinguis simo q

Folia medicabilia, obovata-oblonga, grossè crenata, crenis submucronatis
glabra excepto costa subtus, simpliciter venosa. Scapus erectus, spitha
mou, foliis altior, teret, pelonusculus, superne squama una altera
ve lanceolata. Storax pedunculati, secundi: pedunculi basi bractea lan
ceolata

Wulfenia Wulfenia

Capitata Ludwigia

Habitat in Carolina herb. Rich.

Caules alii repentes, foliis frequentibus, semipollucibus, oblongis, nervosis
caulis erecti, teretes, glabri, uti tota planta, superne ramo uno alterove
folia sesquipedalium, linear lanceolata, attenuata, retuse serrata.
Flores in capitulo terminali, vix semipollucis. Bractea oblonga,
Capitulo subgloboso, tetragonis, truncato.

mollis Ludwigia

Habitat in Carolina herb. Ruth.

Caules herbaceus, erectus, villosus - canescens: rami simpliciter. Folia lanceolata
sesqui-pollicaria, integerrima, enervia. Flores terminales, 4-6 vel quatuor, sep-
tales, uniana. Capsula brevis.

angustifolia Ludwigia

Habitat in Carolina herb. Rech.

habeo

pedunculosa Ludwigii

Habitat in Carolina Herb. Austr.

Caulis decumbentes, vix palmares, ramosi.

habes

microcarpa Ludwigia

Habitat in Carolina herb. Nutt.

Caulis ascendens, simplicis vel ramosi. Petala nulla

habeo

Solidifolia Ludwigia

Ludwigia alternifolia Waltheri

Habitat in Carolina. Herb. Mus.

Caulis teres, erectus, glaber, simplex. Folia sessilia, lineari lanceolata, glabra, integerrima, bipollicaria, obtusifolia. Peduncululi superne, axillares, solitarii, longitudine folii. Calycis laciniis lanceolata. Germen obovatum, tetragonum, glabrum.

alt. exemplar 62

ramosissima Ludwigii Walte.

Habitat in Carolina Herb. Guss.

Caulis erectus, glaber, teres, ramosus, virgatus: rami alterni. Folia linearia
angusta, alterna, pollicaria, glabra, integerrima. Flores axillares, soli
tari, sessiles. Capsula tuberculata.

pilosa Ludwigia

Habitat in Carolina herb. Guss.

Pilosa. Caulis herbaceus, erectus, teres, subramosus. Folia sesquialtera, sesqui-pollicaria, lanceolata, integerrima vel obscure remote serrata. Flores in axillis foliorum racemulorum sesquialtera conferti.

Fruticosa Lud. Wigui

Habitat in America boreali: Hoffh.

Solia lanceolata: in aliis fruticibus subrotundis villosis

alternifolia Ludwigia foliis alternis lanceolatis, caule erecto Lin S. V. p. 167. Frew Chart
2 tab. 2.
Lysimachia non papposa, flore luteo major, filiqua canyophylloide minor, ea
virginia Pluk. alm. 235: tab. 203. fig. 2.

Trinitex fuligineis foliis, caule purpureo, capsulari Pluk. Amalt. 99. t. 412.
fig. 1.

Ludwigia Capsulis subrotundis Hort Cliff. 173.

Habitat in Virginia & herb. mus

Flores laterales, axillares, solitarii. Capsula cubica calycis minores L. S. V.
Caulis erectus, tetragonus, angulis acutis, ramosis. Folia linear lanceolata
glabra, semipolluciana. Capsula axillari, solitaria.

pericardes Ludwigia frutescens glabra, foliis alternis linearibus lanceolatis,
floribus axillaribus solitariis, germine longissimo La Mart. Pl. Gu.
neg. 313.
Habitat in insula francisc.

non vid.

hirsuta Ludw. foliis ceteris lanicolatis floribus axillaribus solitariis sub
sespibus, caule tereti diffuso La Mark. T. En. pag. 313.
Habitat in Carolina

comparata Walt non vid.

erigata Ludwigia foliis oppositis lanceolatis, caule erecto Mant. 40 L.V. p. 161

Habitat in India

Caulis herbaceus, pedalis, erectus, brachiatus, lavis. Folia opposita petiolata, lanceolata, integerrima, lavis. Pedunculi subterminales, subterni, uniflori, rarius axillares. Germena tetragona angulata alata. Calyces minuti. Corolla vix conspicua. Capsula 4 locularis angulis quatuor carinatis, subcubica.
Linn. M. L. C.

repens C. foliis oppositis ovatis, pedunculis solitariis axillaribus, caula
repente Sw. prodr. p. 33.
Habitat in Tamaica O.

non vidi

perennis
oppositifolia Ludwigia foliis oppositis lanceolatis, caule diffusis Lin. S. V. p. 161.

Ludwigia caule diffusis, foliis lanceolatis, capsulis pedunculatis folio dimidio brevioribus fl. Reyl. 66. *

Ludwigia perennis foliis oppositis lanceolatis, capsulis pedunculatis Lin. Spec. pl. p. 173.

Habitat in India & ^{Labon} angulatus.
Caulis erectus ramosus rami alterni foliis petiolato lanceolatis simpliciter venosa utrinque attenuata integerrima lanceolata. Pedunculi ^{brevi} axillares solitarii saepe cum ramulis. Petala lutea. Calycis lacini lineari lanceolata Capsula vix unguicularis

perennis L. foliis lanceolatis, caule alternis caule diffusis capsulis pedunculatis folio dimidio brevioribus

aut Ludwigia perennis et oppositifolia male distincta, vel diversa a Ludwigia fl. Reyl. ^{diffusa} nomen et fl. Reyl. retineatur Speciei est huius: et ut videtur Lin. Mant. pag. 332. non nostra igitur vera Lin.