

# Lychnis

1. thaidonica L. floribus fasciculatis fastigiatis foliis ovato-lanceolatis
2. coronata L. glabra, floribus axillaribus terminalibusque solitariis, petalis laciniatis.
3. dioica L. floribus dioicis
4. cota L. petalis bifidis, floribus solitariis; foliis lineari-lanceolatis glabris; calycibus decem carinatis
5. quadridentata L. petalis quadridentatis, caule dichotomo, foliis glaberrimis
6. flos cuculi L. petalis quadrifidis, fructu subrotundo.
7. viscaria L. petalis subintegris
8. alpina L. petalis bifidis floribus tetragynis.
9. sibirica L. petalis bifidis; caule dichotomo, foliis subhirsutis
10. apetalal. calyce inflato, corolla calyce brevior, caule subuni-floro herma phodito.

agrostemma Lin - cum hoc genere conjugat  
Lamarck<sup>us</sup> differt corollis et petalis

glauca Lychus



*Lycchnis*

Habitat ad fretum magellanicum Com muf- herb Mus.

Radix superne d'urfa - Caulis erectus, herbaceus, spithameus, simplex, foliis  
nisi vel plures, laeviter pubescens. Flores herbacei leucoli. Petala biloba. Hyli  
quinque. Gaura coronata. Calyx inflatur

habes

*Chalcidomeda* <sup>Cydonia</sup> floribus fasciculatis cae fastigatis foliis ovatis lanceola-  
tis L. S. V. pag. 435.

Flores Constantinopolitanae Dod. pempt. 1778

*Lychnis byzantina* minuto flore Clus. hist.

*Lychnis hespeta* flore coccineo major Bauh. Pin. 203

Habitat in Tataria

Caulis erectus bipedalis teris pilosus simplex articulatus  
articuli pollicares. Tota ca. amplexicaulia <sup>glabra</sup> internodiis

duplo longiora, <sup>acuta</sup> avenia. Pedunculi terminales gracili  
multiflori. Petala bifida calycis cyathum semi  
pollicares, pilosi, subulati.

in culta saepius  
breviora

— petalis bifidis



reoronata Lychnis glabra, floribus axillaribus terminalibusque solitariis  
petalis laciniatis Thunb. fl. Jap. 107. \* L. V. p. 435.  
Lychnis grandiflora Jacq. Collect. 1. p. 149. & Hortus Jap. nov. Tom  
4. 10.

Habitat in China et Japonia 4

Sen Jun Ko, vulgo Ganpi Romp. Am. ex. foli. v. p. 83.

Folia glabra, Caulis simplex teres erectus pedalis sub foliis <sup>amplexicaulis</sup> ~~sub~~ <sup>amplexicaulis</sup> ~~sub~~  
dilata tus utraque cinnatus. Folia sessilia ovata lanciolata  
gl. asensia sesqui pollicaria. Pedunculi axillares oppo  
siti ~~et terminali~~ solitaria uniflora terminalis plerumque  
trici. bracteo quatuor lanciolato attenuato ~~et~~ <sup>et</sup> ~~uno~~ <sup>uno</sup> ~~oppo~~ <sup>oppo</sup>  
siti no longitudine ~~et~~ <sup>et</sup> ~~calycis~~ <sup>calycis</sup>. Calyx Decagonus superne am  
pliatus laciniis ovatis acutis margine membranaceis  
Petala incisae crenato multifida.

3 *Dioica Lichnis floribus deicis* Linn. V. pag. 437. ~~El. Dan. t. 792.~~

*Rosa maritima* similis quædam Trag.

*Lichnis sylvestris* purpurea God.

*Melandryum* Plinii generi nunc *Cliff. herb. 1. p. 294* mas

*Lichnis sylvestris* sive *agrostica* purpurea simplex Bauh. Pin. 204

~~β. *Lichnis*~~

β. *Lichnis sylvestris* alba simplex Bauh. Pin. 204

*Cucubalus* floribus hermaphroditis pentagynis capsulis unilocularibus

Hort. Cliff. 170. El. Dan. t. 792

γ. *Lichnis alba* sylvestris Lob.

*Lichnis alba* multiplex Bauh. herb. 20 Pin. 204

Habit in Europa frigida præter speculanti 4

<sup>bipedalis</sup>  
Caulis erectus simplex sumus, pilosus scabriusculus striatus. Folia amplexicaulia, lato lanceolata, remotis, pollicaria et ultra internodiis breviora. Pedunculi versus summitatem bis triflori. Calyces

alterius et alia  
folii

tubulosi pilosi  
rari hermaphroditi

foliis lanceolato ovatis villosis



4 ~~Costa~~ Lychnis pedalis bifida, floribus solitariis, foliis linearibus lanceolatis glabris,  
calycibus decem carinatis Hort. Kew. 2. p. 118  
Habitat in Portugallia O

6 quadridentata Lychnis petalis quadridentatis, caule dichotomo foliis glabris recurvis Lin.

S. V. p. 435. Guépin flor. Luff. t. 120.

Caryophyllus minimus humilis alter exoticus Lob. Ic. 445.

Lychnis sylvestris x Clus. hist. 1. p. 291.

Lychnis alpina, foliis angustis reflexis, petalis quadrifidis Legu. Verm. 3.  
p. 106. t. 5. fig. 1. ~~h. alpina~~ alpina potius representata

Alpine alpina glabra, folio reflexo Plur. alm. 23. t. 75. fig. 5.

Silene quadrifida petalis quadrilobis, caule dichotomo, floribus pedunculatis,  
foliis glabris recurvis Lin. Spec. pl. p. 602.

Habitat in Italia, Austria montibus ~~panum vel alpe superne~~  
caulis herbarius, filiformis ~~inf. tota planta glabra, apice fol. dichoto~~  
mus simplex palmatis vel ~~altis~~ Folia linearia basi ~~panum~~  
angustata, pollicaria vel ~~panum~~ <sup>longitudine inter nodos</sup> ~~altis~~, <sup>inferne confertiora longis</sup>  
~~superne retusisimo~~. pedunculi terminales et e dichotomia  
solitarii uniflori elongati Calyx campanulatus

lineari calycibus glabris



alpestris L. petalis quadrifidis coronatis, foliis linearibus lanceolatis  
rectis, calycibus subvillosis viscosis

Lynchnis quadrifida Scop. fl. Carn. no 519 exclusi Synonymi

<sup>mi</sup>  
Lynchnis alpestris Gaerth. fl. Austr. 1. p. 60. tab. 96

~~Scopoli~~  
Lynchnis alpestris petalis quadrifidis coronatis foliis  
rectis viscosis. Suppl. pag. 435 hex. lat. Synon. proter.

Scopoli

habitat in Austria

Caulis perithamou, simplicissimus basi subvillosus superne  
viscosus. Folia lanceolata linearibus basi saepe angustata  
et a polliciana et recta parva recta inferne conferta  
superne remotissima. Calyx campanulatus vix decem  
frenatus, villis glandulosis adpressis

7 flos cuculi lychnis petalis quadrifido, fructu subrotundo Lin. S. V. p. 435.  
H. Bar. 540

flos cuculi pratensis Tray

Armenus sylvestris God

Caryophyllus pratensis, flore lacinato simplici s. flos cuculi Bauh.

Pin. 210.

13. Odonites Plinii Clus. h. l. p. 292, 293

Caryophyllus pratensis flore pleno Bauh. Pin. 210

Habitat in pratis Europae hume diuiculis &

caulis erectus teres simplicis pinnis falcatis <sup>pubescit</sup> scabrisque peltatis

- folia lineari lanceolata sequi pollicaria remota gla  
<sup>intermedia breviora basi paucis pinnis</sup>  
bra pedunculata terminalia plerumque terni <sup>terni</sup> vel quadri  
flori. Calycis subampullati viridis et purpurei fructu

quadrifido lacinato



ovifera Lychnis petalis subintegrus L. V. pag. 635

Lychnis sylvestris VI. Clus. hist. 1. p. 209. t. 290

Lychnis sylvestris viscosa rubra angustifolia Bauh. Pin. 205.

Habitat in Europa septentrionalis prope siccis <sup>prope siccis</sup> glabris locis  
Caulis semper <sup>prope siccis</sup> foliis articulat<sup>us</sup>, articulis palmatis ultimis  
superne viscosi. Folia plerumque radicialia angustolancea  
candolata bipollicaria, paucia in caule <sup>remota prope</sup> ad singulum  
geniculum opposita. Structura inflorescentiae flores pedunculati  
solitarii oppositi <sup>in axillis</sup> vel ultimi plurimum terminalis  
congesti subsessili. Calyx clavatus unguicularis.  
a flor. aut: differt foliis angustioribus floribus brevibus infra  
apicem reliquos subsessilibus. Calyx ex longioribus absque  
lineis purpureis, petalis integris

9 alpina *Lupinus Petalis bifidis floribus tetragynis*. Flor. Sec. 410\* S. V. p. 2.

435\* DC. D. t. 65.

*Blene Lapponica alpina, facie viscaria* Flor. Lapp. 105\*

Habitata in Alpibus Norvegicis, Lapponicis, Helveticis, Sibiricis, Pyrenaeis

7. *Spithameus*  
*Caules sempervirentes erectis simplicibus sive tractulatis. Folia ad*  
*radicem congesta linearia glabra pollicaria. Caulina articulis*  
*breviora. Flores terminalis fasciculati congesti. Calyces campanu-*  
*lati glabri lavis colorati.*



10 sibirica *Lychnis petalis* bifida, caule dichotomo, foliis subhirsutis *Lin. Spec. 626 + S. V. p. 435.*

Habitat in Sibiria 4.

Statura *Silene rupestris*, sed Radix perennis. Folia minus glabra, et Styli 5: distinguunt plantam. *Lin*

non vidi

1) *opetala* *Lycnis calycis inflato*, <sup>her</sup> corolla calyce brevior, caule subuni-floro her-  
maphrodito. Lin. l. 2. p. 436. Flor. Dan. 7. 806.  
*Quicubalus* caule simplicissimo, unifloro, corolla inclusa Lin. Ed. Lappon.  
101. t. 12. fig. 1

Habita in alpebus Norvegia, Laponiis, Sibiria 4 <sup>glober</sup>  
Pauis palmari vel parum ultra simplicissimae erectae, Pedunculo  
unifloro terminatus. Articuli bipollitares. Folia lineari lanceo-  
lato acutiuscula longiora. Flores nudi Calyx oratus glaber lineis  
nerviis longitudinalibus  
Planta sibirica multiflora haei hermaphrodita



grandiflora L. petalis truncato-obtusis, calyce elongato turbinato foliis  
pubescentibus sessilibus appressis Jacq. Coll. 1. p. 149

non vidi





glauca  
oymoides

L. calycibus petalis bifidis folus subpalmatis

Habitat in ~~hispania~~ <sup>partibus</sup> de Bamader

Tuice silene vel sapor: oymoides at tota glabra  
Caulis filiformis procumbens superne divisus in pedunculis  
sub dichotomis unifloris folia oblonga acuta in  
petiolum attenuata vix unguiculata internodis la-  
gis breviora <sup>glauca vix</sup> crassifolia arenia. Pedunculi capella  
ris pauli laterali medio bibracteati clavati ungui-  
culares gls substnati colorati. Stylis sive petalis  
nullis purpureis

ag