

Panzeno Gmelin
Lycium Carolinum herb. Guss.

Lycium

* in ermes

1. foetidum L. foliis oppositis ovato-lanceolatis, stipulis interfoliaceis & tocius, floribus axillaribus sessilibus
2. microphyllum L. foliis fasciculatis linearibus-subcuneatis
3. barbadicum L. foliis oblongis glabris, floribus aggregatis pedunculatis, stipulis barbati + + spinosi
4. barbanum L. foliis lanceolatis, utraque acutis, calycibus bifidis
5. canariense L. foliis obliquis cuneatis obtusis, ramis flexuosis verticibus
6. angulatum L. foliis cuneatis carnosissimis, ramis flexuosis angulatis, corollis patentibus
7. afrum L. foliis linearibus, ramis strictis patentibus
8. tetradnum L. foliis ovatis obtusis carnosissimis ramis angulatis glabris, corollis quadrigidis tetradnum
9. ruthenicum L. foliis linearibus, ramis dependensibus.

10. *Cappularia* L. foliis lanceolatis venibus glabris, pedunculis calycibusque p^{er}
... besistentibus, pentacarpis cappularibus
11. *boerhaavifolium* L. foliis ovatis integerrimis acutis glaucis, floribus paniculatis
12. *heterophyllum* L. foliis ovatis flexuosis glaucis, ramis horizontalibus

Chenop. Lycium

Habitat in China herb. Guoj.

Rami inermes, teretes, glabri, cortice albedo. Folia petiolata, polluciana, ovata vel oblonga, acuta vel obtusisima, glabra arena, obsolete nervosa, per petiolum panem decurrentia. Pedunculi axillares, 1-2. unguiculares. Calycis laciniis ovato.

Aggregatum Lycium

Lycium aggregatum inermis, foliis oblongis acutis undulatis subtus tomentosis, floribus axillaribus aggregatis numerosis semis Fl. Penns. 2. pag 49. tab. 102. fig a

Habitat inaeque Pennsiae vallibus et praeceptis, ad sepes et versuras
inermis, leviter tomentosus, ca. aescens. Caulis erectus, medullosus, interdum granuloso, inflorescentia tempore fere aphyllus. Folia primam fasciculata, inaequalia, tandem sparsa, petiolata, inaequalia oblonga, acuta, undulata, integerrima, supra glabra, subtus tomentosa, inaequaliter venosa; majora bipalmata. Flores gemmi et axillis anni procedenti, numerosi, aggregati, noctu et mane valde fragrantia, pedunculata. Calyx squae crenatus cretens. Corolla alba, calyce 4plo major. Lacina ovata, reflexa macula viridi notata. Stamenta e medio tubi, glabra. Baccula globosa magnitudine pepi, aurantia Coloni, bitriloculari Fl. P. Penns. 1.

umbellatum Lycium

Lycium umbellatum inermis, foliis oblongis lanceolatis, pedunculis ramosis, floribus umbellatis, calycibus pentagonis Pl. Per. 2. pag 45 Tab. 102. fig. 6.

Habitat in Peruvia & peribus et versuris
Caulis frutescens, teretis, erectus, inferne ramosus & tenuis, granulatus adspersus. Rami erecto-patuli, teretes, granulati: tenes sublanuginosi. Folia alternata, breviter petiolata, oblonga lanceolata, fere bipalmata, integerrima, patentia, supra glabra, subtusque vix pulverulenta: ex axillis gemmae diphyllae: folioli retroflexa, ovata, inaequaliter. Pedunculi rami breves, multiflori. Flores longe pedicellati, umbellati: pedicelli inaequales superne incrassati. Calyx angulatus, quinquefidus: laciniis acuminatis. Corolla violacea, calyce 4plo longior: laciniis acutis, vix reflexis. Filamenta glabra, in medio tubi. Germen obtuse pentagonum. Baccamagnitudine pisi, aurantiis coloris, uniloculari, polysperma Pl. Per

obovatum Lycinum

Lycinum obovatum, foliis obovatis obtusissimis, spinis foliosis, setisotionibus nudis, floribus paucis nutantibus Pl. Penw. 2. pag. 46 tab. 103. fig.

⁶
Habitu Penw. 3. pag. 5

Spinosum, glaberrimum. Caulis sub terogyalis, erectus, subinarcuus ramosissimus. Rami diffusis, teretes. Spinae solitane, rigidae, saepe foliferae et floriferae. Folia fasciculata, inaequalia, postea sparsa, petiolata, obovata, obtusissima, integerrima, leviter venosa, crassiuscula. Pedunculi solitarii, axillares, uniflori, graciles, superne incrassati. Flores cernui. Calyx squae crenatus, corolla sexuplo brevior: crenae acuminatae. Corolla purpureo-violacea: limbus squae fere pubescens; patulus. Stamina longitudine corollae. Vagina auranti coloris Pl. Penw. l. c.

Spathulatum Lycium

Lycium spathulatum in eone foliis obovato-spathulatis, floribus fasci-
culatis axillaribus fl. Peruv. 2. pag 46 Tab. 103. fig. 6.

Habitat in Peruvia sepius

glabrum, Inerone. Caulis biorygatus, fruticosus, ramosissimus. Ram. pates-
tissimi, teretes: teneri obsolete angulati. Folia fasciculata, inaequalia
postea alterna, petiolata, obovato-spathulata oblongaque obtusa,
integerrima, utraque nitida: majora bipollicaria. Pedunculi fasciculati
e singulis punctis gemmaceis plures, inaequales, uniflori, teretes, tenues,
superne crassiores, erecti. Calyx truncatus, leviter quinque-dentatus,
fructiferae quinque crenatus. Corolla tubulosa, calycis fl. major
sursum sensim amplata, violacea: limbus pubescens. Filamenta
corollae tubo breviora, basi pubescentia. Bacca rubro-lutea, pusi-
magnitudine fl. Per.

folia obovato-oblonga

Tatanicum Lycium fruticosum, foliis linearibus fasciculatis, ramis supinis Merr. in
Comment. Gotl. IV. Pall. fl. Ross. p. Tab. 49.
Habitat in Tatana

est eodem cum kithenicis

barbatum Lycium inermis foliis ovatis glabris ramis flexuosis floribus
paniculatis Thunb. prodr. p. 37.

Lycium inermis inermis glabrum, foliis oblongis glabris floribus
aggregatis pedunculatis, stipulis barbato-his. Suppl. pag. 150
Habitat in cap. b. p. 5

non. vidi.

chinense Lycium spinosum foliis subrotatis petiolatis ramis dependentibus
calycibus & fide La Mark. T. E. 2. p. 3. t. 112. fig. 2.
Habitat in China &
Stylus staminibus longior

Cochinchinense Lycopodium foliis oblongis obtusis, caule inermi, cymis
terminalibus Lour fl. Cochinch. pag. 134.

Habitat in sylvis Cochinchinas 5

Stipes 4 pedalis pubescens inermis. folia oblonga, obtusa, cartilaginea
crassa glabra alterna. flores albi. corolla limbo reflexo.
panis pilosa. Baccis subrotunda biloculari

non vidi

rigidum L. spinosum, foliis fasciculatis linearibus, ramis striatis, floribus
pedunculis brevissimis. Thunb. prodr. fl. Cap. p. 37.
Habitat in Cap. b. p. 5

non vidi

Z. barbatum L. inermis glabrum foliis oblongis glabris, floribus aggregatis pedunculatis, stipulis barbatis Lin. Suppl. p. 150 ^{inermis} J. V. p. 220
Habitat in Cap. b. spec. 5

_____ rami flexuosi floribus paniculatis Thunb.
- prod. pag. 37

2 microphyllum L. ? inermis foliis fasciculatis lineari cuneatis

Habitat in Brasilia Thoun ^{superne}
^{oppositi vel alterni}
~~Glabra~~ Ramis cerasi ^{terete} ^{pulverulenti}. Folio minutis
^{oppositi vel alterni}
obtusis lineari basi angustata flores non vidi

barbarum L spinosum, foliis lanceolatis, calycibus pubescentibus Lin. Mant. 341.

R.V. p. 220 Lin. Spec. pag. 277*

Lycium barbarum foliis lanceolatis solitariis ramis dependentibus

Murr. in Com. god. 1779. p. 12

~~Gasmunoides aculeatum humile, calami minori folio, fructu per maturi
tatem glavescente Michx. 224. t. 105. fig. 1~~

Gasmunoides sinense, calami folio longiore et angustiore DuRoiel arb. 1. p. 306
t. 121. fig. 4.

Habitat in Asia, Africa, Europa &

~~Gasmunoides africana~~

Rami teretes glabri ^{interdum flexiles et polystichis alternis} debiles penduli cortice cinereo. Spinae
pollicares teretes. ^{folia} folia petiolata utraque abbreviata pollicia

Cinerea a basi
petioli decurrendis vel tres simul
de

na aseniis emersis, glabra integerrima alterna vel interdum
gemini
Dine foliorum, unum flori. Calycis ore bilobo vel trilobo

utrinque acutis

4 europaeum L. spinosum, foliis oblongis, ramis flexuosis teretibus. Lin. Mant. 477
S.V. p. 228

Rhamnus spinis oblongis, floe candidante Bauh. pin. 477

Gasminoides aculeatum, foliis folio, floe parvo ex albo purpura fente
Mich. gen. 224. t. 105. fig. 2

Habitat in Europa australi &

Rami teretes coriis cinereo ramuli foliosi et floriferi, spinosissimi
folio fasciculata, obtusa basi attenuata angustiora quam in barba
in petioli pollicem inaequalia conspicua petioli uti peduncululi
canescentes cinerea nulla petioli decurrens. Calyx multo
minor quam in barbato tubus corollae angustior

cinereis cuneatis obtusis

~~foliis differe videtur folio angustissimo~~

hondam L. ^{minor} foliis obovatis carnosis glabris, ramis spinescentibus peduncu-
lis brevissimis Thunb. prodr. fl. cap. pag. 37.

Habitat in Cap. b. p. et Thunberg. m. f.

Rami teretes cortice cinereo, glabri folia fasciculata parva

_____ *Cecani cuneatis*

4 angulatum ^{binopum} C. ramis flexuosis angulatis foliis cucurbitiformibus carnosissimis
Habitat in Madagascaria, Thourin
Rami cortice albicante, e lineis decurrentibus angulatis.
flexuosis
Folia brevia obtusa vix unguiculata glabra sessilibus
Calycis 5 dentatus. Tubus corollae calycis longitudine
caenea corollae rotundata
folisque
forte varietas europaei diversa corollae brevioribus latioribus

an tetrandrum. l. & corolla 5 fida

~~Japanicum~~ L. inermis foliis ovatis nervosis planis floribus sessilibus Thunb.
fl. jap. p. L.V. p. 220

Habitat in Japonia

Lycium foetidum L.
indicum Retz obs. p. 12. n. 2.
et Lyc. foetido non diversa

6 tetrandrum hijicum spinosum, foliis ovatis obtusis carnosiss; ramis angulatis glabris, corol-
lis quadrisidis tetrandris Lin Suppl. pag. 150 t. V
Habitat in Cap. bono spei t
Semillimum afro; an satis distinctum reddunt carnositas et quaternarius nume-
rus Lin

non vedi.

Asplenium h. foliis linearibus Lin. S. V. Mill. Dict. t. 171. fig. 1.

Lycium asplenifolium foliis fasciculatis linearibus ramis strictis Murray
in Comment. Gott. 1779. p. 12.

Rhamnus alata foliis ~~salicis~~ flore purpureo Bauh. pin. 477.

Gasminoides aculeatum, ~~salicis~~ folio Michx. gen. 224 & 105. fig. 1

Gasminoides africanum, *jasmini aculeati* foliis et facie Mus. act. P.
1711. p. 420. t. 12.

Habitat in Asia, Africa, Europa &

Rami teretes rigidi in spinam desinentes. ^{ad latera} ~~Totia~~ fasciculata ^{minorum} vel ^{glabra} ~~vel~~
basi angustiora, unguiculata. ^{glabra} ~~Spinæ~~ pollicari; valida, teretes
aphylli; alterni. Pedunculus ex eadem ^{figura} gemma quem foliorum
foliis brevior solitarius uniflorus. Calyx ^{figura} glaber laciniis ovatis
acutis. Corolla calyce triplo longior laciniis rotundatis.

ramis teretibus

Prithenicum L. spinosum, foliis fasciculatis lineari-bus ramis dependentibus.
Murrari in Com. got. 1779. p. 2. t. 2.

Habitat

Faciis Lycii acri Ramis teretes ~~floribus~~ cortice cinereo
spino alternis frequenter unguiculatis. Vicia plura sesqui
pollicaria inaequalia glabra obtusa fuscipula ~~cras~~ fuscipula.
Calyx brevior quam si d. eatatur laciniis rotundatis. Corolla
brevior et respu faucem latior quam europaei

cinereum L. fruticosa foliis lanceolatis glabris, ramis spinescentibus; pedunculis
transversis Thunb. Prodr. pag. 37
Habitat in Q. b. p. 5

non vidi

10 Capsulare *Lycium spinosum* foliis lanceolatis tenuibus glabris, pedunculis calycibusque
pubescentibus; pericarpis capsulantibus Am. acad. 4. p. 308* L.V. p. 228.

Habitat in Mexico

Erigitur ramis terribus. Spino patentes, simplices, longitudine foliorum
ad ramificationes et folia. Folia lanceolata, tenuia, glabra, sub
petiolata. Pedunculi axillares simplices, folio breviores, uniflori
pubescentes usq. Calyx. Corolla rotata. Stigmata duo, angusta,
erecta. Capsula ovata, mucronata, biloculari len. Am. l. c.

non vid.

77 Boerhaavifolium L. spinosum, foliis ovatis integerrimis acutis glaucis, floribus
paniculatis Lin. Suppl. p. 150. & L. V. p. 220

Asmenoides spinosum foliis rotundioribus, floribus subcaeruleis Lactescentibus

Du Hamel

Habitat in Peru

Rami teretes cortice cinereo spino paniculari ad extremum ramu-
lorum. Folia petiolata, alterna interdum tres simul basi
acuta margine parum undulato obscure nervosa, pollicaria
vel ultra. Flores L. barbari. Pedunculi vesper apices
ramulorum axillares foliorum longitudine, Corolla conica
odorata

an inflorescentia vera paniculata

Heterophyllum L. foliis ovatis flexuosis glaucis, ramis horizontalibus, spinis gem
matis Marr. in Con. gott. 1703. t. 2.

non vid: Dem forte cum *boerhaafol.*