

Lycopjjs

1. vesicularia foliis integerrimis, caule prostrato, calycibus frutescentibus
inflatis pendulis
negricans
2. pulla L. foliis integerrimis, caule erecto, calycibus frutescentibus
inflatis pendulis, radice repente
lutea
3. aegyptiaca L. foliis integerrimis scabris, caulebus adscendentibus, calycibus
frutescentibus inflatis pendulis
4. variegata L. foliis repandis dentatis callofis, caule decumbente, corollis
carnosis. Antherusa pedata
5. arvensis L. foliis lanceolatis, calycibus frut. floescentibus erectis
bullata
6. orientalis L. foliis ovatis integerrimis scabris, calycibus erectis
7. virginica L. foliis linear-lanceolatis confertis tomentosis molli-
bus, caule erecto
Cichroder

Echinosider L. foliis lanceolatis, dissectis, caule ramosissimo erecto, floribus
secundis sessilibus La Martre pag. 405
Echinosider orientale, buglossi folio, flore luteo, maculis atropur-
pureis notato Pournaf. Cor. Praxb. Cent. 1. pag. 1. tab. 1
Habitat in oriente
Flores magne

egyptia L. foliis integerrimis scabris, caulibus adscendentibus, calycibus fructiferis
lobis inflatis pendulis. Gaiqu. Musc. Collect. 3

non vidi nisi est planta a Dr. Gronow sub nomine *As. divaricata*
de ex horto gothogeni ad hunc folio. Denticulata

arvensis L. foliis lanceolatis hispida, calycibus florentibus erectis
H. Don. t. 435

Habitat in Europa

Caulis uti tota planta valde fragilis decumbens ramosa.
Flores in racemo lato, distantes ut fere axillares apparent.
pedicello brevissimo. Calycis quinquepartiti laciniis lanceola-
tis. Semina nigra

virginica Lycopodium foliis linearibus lanceolatis confertis tomentosis mollibus, caule erecto

Lin. S. V. p. 109. Gron. Virg. 140.

Habitat in Virginia ad Viar. 4

orientalis L. foliis ovatis integerrimis scabris, calycibus erectis Lin. S. V
Buglossum orientale angustifolium, flore parvo conules Tournef.
corol. 6.
Habitat in oriente 0

~~Plantam~~

Plantam sub nomine Lycop. Erecta ex horto Parisiensis ~~Lycei~~
in Orientalis L. ^{et} at flores non conules sed lutei
caulis decumbens ramifera sesquipedalis pilosus siaber
folia sessilia lanceolata integerrima racemi terminali
les erecti ^{foliosi} flores distantes. Calycis quinquepartiti lacini
nisi lanceolati stygosis ciliatis semina nigra

pulla *Lycopsis* foliis integerrimis, caule erecto, calycibus frutescentibus inflatis

pendulis in. l. v. p. 100. Jacq. fl. Austr. vol. 2. t. 180

+ *Eichum* pulla flore Clus. h. 2. p. 164.

• *Buglossum* sylvestre lanuginosum Bauh. Pin. 254

+ *Buglossum* alterum flore nigro Math.

Buglossum sylvestre majus nigrum Bauh. Pin. 256.

Habitat in Tatania, Germania 4

Differt a *L. vesicaria* caule erecto, radice repente

*Cuteca l. bracteis ovato acuminatis, corolla lutea exserta, calycibus fructu
tendentibus inflatis angulosis semperquefidis* La. Mark p. 405.

Habitat in Africa

affinis *Lithospermis orientali*

nigricans L. bracteis lanceolatis, calycibus inflatis pentagonis, corollis longio-
ribus; foliis cernuis La Martre pag. 409
Habitat in oriente B

Echeodes neyricans Defont. fl. atlant. pag. 163.

Buglossum sylvestre majus nigrum. Bauh. pin.

Buglossum prostratum nigrum annuum pullo minimo flore Monf.

f. 11. t. 26. fig. 11.

Habitat in arenosis Barbano

Lycopus her

obtusifolia Lycopii folio lanceolato subtergenimis, calycis fructiferi infla-
to erecto Wild. Spec. pl. pag. 100
Pulmonaria Chia, ceteri folio vernicis, calycis reflexo flore
albo. Tournef. Cor. 6.
P. Pulmonaria Lesbia, ceteri folio vernicis, calycis reflexo, flore
coeruleo Tournef. Cor. 6.
Habitat in Chia et Lesbo C.

Lycopis.

Lycopis lesbia, ciliis folio verrucoso, calyce reflexo, flore coeruleo Tour-
net.

Habitat in insula Lesbo herb. mus.

Caules palmarum.

ciliata Lycopersi foliis lanceolatis denticulatis. Sepedo ciliatis, calycis fructiferi inflato-pendulo Willd. spec. pag 700

Pulmonaria orientalis calycis sepianis foliis Ethii, flore perperuo
veo confundibili formi Tournef. Cor. 6

Habitata Oriente ☉

non vid.

seficaria L. foliis integerrimis, caule prostrato, calycibus fructiferis inflatis
pendulis Lin. I. V
Buglossum prostratum annuum, pullo minimo flore Monf. hist. 3. p. 489
f. 11. t. 26. fig. 11

Habitat in Europa australi C

Caules prostrati vel pedales pilosi scabri simpliciter ^{interdum adscendentes interdum} folia lanceolata ^{erectiusculi}
sessilia aequae ac radicalia tripollicaria ^{obtusiora} caulina minorae acuta
pilosa scabra. Racemus terminalis interdum bifidus, foliosus
folia floralia calycis ^{duo} dimidiis longiora fructura foliorum
caulis. Corolla suprema fuscata purpurea subo pallida. Laciniae
calycis fructiferi ovati acuminati. Semina rugosa.

bracteis ovatis acutis, corolla erecta, calycibus fructuum inflatis
cernui decem angulatis La Mark pag. 90